

Unit 03 පෘථිවිය මත ජීවයේ සම්භවය Origin of Life on Earth

ජීවයේ සම්භවයට පෙර පෘථිවියේ පැවැති තත්ත්වය

- අවුරුදු බිලියන 4.6කට පමණ පෙර පෘථිවිය සහ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඇති අනෙකුත් ග්‍රහ ලෝක බිහි වී ඇත
- සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ආරම්භයේදී පෘථිවියේ විශාල පාෂාණ සහ අයිස් කුට්ටි ගැටෙමින් පැවත ඇත
- මුල්ම පෘථිවි වායුගෝලයේ ගිනි කඳු පිපිරීමෙන් නිදහස් වූ

- ඇමෝනියා (NH_3)
- කාබන්ඩයොක්සයිඩ් (CO_2)
- හයිඩ්‍රජන් (H_2)
- හයිඩ්‍රජන්සල්ෆයිඩ් (H_2S)
- මීතේන් (CH_4)
- නයිට්‍රජන් (N_2)
- නයිට්‍රජන් වල මක්සයිඩ් (N_2O , NO_2 , ...) යන වායුන් පැවතිනි

ආදි වායු
ගෝලය
(ප්‍රදාහිත)

- එසේම ජල වාෂ්ප ($\text{H}_2\text{O}_{(g)}$) ගත විය
- නමුත් මක්සයිඩ් (O_2) පැවතියේ ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් පමණි
- ඉන්පසු උදාසීන වායුගෝලය මක්සිමාරක වායුගෝලයක් බවට පත්විණි
- අනතුරුව පෘථිවිය සිසිල් වීමට ආරම්භ විය
- මෙය ජල වාෂ්ප සනිහවනය වී සාගර ඇතිවීමට හේතු විය (ආ. 4000 වර්ෂ. 19) (ආදි කාලය)
- එසේම වායුගෝලයේ පැවති හයිඩ්‍රජන් වලින් කොටසක් අභ්‍යවකාශයට ශීඝ්‍රව නිදහස් විය

පෘථිවිය මත කාබනික අණු සංශ්ලේෂණය සඳහා ඇති වූ තත්ත්ව

- ගිනිකඳු පිපිරීම
- අකුණු ගැසීම
- අධික පාරජම්බුල විකිරණය
- ජලතාප මංකඩ විවර
- ක්ෂාරීය මංකඩ විවර


- මෙවැනි තත්ත්ව පැවතීම ජීවයේ සම්භවයට අභ්‍යවශ්‍ය කාබනික අණු සංශ්ලේෂණයට හිතකර විය

- මෙසේ ඇති වූ සරල කාබනික අණු බහු අවයවීකරණයෙන්

- ප්‍රෝටීන
- නියුක්ලෙයික් අම්ල (RNA)

වැනි මහා අණු සෑදිණි

- මෙසේ නියුක්ලෙයික් අම්ල (RNA) වැනි ස්වයං ප්‍රතිවලිත කාබනික අණු සෑදීම නිසා පෘථිවිය මත ජීවය සම්භවය වීමට හැකි විය



පෘථිවි විවිධත්වයේ පරිණාමය

- පෘථිවිය මත ජීවයේ සම්භවය පිළිබඳව සෘජු සාක්ෂි අවුරුදු බිලියන 3.5 ක් පමණ වන ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ පොසිලවලින් සැපයෙයි
- ප්‍රථම ජීව සෛලය පිළිබඳව සාක්ෂි සැපයී ඇත්තේ රසායන, විද්‍යාව, භූගර්භ විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව යන විෂය ක්ෂේත්‍රවල නිරීක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ මගිනි

1) ජෛව රසායනික පරිණාමය

- පෘථිවියේ මුල් කාලයේ සිදුවූ රසායනික සහ භෞතික ක්‍රියාවලි පදනම් කරගත් කල්පිත ආශ්‍රිතව ජෛව රසායනික පරිණාමවාදය බිහි විය
- මෙය ප්‍රධාන පියවර හතරක අනුක්‍රමයක් මස්සේ ස්වභාවික වරණයේ බලපෑම යටතේ ප්‍රථම ජීවී සෛලය ඇති බව මෙහිදී උපකල්පනය කෙරේ

1) ආදි පෘථිවියේ පැවති වායුගෝලීය තත්ත්ව මගින් අකාබනික අණු වලින්, ඇමයිනෝ අම්ල, නයිට්‍රජන් හා හෂ්ම වැනි කාබනික අණුවල අජෛව සංශ්ලේෂණය සඳහා පහසුකම් සැපයීම

මර්ෂාලන් සංකීර්ණ ආදී වායුගෝලය මෙම කුඩා කාබනික අණු සෑදීමට උදව් කළේය.

2) ඉහත දැක්වූ කාබනික අණු බහුඅවයවීකරණය වීම මගින් කාබනික මහා අණු නිපදවීම

ප්‍රෝටීන, න්‍යෂ්ටික අම්ල

3) මෙසේ ඇතිවූ කාබනික මහා අණු පටල තුළ ඇසිරීමෙන් ප්‍රාක් සෛලය බිහිවීම

බිඳී නැතිවීම

4) නියුක්ලියෝසික් අම්ල ස්වයං ප්‍රතිවලින වීමේ හැකියාව ලබා ගැනීම නිසා සෛල වලට ප්‍රවේණිගත වීමේ හැකියාව ලැබීම

- කාබනික අණු වලින් සමන්විත ද්‍රාවණයක් ලෙස පැවති ආදි සාගරය, ආදි සුපයක් ලෙස පැවති අතර, ඉන් ජීවය බිහිවන්නට ඇතැයි යන මතය හැල්ඩේන් විසින් යෝජනා කරන ලදී
- එසේම මෑත කාලයේදී
 - හිනි කඳු ආශ්‍රිත වායුගෝලය
 - ක්ෂාරීය මංකඩ වීර

ආශ්‍රිතව සිදුකළ අධ්‍යයන හරහා කාබනික අණු වලට අජෛව සංශ්ලේෂණය විය හැකි බව පෙන්වා දී ඇත. එසේම කාබනික අණු වල ප්‍රභවයක් ලෙස උල්කාපාත ද දැක්විය හැකිය

2) ප්‍රාක් සෛලය බිහිවීම (කොප්‍රැක් චේටර්)

- ප්‍රාක් සෛලය බිහි වී ඇත්තේ ලිපිඩ වලින් වට වූ ආශයිකා තුළට RNA ගොනු වීමෙන් වේ

ප්‍රාක් සෛලයට

- එන්සයිම උත්ප්‍රේරක ක්‍රියාවලි RNA
 - වර්ධනය ප්‍රෝටීන
 - ප්‍රතිවලින } RNA
 - පරිණාමය }
- යන හැකියා පැවතුනි



- ප්‍රාක් සෛල වල ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ලෙස ක්‍රියාකර ඇත්තේ (RNA) වේ
- එබැවින් ප්‍රාක් සෛලය තුළ ජාන සහ එන්සයිම ලෙස ක්‍රියා කර ඇත්තේ (RNA) වේ
- එනිසා ප්‍රාක් සෛලය තුළ පැවති වලට ප්‍රතිවලින වීමේ හැකියාව පැවති ඇත

(රැකිබා සංකීර්ණ)

- එසේම ආදි සුපය තුළ පැවති වෙනත් අණු ද ප්‍රාක් සෛලයට එකතු වී ඇත
- මිසෙල්ලා සංස්ථාපනය වී පටලයට ලිපිඩ ජීකරාශී වීමෙන් සෛලය වර්ධනය වීම නිසා, සෛලය ප්‍රමාණයට වඩා විශාල වූ විට (RNA) අඩංගු ප්‍රාක් සෛල දෙකක් බවට බෙදී ඇත

විකල්ප (ප්‍රෝටීන සංකීර්ණය)

3) ප්‍රභාසංශ්ලේෂක ජීවීන් බිහිවීම
ඉහත සාරාංශයේ කාරණා විකර්ණය කළ විට, ප්‍රභාසංශ්ලේෂක RNA ඉතා ආසන්න වී ප්‍රභාසංශ්ලේෂක ජීවීන් සම්භවය වී ඇත්තේ අදින් වසර බිලියන 2.7කට පමණ පෙරයි (ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික ජීවීන්.)

නිසා ප්‍රාග් ජීවීන් බිහිවීම

- මෙසේ සම්භවය වූ ප්‍රභාසංශ්ලේෂක ජීවීන් වර්තමාන සයනොබැක්ටීරියාවන්ට සමාන ප්‍රභාසංශ්ලේෂක බැක්ටීරියා විශේෂයකි
- මොවුන්ගේ ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආදි සුපයට ඔක්සිජන් (O_2) නිදහස් විය
- මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආදි සුපය තුළ පැවති යකඩ අයන, යකඩ ලෙස අවක්ෂේප විය
- එසේම ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය මගින් නිදහස් වූ ඔක්සිජන් මගින්, ජල පද්ධති සන්නාපත වන තුරු අතිරේකව එකතු වූ ඔක්සිජන් වායුව (O_2), එම ජල පද්ධති තුළ දියවී ඇත
- ජල පද්ධති ඔක්සිජන් (O_2) වලින් සන්නාපත වූ පසු නිපදවුණු ඔක්සිජන් (O_2) වායුව, වායුගෝලයට නිදහස් වීම නිසා මෙන්ම
- ප්‍රභාසංශ්ලේෂක බැක්ටීරියා වල ගහනය ඉහළ යෑම නිසා
- වායුගෝලීය ඔක්සිජන් (O_2) ප්‍රමාණය ඉහළ යෑමට දායක වූ අතර
- මෙය හරිතලවයේ සම්භවය වේගවත් කර ඇත



4) ප්‍රථම සුන්‍යාස්ථිකයන්ගේ බිහිවීම

- ප්‍රථම සුන්‍යාස්ථික සෛල ඇතිවී ඇත්තේ අදින් වසර බිලියන 1.8කට පමණ පෙර වේ
- මෙය පොසිල පිළිබඳව සාක්ෂි මගින් තහවුරු කරගෙන ඇත

- පසුකාලීනව බහුසෛලික ජීවීන් බවට පරිණාමය වූයේ මෙය මෙම සුන්‍යාචරික ජීවසෛලිකයන් වේ
- සූ න්‍යායාලික සෛල ප්‍රාග් න්‍යායාලික සෛල වලට වඩා ව්‍යුහාත්මක ලෙස සංකීර්ණ වූ අතර, පුළුල් පරාසයක විවිධත්වයක් ඇති කිරීමට පරිණාමය වීමේ හැකියාවක් පැවතිණි
- ඒ අනුව ප්‍රථම සූ න්‍යායාලික සෛල සම්භවය වීමෙන් අනතුරුව පරිණාමයට ලක්වී විවිධත්වයක් ඇති ඇල්ගී, දිලීර, ශාක හා සතුන් වැනි බහුසෛලික ජීවීන් ඇති විය

සූ න්‍යායාලික ජීවීන්ගේ විවිධාංගීකරණය

- පොරිෆෙරා (ස්පෝන්ජින්), නිඩාරියා (මුහුදු ඇනිමන් සහ ඔවුන්ගේ සම්පතමයින්) සහ මොලුස්කා ඇතුළු බොහෝ සත්ත්ව කාණ්ඩ බිහිවන්නේ පසු ප්‍රෝටෝසොයික අවධියේ (අදින් වසර මිලියන 635කට පමණ පෙර) දී ය
- වර්තමාන සත්ත්ව වංශ බහුතරය බිහි වී ඇත්තේ කේම්බ්‍රිය අවධියේ මුල් කාලයේ (අදින් වසර මිලියන 542කට පමණ පෙර) දී වේ



භූ විද්‍යාත්මක කල්ප (ඉයෝන) සහ පරිණාමික යුග

- පෘථිවි ඉතිහාසය භූ විද්‍යාඥයින් විසින් කල්ප හෙවත් ඉයෝන හතරකට සහ පරිණාමික යුග වලට වර්ග කර ඇත
- පෘථිවි ඉතිහාසය බෙදා ඇති ඉයෝන වනුයේ
 - 1) හේඩියන් ඉයෝන
 - 2) ආකියන් ඉයෝන
 - 3) ප්‍රොටෙරොසොයික් ඉයෝන
 - 4) පැනරොසොයික ඉයෝන
- මේ අතරින් පැනරොසොයික ඉයෝන පරිණාමික යුග තුනකට බෙදා දැක්වේ. එනම්
 - 1) ජෙලියෝසොයික යුගය
 - 2) මියොසොයික යුගය
 - 3) සිනොසොයික යුගය

පරිණාමික යෙදුම්

- සම්භවය
පූර්වජ ජීවියෙකුගෙන් නව විශේෂයක මුල් ජීවීන් ඇතිවීම
- සනාවාසීකරණය
ශාක හෝ සත්ත්වයින් නිශ්චිත පරිසරයක් තුළ ස්ථාපිත වී අනුවර්තනය වෙමින් හැසිරීම
- විවිධාංගීකරණය
එක් ජීවි විශේෂයක ගහනයක් තුළ ප්‍රවේණික වෙනස්කම් ඇතිවීමෙන් නව විශේෂවල උපගහන ඇතිවීම විවිධාංගීකරණය
- විකිරණය
යම් පරිණාමික මධ්‍ය ලක්ෂයකින් ශාක/සත්ත්ව පූර්වජ බණ්ඩයක් අපසරණය වී විවිධ කාණ්ඩවලට බෙදී යාම

එක් එක් ඉයෝන වලදී සහ පරිණාමික යුග වලදී පෘථිවියේ සිදු වූ සිදුවීම්

- 1) හේඩියන් ඉයෝන (4.6 - 3.8 BYA)
 - පෘථිවියේ උපත
- 2) ආකියන් ඉයෝන (3.8 - 2.5 BYA)
 - පෘථිවියේ ආදිතම පාෂාණය ඇතිවීම
 - ආදිතම සෛල වල පොසිල (ප්‍රාග්‍යන්‍යජීවික) ඇති වීම
 - වායුගෝලීය ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම ආරම්භ වීම

3) ප්‍රොටෙරොසොයික් ඉයෝන (2.5 BYA - 542 MYA)

- ඇල්ගී විවිධත්වය හා මෘදුදේහ සහිත අපෘෂ්ඨවංශී අපෘෂ්ඨවංශී සතුන් ඇති වීම
- සූ න්‍යෂ්ටික සෛල වල පැරණිතම පොසිලය ඇති වීම

4) පැනරොසොයික ඉයෝන (542 MYA - Present)

- මෙම ඉයෝනයේ සිදු වූ සිදුවීම් ඊට අදාළ පරිණාමික යුග වලදී වෙන වෙනම අධ්‍යයනය කරනු ඇත

ජෙලියෝසොයික යුගය

- බොහෝ සත්ත්ව වංශ වල විවිධත්වය ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වීම (Cambrian Explosion)
- කරදිය ඇල්ගාවන් සුලභ වීම
- විවිධ දිලීර, ශාක සහ සතුන්ගේ භෞමික සනාවාසීකරණය
- සනාල ශාක වල විවිධාංගීකරණය
- අස්ථික මත්ස්‍යයන්ගේ විවිධාංගීකරණය, මුල්ම සිවුපාවුන් හා කෘමීන් බිහිවීම
- උභයජීවීන් ප්‍රමුඛ වීම
- සනාල ශාක සහිත වනාන්තර බහුල වීම
- පුර්ම බීජ ශාක බිහිවීම
- උරගයින් බිහිවීම හා විකිරණය
- බොහෝ වර්තමාන කෘමි කාණ්ඩ බිහිවීම
- බොහෝ කරදිය හා භෞමික ජීවීන්ගේ නෂ්ට වීම
- ආදි සනාල ශාක විවිධාංගීකරණය

මියොසොයික යුගය

- කේතුවර ශාක (විවෘත බීජක ශාක) ප්‍රමුඛ වීම
- ඩයිනෝසරයින් පරිණාමය සහ විකිරණය
- ක්ෂීරපායීන්ගේ සම්භවය
- ප්‍රමුඛ ශාක ලෙස අබණ්ඩවම විවෘත බීජ ශාක පැවතීම,
- ඩයිනෝසරයින් ප්‍රමුඛ වීම, බහුල වීම හා විවිධත්වය ඇතිවීම
- සපුෂ්ප ශාක බිහි වීම හා විවිධාංගීකරණය
- ඩයිනෝසරයින් ඇතුළු බොහෝ ජීවි විශේෂ නෂ්ට වීම

සිනොසොයික යුගය

- ක්ෂීරපායීන්, පක්ෂීන් හා පරාගණකාරක කෘමීන්ගේ ප්‍රධාන විකිරණය
- සපුෂ්ප ශාක වල ප්‍රමුඛ වීම ඉහළ යෑම හා විකිරණය, තවදුරටත් සිදුවීම හා ඉහළ යෑම
- බොහෝ වර්තමාන ක්ෂීරපායී ගෝත්‍ර විකිරණය
- බොහෝ ප්‍රයිමේටා කාණ්ඩවල සම්භවය, ක්ෂීරපායීන් හා සපුෂ්ප ශාක වල විකිරණය තවදුරටත් සිදුවීම, ආදිකම මානව පූර්වජයා බිහිවීම
- ද්විපාද මානව පූර්වජයා බිහිවීම
- හෝමෝ ගණය බිහිවීම (Genus Homo)

පරිණාමවාද

- දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ
- පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට
- ගහණයක් තුළ පවතින
- ප්‍රවේණි සංයුතියේ සිදුවන වෙනස් වීම
- පරිණාමය ලෙස හැඳින්වේ
- මේ සඳහා වර්ෂ මිලියන ගණනක් ගතවිය හැකිවේ
- ජීවීන්ගේ පරිණාමය සිදුවන ආකාරය පැහැදිලි කරනු ලබන වාද පරිණාමවාද ලෙස හැඳින්වේ
- පරිණාමවාද කිහිපයකි. එනම්
 1. ලැමාක්වාදය
 2. ඩාවින්-වොලස් වාදය
 3. නව-ඩාවින් වාදය

1. ලැමාක් වාදය

- ලැමාක් විසින් තම කල්පිතය ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ 1809 දී වේ
- මොහු විසින් ප්‍රධාන මූලධර්ම දෙකක් භාවිතයෙන් එම කල්පිතය පැහැදිලි කර ඇත
- එම මූලධර්ම දෙක වන්නේ

1. වහරය හා අවහරය

2. පරිවික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය

1. වහරය හා අවහරය

- මෙහිදී ලැමාක් පවසන පරිදි දේහයක නිරන්තරයෙන් භාවිතා කරනු ලබන අවයව ක්‍රමයෙන් විශාලව සහ ශක්තිමත්ව වැඩෙන අතර
- භාවිතා නොකර සිටින විට එම අවයව ක්‍රමයෙන් පරිහාණියට ලක්වේ

චිහ්‍රණ

අචිහ්‍රණ

2. පරිවික ලක්ෂණ වල සම්ප්‍රේෂණය

- මෙහිදී ලැමාක් පවසන පරිදි ජීවීන් තම ජීවිත කාලය තුළදී උචිත අනුවර්තන ඇති කරගනියි. (ජර්වන ලක්ෂණය)
- එසේම මොවුන් ඇති කරගන්නා මෙම අනුවර්තන තම ප්‍රජනනයන්ට සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව දරයි
- එබැවින් එම පරිසර තුළ ජීවත් වන ජනිතයෝ වඩාත් හොඳින් අදාළ පරිසරයට අනුවර්තනය වී ජීවත් වෙයි

වර්තමාන ජීරාග් සතුන් පරිණාමය වූ ආකාරය ලැමාක් වාදය අනුව පැහැදිලි කිරීම

- වර්තමාන ජීරාග් සතුන්ගේ පූර්වජ ජීවීන් කෙටි ගෙලක් සහිත සතුන් විය
- එම පූර්වජ ජීරාග් සතුන්ට එම කාලයේදී පහළ මට්ටම් වල පැවති ආහාර හිඟ වූ විට ඉහළ මට්ටම් වල පැවති ශාක පත්‍ර කඩා කෑමට නිරන්තරයෙන් ගෙල දිගු කිරීමට සිදුවිය (වහරය)
- එබැවින් එම සතුන්ගේ ගෙල මඳක් දිගුවීම සිදුවිය
- එබැවින් එම පරිවික ලක්ෂණය ප්‍රජනනය මගින් ජනිත ජීවීන්ට සම්ප්‍රේෂණය විය
- මෙය දිගුකාලීනව සිදුවීමෙන් දිගු හා ජෙෂ්මය ගෙලක් දරන ජීරාග් සතුන් පරිණාමය විය

2. ඩාවින්-වොලස් වාදය (ස්වභාවික වරණවාදය)

- වාල්ස් ඩාවින් විසින් ස්වභාවික වරණවාදය ඉදිරිපත් කරන ලදී
- මොහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මතවාදයට සමාන මතවාදයක් ඇල්ෆ්‍රඩ් රසල් වොලස් විසින් ද ඉදිරිපත් කරන ලදී

- ස්වභාවික වරණවාදය වාල්ස් ඩාවින් විසින් ජීවී ගහන වල නිරීක්ෂණ 02ක් හා උපකල්පන 03ක් මත ඉදිරිපත් කර ඇත

- ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිරීක්ෂණ ලෙස

1. අධිජනනය

2. ප්‍රභේදනය දැක්විය හැකි අතර

- ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන ලෙස

1. තරඟය

2. උච්චෝත්තතිය

3. හිතකර ලක්ෂණ වල ස්වභාවික වරණය

දැක්විය හැකිවේ

1. අධිජනනය

- පරිසරයේ ජීවත් වන සෑම ජීවියෙකුම පරිසරයට දරාගත හැකි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ජනිතයින් සංඛ්‍යාවක් බිහි කිරීම අධිජනනයයි

2. ප්‍රභේදනය

- ගහනයක සිටින විශේෂයකට අයත් සාමාජිකයන් අතර ප්‍රවේණික විවිධත්වයක් පැවතීම ප්‍රභේදනයයි
- ගහනයක සිටින, පරිසරයට උචිත ලක්ෂණ දරන ජීවීන්ට
 - එම පරිසර වල නොනැසී පැවතීමට හා
 - ප්‍රජනනයට

ඉහළ විභවතාවයක් ඇත

- එබැවින් ඔවුන් අත් අයට වඩා වැඩි ජනිතයින් සංඛ්‍යාවක් බිහි කරයි
- එසේම ගහනයක පැවැත්මට හා ප්‍රජනනයට හිතකර ප්‍රභේදන නිසා පරම්පරා කිහිපයක් ඔස්සේ ගහනය තුළ වාසිදායක ලක්ෂණ වල වැඩි වීමක් සිදුවේ
- මෙසේ පැවැත්මට හා ප්‍රජනනයට හිතකර වන වාසිදායක ලක්ෂණ සමහරක් පහත දැක්වේ
 - විලෝපිකයන්ගෙන් බේරීම
 - භෞතික තත්ත්ව (පීඩාකාරී තත්ත්ව) වලට ඔරොත්තු දීම
 - ආහාර ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව
 - රෝග වලට දක්වන ප්‍රතිරෝධීතාවය
 - සංසේචන සම්භාවිතාවය
 - නිපදවන ජනිතයින් සංඛ්‍යාව

3. තරඟය

- ස්වාභාවික පරිසරයේ සම්පත් එනම් ආහාර වාසස්ථාන අවකාශය ප්‍රජනනය සීමා සහිත වේ
- එබැවින් මෙම සීමිතව පවතින සම්පත් ලබාගැනීම සඳහා ජීවීන් අතර තරඟය ඇති වේ
- මෙය එකම විශේෂයේ ජීවීන් අතර (අන්තර්විශේෂ තරඟය) හෝ

- වෙනස් විශේෂ වල ජීවීන් අතර (අන්තර්විශේෂ තරඟය) ලෙස ආකාර දෙකකි

4. උච්ඡෝන්තකිය

- තරඟයේදී වඩා වාසිදායක හිතකර ප්‍රභේදන දරනු ලබන ජීවීන් එම පරිසර වල නොනැසී පැවතී
- ඉහළ විභවතාවයකින් ප්‍රජනනය සිදුකර
- වැඩි ජනිතයින් සංඛ්‍යාවක් බිහි කරයි
- මේ නිසා ගහනයේ පැවැත්මට හා ප්‍රජනනයට හිතකර ප්‍රභේදන ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වී ගහනය තුළ හිතකර ප්‍රභේදන ලක්ෂණ දරන ජීවීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වේ

5. ස්වභාවික වරණය

- උච්ඡෝන්තකියේදී උචිත ප්‍රභේදන දරනු ලබන ජීවීන් සංඛ්‍යාව ගහනය තුළ වැඩි වී වරණයට ලක්වීම ස්වාභාවික වරණයයි

3. නව-ඩාවින් වාදය

- චාල්ස් ඩාවින් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ස්වභාවික වරණ වාදය පසුකාලීනව යාවත්කාලීන කිරීමෙන් නව-ඩාවින් වාදය බිහිවී ඇත
- මෙහිදී ජීවීන්ගේ ආවේණිය පැහැදිලි කිරීම සඳහා
 - මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණිය හා
 - ගහන ප්‍රවේණිය

පිළිබඳව දැනුමෙහි සමෝධානයක් ලෙස නව-ඩාවින් වාදය බිහි වී ඇත

- නව-ඩාවින් වාදය මගින් එකම විශේෂයේ ජීවීන් අතර ප්‍රභේදන ඇතිවන්නේ එම ජීවීන් අතර ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය වල සිදුවන සුළු වෙනස්වීම් නිසා බවත්
- මෙසේ ඇතිවන උචිත ප්‍රභේදන තරඟයේදී වරණයට ලක්වී
- ප්‍රජනනයේදී ජන්මාණු ඔස්සේ ඉදිරි පරම්පරාවලට සම්ප්‍රේෂණය වී, ගහනය තුළ එම ප්‍රභේදන වල සංඛ්‍යාතය වැඩිවන බවත් පැහැදිලි කෙරේ

Unit 03 පාරිභව මත ප්‍රේම වර්ධනය Diversity on Earth

ජීවී වර්ගීකරණය (ජීවී විශේෂ ලියාපදිංචි) 10 - 100

- වර්ගීකරණය යනු
 - පොදු ගති ලක්ෂණ වලට අනුව ජීවීන් කාණ්ඩ වලට සැකසීමයි
- වර්ගීකරණ විද්‍යාව යනු
 - ජීවීන් වර්ගීකරණය
 - හඳුනා ගැනීම
 - නාමකරණය සහ
 - විස්තර කිරීම

පිළිබඳව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයයි

- එසේම මෙයට ජීවීන් ද්වාරාවලි අනුපිළිවෙලකට සැකසීම ද ඇතුළත් වේ
- වර්ගීකරණයේ ආකාර දෙකකි
- එනම්
 - 1) කෘතිම වර්ගීකරණය
 - 2) ස්වභාවික වර්ගීකරණය

1) කෘතිම වර්ගීකරණය

- කලින් තීරණය කරන ලද, තෝරාගත් ලක්ෂණ කීපයකට අනුව, ජීවීන් කාණ්ඩ වලට වෙන් කිරීම කෘතිම වර්ගීකරණය නම් වේ
- මෙම ලක්ෂණ අධ්‍යයනයේ පහසුව සඳහා තෝරාගන්නා ලක්ෂණ වේ
- එනම් මෙහිදී පරිණාමික බන්ධුතා නොසැලකේ
- මෙය 18 වන ශතවර්ෂයට පෙර භාවිතා කර ඇති එකම වර්ගීකරණ පද්ධතිය වේ
- මෙය භාවිතා කිරීම පහසුය
- මෙයට තවත් ජීවී කාණ්ඩ එකතු කර පුළුල් කළ හැකිය
- උදා :
 - ශාක - ධාන්‍ය වර්ග, විසිතුරු පැළ, මාංශධාක, විෂ සහිත ශාක ලෙස වර්ග කිරීම
 - සතුන් - ද්විපා, සිව්පා, ෂඩ්පා, අෂ්ටපා, බහුපා ලෙස වර්ග කිරීම

2) ස්වභාවික වර්ගීකරණය

- ජීවීන් අතර පවතින

සත්‍ය පරිණාමික බන්ධුතා ඉස්මතු වන ආකාරයට ජීවීන් කාණ්ඩ වලට වෙන් කිරීම ස්වභාවික වර්ගීකරණය නම් වේ

- මෙහිදී වංශ ප්‍රවේණිය එනම් විශේෂයේ හෝ විශේෂය අයත් කණ්ඩායම් වල පරිණාමික ඉතිහාසය මත පදනම් වූ පරිණාමික බන්ධුතා විදහා දැක්වේ
- මෙම වර්ගීකරණ පද්ධතිය සකස් වී ඇත්තේ ජීවීන්ගේ පරිණාමය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව ය
- මෙහිදී ලක්ෂණ ගණනාවක් මත වර්ගීකරණය පදනම් වේ

ස්වභාවික වර්ගීකරණය පදනම් වන ලක්ෂණ

- ජීවීන්ගේ රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ
- ජීවීන්ගේ ව්‍යුහ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ
- ජීවීන්ගේ සෛල විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ
- ජීවීන්ගේ අණුක ජීව විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ (එනම් DNA හෝ RNA හෂ්ම අනුපිළිවෙල වැනි)

- ස්වභාවික වර්ගීකරණයේදී
 - ශාක - බ්‍රයෝපයිටා, ටෙරෝගයිටා, සයිකඩොගයිටා, කොනිෆෙරොගයිටා සහ ඇන්තොගයිටා ලෙස වංශ වලට ද ,
 - සතුන් - නිඩාරියා, ප්ලැටිහෙල්මින්තෙස්, නෙමටෝඩා සහ ඇනෙලිඩා ලෙස වංශ වලට ද වර්ග කිරීමට හැකි වේ

වර්ගීකරණයේ ඉතිහාසය

ඇරිස්ටෝටල් මුලින්ම විද්‍යාත්මක වශයෙන් වර්ගීකරණය කර ඇත

- * ජීවීන්ව ශාක හා සතුන් ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම
 - * සත්ත්වයින්ව
 - සංවරණ විධි
 - ප්‍රජනන විධි
 - රතු රුධිර සෛල ඇති නැති බව
- යනාදී ලක්ෂණ මත වර්ග කිරීම

තිශ්‍යෝජ්‍යත්වය (ඇරිස්ටෝටල්ගේ ශිෂ්‍යයෙකි)

- * ශාක වල දේහ විලාසය අනුව
 - වෘක්ෂ
 - පඳුරු
 - පැළෑටි ලෙසද

- * ශාක වල ජීවන කාලය අනුව
 - ඒකවාර්ෂික
 - ද්විවාර්ෂික
 - බහුවාර්ෂික ලෙස

වර්ග කිරීම

කැරොලස් ලිනේයස් (1753)

- * ද්විපද නාමකරණය හඳුන්වා දීම
- * ශාක 6000ක් පමණ
 - විශේෂය
 - ගණය
 - ගෝත්‍රය
 - වර්ගය

යන වර්ගීකරණ මට්ටම් අඩංගු තක්සෝන ද්විරාවලියකට අනුව වර්ග කිරීම

- * සපුෂ්ප ශාක වර්ගීකරණයේදී ඒවායේ පුෂ්ප වල අඩංගු
 - රේණු ගණන
 - කීල ගණන

යන ලක්ෂණ පදනම් කර ගත්තේය

- * ශාක හා සත්ත්ව රාජධානි දෙක හඳුන්වා දීම

- * අන්වීක්ෂීය සොයා ගැනීමත් සමග ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අනාවරණය කර ගැනීම සිදු විය
- * ඒත් සමග ශාක හෝ සතුන් ලෙස වර්ගීකරණය කළ නොහැකි ජීවීන් ඇති බව විද්‍යාඥයින් වටහා ගත්හ

ඇරිස්ටෝ තේකර් (1866)

- * කුන්චන රාජධානියක් ලෙස ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය හඳුන්වා දීම
- * එම රාජධානිය යටතේ බොහෝ ජීවීන් වර්ගීකරණය කිරීම
- * වංශය යන තක්සෝනය හඳුන්වා දීම
- * බොහෝ ජීවීන්ගේ වර්ගීකරණය සිදු කිරීම

- * ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂීය සොයා ගැනීමත් සමග ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික සහ සූ න්‍යෂ්ටික සෛල සංවිධාන විද්‍යාඥයින් විසින් අනාවරණය කරගනු ලැබිණි

රොබට් හව්. විටේකර් (1969)

- * රාජධානි 5කින් යුතු වර්ගීකරණ පද්ධතිය හඳුන්වා දීම.
- * එහි අඩංගු වූ රාජධානි පහ නම්
 - මොනෙරා
 - ප්‍රොටිස්ටා
 - දිලීර
 - ප්ලාන්ටේ
 - ඇනිමාලියා

- * මොනෙරා වර්ගීකරණය (ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික සෛල)
 - සෛලීය සංවිධානයේ ස්වභාවය
 - ඒකසෛලික හා බහුසෛලික බව
 - පෝෂණ විලාසය

ආදිය මත පදනම් විය

- * ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය හා ජීවයේ ඒකීය සම්භවය පිළිබඳ මතය පිළිගැනීමත් සමග පරිණාමික බන්ධුතා අර්ථකථනය සඳහා වර්ගීකරණ විද්‍යාඥයෝ ස්වභාවික පද්ධති භාවිතයට යොමු විය

- * අණුක ජීව විද්‍යාව පිළිබඳව නූතන දැනුම වර්ධනයත්
- * පරිණාමික බන්ධුතා අධ්‍යයනය සඳහා අණුක ක්‍රමවේද යොදා ගැනීමත් නිසා
- * ආදි පරිණාමයේදී සමහර ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටිකයන් අතර පැවති වෙනස්කම් මවුන් හා සූ න්‍යෂ්ටිකයන් අතර පැවති වෙනස්කම් වලටද වඩා බොහෝ සෙයින් අධික බව තහවුරු විය


- * මේ අපහසුතා නිසා අධිරාජධානි නූතන වර්ගීකරණ පද්ධතියක් තෝරා ගැනීමට වර්ගීකරණ විද්‍යාඥයින් යොමු වී ඇත.

කාල් වුස් (1977)

- * අධිරාජධානි 3කින් යුතු වර්ගීකරණ පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම
- * එහි අඩංගු වූ අධිරාජධානි තුන නම්
 - බැක්ටීරියා
 - ආකියා
 - ඉයුකාරියා
- * මෙම අධිරාජධානි හෙවත් ඩොමේන, රාජධානි වලට වඩා ඉහළින් පවතින තක්සේරු මට්ටම් වේ



- * මෙම ජීව පරිණාමික ක්‍රියාවලියේදී බැක්ටීරියා අනෙකුත් ජීවීන්ගෙන් අපසරණය වීම
- * ඉතිහාසයේ සිදුවූ පළමු ප්‍රධාන භේදනය යි
- * එබැවින් බැක්ටීරියා අධිරාජධානියට වඩා යුකාරියා හා ආකියා අධිරාජධානි එකිනෙකට වඩාත් සමීප සම්බන්ධතා සහිත වී ඇත



වර්තමාන වර්ගීකරණ පද්ධතිය හා එහි පදනම

- වර්තමාන වර්ගීකරණ පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන් පාදක වී ඇත්තේ අණුක ජීව විද්‍යාවේ ශිෂ්‍ය දියුණුව සහ ජීවීන්ගේ පරිණාමික බන්ධුතා පිළිබඳව ඇති නව තොරතුරු මතයි

නවීන වර්ගීකරණ පද්ධති පදනම් වී ඇති නිර්ණායක

- 1) වැදගත් ජානවල DNA හි හඟුම අනුපිළිවෙල
- 2) මයිටොකොන්ඩ්‍රියා සහ හරිකලව DNA වල හඟුම අනුපිළිවෙල
- 3) රයිබොසෝම RNA හි හඟුම අනුපිළිවෙල
- 4) සුලභ ප්‍රෝටීන්වල ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙල
- 5) සෛලීය සංඝටක වල අණුක ව්‍යුහය

වර්තමාන වර්ගීකරණ පද්ධතියේ දූර්වලතා

- 1) ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය කෘතිම කාණ්ඩයක් වීම (එනම් ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය ස්වභාවික වර්ගීකරණ කාණ්ඩයක් නොවේ. එය විවිධ පරිණාමික සම්භවයන් සහිත ජීවීන්ගෙන් සමන්විත වේ)
- 2) වෛරස වර්ගීකරණයට ක්‍රමවේදයක් නොමැති වීම (වෛරස වලට සෛල සංවිධානයක් නොමැති බැවින් ඔවුන් කිසිම රාජධානියකට අයත් නොවේ. එසේම මොවුන් කෘතිම කාණ්ඩයක් ලෙසද සළකනු ලැබේ)

අධිරාජධානියේ සිට විශේෂ දක්වා තක්සේරු වල ධුරාවලි අනුක්‍රමය

- තක්සේරු ධුරාවලිය
විශාල වර්ගීකරණ තක්සේරුයක සිට ක්‍රමයෙන් සංකීර්ණත්වය අඩුවන තක්සේරුයක් දක්වා පිළියෙල කළ තක්සේරු අනුපිළිවෙලක්, තක්සේරු ධුරාවලියක් ලෙස හඳුන්වයි
- තක්සේරුය
තක්සේරු ධුරාවලිය තුළ පවතින ඕනෑම මට්ටමක වර්ගීකරණ ඒකකයක් තක්සේරුයක් ලෙස හැඳින්වේ

මෙම තක්සේරු වලට නිශ්චිත නමක් හා මට්ටමක් පවතී





Figure 26.3 Linnaean classification. At each level, or "rank,"

- තක්සේරුකරණයේ සෑම අධිරාජධානියක්ම රාජධානිය වලට ද
- රාජධානිය වංශ වලට ද යනාදී ලෙස බෙදා තිබේ
- මෙහි වූ ප්‍රධාන තක්සේරුකරණ නැවත උප කොටස් වලට බෙදිය හැකිය

උදා :
 උපරි වර්ගය
 උප කුලය
 උප විශේෂය

එක් ජීවී විශේෂයක ගහනයක් තුළ ප්‍රවේණික වෙනස්කම් ඇතිවීමෙන් නව විශේෂවල උපගහන ඇතිවීම විවිධාංගීකරණය

- අධිරාජධානියේ සිට විශේෂය දක්වා යෑමේදී තක්සේරුකරණය සාමාජිකයින් අතර ඇති පොදු ලක්ෂණ සංඛ්‍යාව වැඩිවන නමුත් ජීවීන් සංඛ්‍යාව අඩුවේ
- විශේෂයේ සිට අධිරාජධානිය දක්වා යෑමේදී තක්සේරුකරණය සාමාජිකයින් අතර ඇති පොදු ලක්ෂණ සංඛ්‍යාව අඩුවන නමුත් ජීවීන් සංඛ්‍යාව වැඩිවේ

විශේෂය සඳහා වන අර්ථ දැක්වීම්

1) ජෛව විද්‍යාත්මක අර්ථ දැක්වීම

- සමාන ලක්ෂණ පොදුවේ දරන
- අන්තරාභිජනනයෙන් ජීවී හා සරුජනිතයින් නිපදවිය හැකි ජීවීන් කණ්ඩායමක්
- විශේෂයක් නම් වේ

2) රූප විද්‍යාත්මක විශේෂ සංකල්පය

- ශරීර හැඩය සහ වෙනත් ව්‍යුහ ලක්ෂණ වැනි රූප විද්‍යාත්මක නිර්ණායක භාවිතා කර ජීව විශේෂ වෙන් කර හඳුනා ගැනීම

3) පරිසර විද්‍යාත්මක විශේෂ සංකල්පය

- ජීවී විශේෂයක පරිසර නිකේතනය හා විශේෂයේ සාමාජිකයන් පරිසරයේ ජීවී සහ අජීවී සංඝටක සමග සිදුකරන අන්තර්ක්‍රියා සියල්ලේම එකතුව සළකා බලමින් අර්ථ දැක්වීම

4) වංශ ප්‍රවේණික විශේෂ සංකල්පය

- පොදු පූර්වජයෙකුගෙන් පැවත එන ඒකකයන්ගේ කුඩාම කණ්ඩායම විශේෂය ලෙස අර්ථ දැක්වීම

ද්විපද නාමකරණය

- වර්ගීකරණයේදී ජීවීන් සඳහා සාමාන්‍ය නම් භාවිතා කිරීම අවුල් සහගත තත්ත්ව වලට හේතු වේ
- එනම් සාමාන්‍ය නම් භාවිතයේදී ජීවියාගේ සත්‍ය ස්වරූපය විස්තර නොවේ

උදා :

- ජෙලි ෆිෂ් (Jelly Fish) - නිධාරියාවෙකි
- පොකිරිස්සා (Cray Fish) - ක්‍රස්ටේසියාවෙකි
- කාවා (Silver Fish) - කෘමියෙකි
- තාරකා මාළුවා (Star Fish) - එකපිහිටිකර්මීයාවෙකි

- එසේම යම් ජීවියෙකු විවිධ භාෂා අනුව නම් භාවිතා කිරීම ද එවැනි අවුල් සහගත තත්ත්වයකි

- එබැවින් මෙම විෂයක්ෂේපය බැහැර කිරීම සඳහා කැරොලස් ලිනේයස් විසින් අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් වන ද්විපද නාමකරණ ක්‍රමය යෝජනා කරන ලදී

- ද්විපද නාමකරණය අනුව ජීවියෙකුගේ නම කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ

- එනම්

1. ගණ නාමය - නාම පදයකි (විශේෂය අයත් වන ගණයේ නාමය)
2. පුළු නාමය - විශේෂණ පදයකි (විශේෂයට අයත් අනන්‍ය වූ නාමය)

- උදා : *Homo sapiens*
Homo - මිනිසා
sapiens - බුද්ධිමත්

- සමීප බන්ධුතා සහිත විශේෂ එකම ගණ නාමය දරන නමුත් වෙනස් පුළු නාම දරයි

- උදා : *Dipterocarpus zeylanicus*
පියාපත් දෙකක් දරන එල සහිත ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික

Dipterocarpus grandiflorus
පියාපත් දෙකක් දරන එල සහිත විශාල පුෂ්ප සහිත

ද්විපද නාමකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංකේත

- ජීව විද්‍යාඥයින් විසින් නාමකරණයට අදාළ නීති සහ සංකේත හඳුන්වා දී ඇත
- මෙම සංකේත සතුන්, ශිලීර, බැක්ටීරියා සහ වෛරස සඳහා එකිනෙකින් පුළු වශයෙන් වෙනස් වේ

ද්විපද නාමකරණයේ වැදගත් නීති

1. ජීව විශේෂ දෙකකට එකම නාමය තිබිය නොහැකිය
2. සෑම විශේෂයකටම ගණ නාමයක් හා පුළු නාමයක් ඇති අතර මෙම නාම දෙකේ එකතුවෙන් විශේෂ නාමය හෝ විද්‍යාත්මක නාමය සෑදේ
(ගණ නාමය + පුළු නාමය = විශේෂ නාමය)
3. නාමය ලතින් හුරුවක් ඇති වචන වන අතර

4. එය රෝමන් අකුරු භාවිතයෙන් ලිවිය යුතුය
5. විද්‍යාත්මක නාමය අත් අකුරින් ලියන විට එම නාමය යටින් ඉරක් ඇඳිය යුතු අතර
6. මුද්‍රණය කරන විට ඇල අකුරු (*Italics*) භාවිත කළ යුතුය
7. ගණ නාමයේ මුල් අකුර ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරක් විය යුතු අතර
8. විශේෂ නාමය ඉංග්‍රීසි සිම්පල් අකුරින් ලිවිය යුතුය
9. විද්‍යාත්මක කාර්යයන් වලදී නාමය හඳුන්වා දුන් විද්‍යාඥයාගේ නම ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරකින් කෙටි කර දැක්වීමකින් හෝ සම්පූර්ණ නම ලෙසින් හෝ විද්‍යාත්මක නාමයේ අවසානයට දක්වනු ලැබේ. (මෙය ලතින් හුරුවක් ඇති වචනයක් නොවේ)

උදා : *Cocos nucifera* L. (මෙහි L යනු Linnaeus වේ)

10. උප විශේෂ හෝ උප ප්‍රභේද හැඳින්වීම සඳහා තෙවැනි පදයක් යොදාගත හැකි වේ

උදා : *Panthera pardus kotiya*
(ශ්‍රී ලංකා දිවියා)

අධිරාජධානි

- අධිරාජධානි 3කි. එනම්

1. බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය
2. ආකියා අධිරාජධානිය
3. යුකැරියා අධිරාජධානිය


1. බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය

- එක් රාජධානියකින් සමන්විත වේ
- එය බැක්ටීරියා රාජධානිය ලෙස හැඳින්වේ



බැක්ටීරියා අධිරාජධානියේ ජීවිතයේ ප්‍රධාන

බැක්ටීරියාවන් විවිධ පෝෂණ විලාස අනුගමනය

ලාක්ෂණික ලක්ෂණ **6.66 (2) නි 0 ඉල්ලීම (කොට්ඨාස) කරයි.** එනම්,



- 1) ප්‍රභාස්වයංපෝෂී
- 2) ප්‍රභාවිෂමපෝෂී
- 3) රසායනික ස්වයංපෝෂී
- 4) රසායනික විෂමපෝෂී



- ඔවුහු ප්‍රාග්‍යන්‍යජීවිකයෝ වෙති
- ඒකසෛලික ජීවීන් වෙති
- ගණාවාසී වෙති
- සූත්‍රිකාමය වෙති
- ඔහුන්ගේ $1 \mu m$ $5 \mu m$ සිට දක්වා තරමින් යුතු වේ
- සාමාන්‍ය වාසස්ථාන (එනම් ජලජ හා භෞමික) සඳහා හොඳින් අනුවර්තනය වී ඇත
- බොහෝ ජීවීන්ගේ සෛල බිත්ති වල පෙප්ටිඩෝග්ලයිකන් සංඝටකයක් ලෙස පවතී
- පෙප්ටිඩෝග්ලයිකන් පවතින ජීවීන්ගේ සෛල බිත්ති වල පෙප්ටිඩෝග්ලයිකන් පවතින ප්‍රමාණය අනුව ඔවුන් ආකාර දෙකකි. එනම්

1) ග්‍රෑම් ධන

2) ග්‍රෑම් සෘණ

- වැඩි දෙනෙකුගේ සෛල බිත්තිය ඇලෙන සුළු පොලිසැකරයිඩ ස්තරයකින් හෝ ප්‍රෝටීනමය ප්‍රාවරයකින් ආවරණය වී ඇත
- මොවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වලනය සඳහා කෘෂිකා දරති

ඡායාරූප


- නමුත් මෙම ප්‍රාග්‍යන්‍යජීවික කෘෂිකා

1) ජලාස්ම පටලයකින් ආවරණය නොවීම

2) ක්ෂුද්‍රජාලිකා 9+2 ව්‍යුහය නොදැරීම

යන කරුණු නිසා සූ න්‍යෂ්ටික කෘෂිකා වලින් වෙනස් වේ

ඡායාරූප භාලය.



- බැක්ටීරියාවන් විවිධ පරිවෘත්තීය ආකාර දරයි. එනම්,

- 1) අනිවාර්ය ස්වායු
- 2) අනිවාර්ය නිර්වායු
- 3) ක්ෂුද්‍රවාතකාමී
- 4) වෛකල්පික නිර්වායු

- සමහර බැක්ටීරියාවන්ට නයිට්‍රජන් නිරතර්මේ හැකියාව පවතී

උදා : *Rhizobium* විශේෂ

සමහර සයනොබැක්ටීරියා

- මෙය ඔවුන් සතුව නයිට්‍රජන් නිරතරක පටල හා නයිට්‍රජන් ස් එන්සයිමය පැවතීම මත තීරණය වේ
- ද්විබැක්ඪණය මගින් මොවුන්ට වේගවත්ව අලිංගික ප්‍රජනනයද

- සමහරුන්ට සංයුත්මනය (විශේෂිත ලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රමයකි) මගින් ලිංගික ප්‍රජනනයද සිදු කළ හැකි වේ
- සමහර බැක්ටීරියාවෝ බැක්ටීරියා හරිතප්‍රද (බැක්ටීරියෝ ක්ලෝරොෆිල්) ප්‍රභාසංස්ලේෂක වර්ණක ලෙස භාවිතා කරමින් ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සිදු කරයි


සයනොබැක්ටීරියාවන්ගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණික ලක්ෂණ



Oscillatoria, a filamentous cyanobacterium

- මොවුන් බැක්ටීරියා අධිරාජධානියටම අයිති ජීවීන් වේ
- එබැවින් මොවුන් ප්‍රාග්‍යාප්තිකයන් වේ
- ප්‍රභාසංස්ලේෂී ජීවීන් වේ
- බහුතරයක් ජීවීන් ඒක සෛලික සහ කේවල වන අතර
- සමහරු නානුකොපුවකින් වටවූ සූත්‍රිකා හෝ ඝනාවාස සාදයි
- මොවුන් ඔක්සිජන් නිපදවීම සිදුකරයි
- සමහරුන්ට වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් තිරකිරීමට හැකියාව පවතී

2. ආකියා අධිරාජධානිය



A Figure 27.17 Extreme thermophiles. Orange and yellow colonies of thermophilic prokaryotes grow in the hot water of Yellowstone National Park's Grand Prismatic Spring.

මොවුන් ප්‍රාග්‍යාප්තිකයෝ වෙති

ඒකසෛලික ජීවීන් වෙති

මොවුන්ගේ සෛල බිත්ති ප්‍රෝටීන හා පොලිසැකරයිඩ වලින් සැදී ඇත

- විශේෂයෙන්ම මොවුන්ගේ සෛල බිත්ති වල පෙප්ටිඩෝග්ලයිකාන් අඩංගු නොවේ
- බහුතරයක් ජීවීන් සිට දක්වා තරමින් යුතු වේ
- මොවුන් ආන්තික පරිසර වල බහුලව වාසය කරයි
 - 1) ආන්තික ලවණකාමී
 - 2) ආන්තික තාපකාමී
- නමුත් මධ්‍යස්ථ පරිසර වලද සමහර ආකිබැක්ටීරියාවන් ජීවත් වෙති

උදා : මීතේජනක බැක්ටීරියා (Methanogens)
- සමහර ආකියාවන් ගවයන් වේයන් හා වෙනත් ශාකභක්ෂකයන්ගේ ආහාර මාර්ග තුළ නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ වාසය කරයි

3. යුකැරියා අධිරාජධානිය

- මොවුන් සූ න්‍යෂ්ටික ජීවීන් වෙති
- මොවුන් තරමින් විවිධ වේ
- බහුතරයක් සූ න්‍යෂ්ටිකයන් බහුසෛලික වෙති
- මොවුන්ගේ වාසස්ථාන විවිධ වේ
- පෝෂණ ආකාරද විවිධ වේ
- මොවුහු බහුතරය ස්වායු ජීවීන් වේ
- මොවුන් බහුතරයක් ලිංගික ප්‍රජනනය පෙන්වයි

(නමුත් සමහර ප්‍රොටිස්ටාවන් අලිංගික ප්‍රජනනය පමණක් සිදු කරයි)

අධිරාජධානි තුනෙහි සත්සන්දනය

ලාක්ෂණික ලක්ෂණ	බැක්ටීරියා	ආකියා	යුකාරියා
සෛලීය සංවිධානය	ද්‍රව්‍යීය ක්‍රමය.	ද්‍රව්‍යීය ක්‍රමය.	සූක්ෂ්ම ක්‍රමය.
සෛල බිත්ති සංයුතිය	ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ, පොලිසැකරයිඩ්	ප්‍රෝටීන් හා පොලිසැකරයිඩ්	ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ, පොලිසැකරයිඩ්, ජෙලි, පෙප්ටික් ලිපිඩ
පටල ලිපිඩ	ශාලිත, ග්‍රේඩ්, හයිඩ්‍රොකාබන් ද්‍රව්‍ය	හයිඩ්‍රොකාබන් ද්‍රව්‍ය, ජලාශ්‍රිත ද්‍රව්‍ය	ශාලිත, ග්‍රේඩ්, හයිඩ්‍රොකාබන් ද්‍රව්‍ය
ජාන සංයුතිය			
DNA සමග බැඳුණු හිස්ටෝන ප්‍රෝටීන	නැත	හයිඩ්‍රොජන් බන්ධන	දෘඪ
වක්‍රාකාර වර්ණදේහ	දෘඪ	දෘඪ	වක්‍රාකාර, වර්ණදේහ
ජානවල ඉන්ට්‍රෝන ඇතුළත් වීමේදී (ප්‍රෝසෙස්සය)	නැත	හයිඩ්‍රොජන් බන්ධන	බොහෝ ජානවල දී
ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය			
RNA පොලිමරේස්	එකම ආකාරයක්	බොහෝ ආකාර දී	බොහෝ ආකාර දී
ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයේ ආරම්භක ඇමයිනෝ අම්ලය	මෙතියොනීන්	මෙතියොනීන්	මෙතියොනීන්
ප්‍රතිජීවක සංවේදීතාවය (Streptomycin, Chloramphenicol)	වර්ධනය නැතිවීම (නොවේ)	වර්ධනය නැතිවීම (නොවේ)	වර්ධනය නැතිවීම (නොවේ)
100 °C ට වැඩි උෂ්ණත්ව වල වර්ධනය	නැත	හයිඩ්‍රොජන් බන්ධන	නැත
වාසස්ථාන	විවිධ වාසස්ථාන	දෘඪ, නිශ්චල, ජලාශ්‍රිත, ද්‍රව්‍ය, ලිපිඩ, ලිපිඩ	විවිධ වාසස්ථාන
උදාහරණ	<u>Anaerobes</u> <u>Nostoc</u>	<u>Holobacteria</u> <u>Thermococcus</u> <u>Methanobacterium</u> <u>Methanococcus</u>	ප්‍රොටිස්ටා, දිලීර, ශාක, කෘකු

Unit 03 රාජධානි වල විවිධත්වය Diversity of Kingdoms

ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියේ ජෛව විවිධත්වය

ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ

- බහුතරයක් ජීවීන් ඒකසෛලික වේ
- අනෙකුත් ජීවීන් ගණාවාසී හෝ බහුසෛලික වේ
- මෙය බහුවංශික කණ්ඩායමකි
(එනම් මෙම වංශයේ ජීවීන් එක් පූර්වජයෙකුට වඩා වැඩි ගණනකින් සම්භවය ලබා ඇත)
- එබැවින් මොවුන් කෘතීම වර්ගීකරණ කණ්ඩායමකි
- ප්‍රොටිස්ටාවන්
 - මිරිදිය ✓
 - කරදිය ✓
 - කෙත.පස

කුළු වාසය කරයි

- සමහර ජීවීන් සහජීවී ආකාර වෙති
- පෝෂණ ක්‍රම සැලකූ විට
 - ප්‍රභාස්වයංපෝෂී
 - විෂමපෝෂී
 - මිශ්‍ර පෝෂී


පෝෂණ ක්‍රම පෙන්වයි

- ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියේ ජීවීන් සඳහා නිදසුන් ලෙස
 - 1) *Euglena*
 - 2) *Paramecium*
 - 3) *Amoeba*
 - 4) *Ulva*
 - 5) *Gelidium*
 - 6) *Sargassum*
 - 7) *Diatoms*

1) *Euglena*


- කරදිය හෝ මිරිදිය වාසී ජීවීන් වේ
- ඒකසෛලික ජීවීන් වේ
- සෛල බිත්තියක් නැති නමුත් ප්‍රෝටීනමය ජවිකාවක් පවතී
- කශිකා එකක් හෝ දෙකක් පවතී
- ඒවා ශීලී පවතින මධ්යක් එක් අන්තයක තිබේ
- හරිතලව ඇත
- අක්ෂිලප පවති සංකෝචක රික්තක පවතී

විෂම පෝෂී හා සමයුග්‍රහණී ෨. (විශ්‍රාමය)




2) *Paramecium*

- මිරිදිය වාසී වේ
- ඒකසෛලික වේ
- සෛල බිත්තියක් නැති නමුත් ප්‍රෝටීනමය ජවිකාවක් පවතී මහා නාෂ්ටිය සහ ක්ෂුද්‍ර නාෂ්ටිය ලෙස ආකාර දෙකක නාෂ්ටි පවතී
- සෛලය මතුපිට සම්පූර්ණයෙන්ම පක්ෂම වලින් වැසී ඇත
- සංකෝචක රික්තක පවතී
- ආහාර රික්තක පවතී
- ආහාර අධිග්‍රහණය සඳහා මොබ ඇලියක් ඇත
- විෂමපෝෂී වේ



3) *Amoeba*

- ජලජ විශේෂ කරදිය හෝ මිරිදිය වාසී වේ
- අනෙකුත් විශේෂ පරපෝෂී වේ
- ඒකසෛලික වේ
- සෛල බිත්තියක් හෝ ප්‍රෝටීනමය ජවිකාවක් නොපවතී
- එබැවින් නිශ්චිත හැඩයක් නොමැත
- සංවරණය සහ ආහාර ගැනීම සඳහා ව්‍යාප්ත සාදයි
- සංකෝචක රික්තක පවතී
- ආහාර රික්තක පවතී
- විෂමපෝෂී වේ




4) *Ulva*

- කරදිය වාසි වේ
- බහුසෛලික හා මහේක්ෂීය වේ
- සෛල බිත්ති පවතී
- සෛල බිත්ති සංඝටක ලෙස
 - සෙලියුලෝස් පවතී
- බහුසෛලික තලස
 - පත්‍ර වැනි තලයකටත්
 - මුල් වැනි අවුල්පාසුවකටත්

විභේදනය වී පවතින කොළ පැහැති බැවින් 'හරිත ඇල්ගී' ලෙස හඳුන්වයි

- ප්‍රභාසංස්ලේෂක වර්ණක ලෙස
 - ක්ලෝරෆිල් a
 - ක්ලෝරෆිල් b
- සංචිත ආහාරය පිෂ්ටය වේ



5) *Gelidium*

- කරදිය වාසි වේ
- බහුසෛලික හා මහේක්ෂීය වේ
- සෛල බිත්ති පවතී
- සෛල බිත්ති සංඝටක ලෙස
 - සෙලියුලෝස්
 - ඒගාර් පවතී
- බහුසෛලික තලසක් පවතී
- මුල් වැනි අවුල්පාසුවක් පවතී
- කොළ පැහැයට හුරු රතු පැහැති බැවින් 'රතු ඇල්ගී' ලෙස හඳුන්වයි
- ප්‍රභාසංස්ලේෂක වර්ණක ලෙස
 - ක්ලෝරෆිල් a
 - ක්ලෝරෆිල් d
 - ෆයිකොබිලිප්‍රෝටීන් පවතී
- සංචිත ආහාරය ෆ්ලොරිඩයන් පිෂ්ටය වේ




6) *Sargassum*

- කරදිය වාසි වේ
- බහුසෛලික හා මහේක්ෂීය වේ (සාපේක්ෂව විශාල සහ සංකීර්ණ වේ)
- සෛල බිත්ති පවතී
- සෛල බිත්ති සංඝටක ලෙස
 - සෙලියුලෝස්
 - ඇල්ජිනික් අම්ලය පවතී
- බහුසෛලික තලස
 - පත්‍ර වැනි තලයකටත්
 - කඳක් වැනි වෘත්තයකටත්
 - මුල් වැනි අවුල්පාසුවකටත්

විභේදනය වී පවතී

- බහුසෛලික වායු පිරුණු උත්ප්ලාවක/ඉපිල්ලා ලෙස හඳුන්වන ව්‍යුහ පවතී
- මේවා තලස ජලය මත පාවීමට ආධාරක සපයයි
- ඔලිවි කොළ පැහැති හෝ දුඹුරු පැහැති බැවින් දුඹුරු ඇල්ගී ලෙස හඳුන්වයි
- ප්‍රභාසංස්ලේෂක වර්ණක ලෙස
 - ක්ලෝරෆිල් a
 - ක්ලෝරෆිල් c
 - සැන්තොෆිල් පවතී
- සංචිත ආහාරය ලැබීමෙන් වේ

- සංචිත ආහාරය
 - ක්‍රිසොලැමිනාරින්
 - තෙල් වේ



shutterstock.com • 2086179709

ගත්ති රාජධානියේ ජෛව විවිධත්වය

ගත්ති රාජධානියේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ


- සුන්‍යාජවික ජීවීන් වේ
- මොවුන් සෛල බිත්ති දරයි
- සෛල බිත්ති ශක්තිමත් නමායිලී පොලිසැකරයිඩයක් වන කයිටින් වලින් සැදී ඇත
- විවිධ විශේෂ විශෝජකයින් පරපෝෂීන් සහ අන්‍යන්‍යාධාර සංගම් ලෙස ජීවත් වේ
- මොවුන් අවශෝෂක විෂමපෝෂීන් වේ
- එනම් සංකීර්ණ අණු සරල අණු බවට බිඳ හෙලන බහිස්සෛලීය එන්සයිම ප්‍රාචය කරයි
- මොවුන් සුළු සංඛ්‍යාවක් ඒකසෛලික වන අතර අනෙකුත් දිලීර බහුසෛලික වේ
- මෙම බහුසෛලික ආකාර හයිෆා (දිලීර සූත්‍රිකා) දරයි
- මෙම දිලීර සූත්‍රිකා / හයිෆා ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකකි

7) Diatoms (භිදු ශාඛිමක නිමය රිණවෝ)

- කරදිය හෝ මිරිදිය වාසී වේ
- ඒකසෛලික වේ
- සෛල බිත්ති පවතී
- මෙම සෛල බිත්ති විදුරු ආකාර වන අතර
- සිලිකා සහිත අතිපිහින වන කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ
- සෛල බිත්ති සංඝටක ලෙස
 - පෙක්ටින්
 - සිලිකා පවතී

විභේදනය වී පවතී

- මොවුන්ගේ හැඩය හා පෘෂ්ඨයේ ඇති සලකුණු අනුව විශාල විවිධත්වයක් දක්වයි
- රත්වත් දුඹුරු පැහැති බැවින් රත්වත් දුඹුරු ඇල්ගී ලෙස හඳුන්වයි
- ප්‍රභාසංස්ලේෂක වර්ණක ලෙස
 - ක්ලෝරෆිල් a
 - ක්ලෝරෆිල් c
 - කැරොටීන්
 - සැන්තොෆිල් පවතී



1) සාවාර දිලීර සූත්‍රිකා


- ආචාර / හරස් බිත්ති මගින් දිලීර සූත්‍රිකා සෛල වලට බෙදී පවතී
- මයිටොකොන්ඩ්‍රියා රයිබොසෝම න්‍යෂ්ටි වැනි ඉන්ද්‍රියකාවලට වලනයට ඉඩ දෙන සිදුරු ආචාර වල පිහිටයි (බහු 66 ඡුලික)

2) නිරාවාර සංසෛලික දිලීර සූත්‍රිකා

- මෙම දිලීර වල ආචාර නොමැත
- නමුත් මෙවැනි දිලීර සූත්‍රිකා බහුන්‍යාජවික වේ (ඡු 066 ඡුල්)




- ඛනුසෙලික දිලීර මෙම දිලීර සූත්‍රිකා මගින් දිලීර ජාලයක් සෑදීම සිදුවේ
- මෙම දිලීර ජාලය දිලීර මයිසීලියම ලෙස හැඳින්වේ




- මෙහි අතු බෙදුනු දිලීර සූත්‍රිකා අඩංගු වේ
- මෙය පෝෂක අවශෝෂණ පාෂණික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි කිරීමට දායක වේ
- සමහර දිලීර ශෝෂක දරයි

- මෙම ශෝෂක
 - විනිවිදීමට
 - ශාක හා දිලීර අතර ද්‍රව්‍ය හුවමාරුවට
 - ශාක හා දිලීර අතර ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණයට දායක වේ




- දිලීර මගින් බීජාණු නිපදවීම සිදුවේ
- එසේම ලිංගික හා අලිංගික ප්‍රජනනය පෙන්වයි



- ෆන්ගි රාජධානියට අදාළ ප්‍රධාන වංශ පහත පරිදි වේ
 - 1) Chytridiomycota වංශය
 - 2) Zygomycota වංශය
 - 3) Ascomycota වංශය
 - 4) Basidiomycota වංශය

1) Chytridiomycota වංශය

- උදා : **Chytridium**
- කරදිය, මිරිදිය හෝ භෞමික වේ
 - ඇතැම් ආකාර මෘතෝපජීවී වේ
 - අනෙක් ආකාර පරපෝෂී වේ
 - ඒකසෙලික හෝ ඛනුසෙලික වේ
 - ඒක සෙලික ආකාර ගෝලාකාර තනිසෙල ලෙස පවතී
 - ඛනු සෙලික විශේෂ සංසෙලිකයි
 - ඛනුසෙලික ආකාර දිලීර සූත්‍රිකා මගින් ගණාවාස සාදයි
 - ප්‍රජනනය සඳහා කයිකාධර වල බීජාණු නිපදවයි
 - සෙල බිත්ති කයිටින් වලින් සෑදී ඇත




ආයුර්වේදය
 වෛද්‍ය ආකරය
 භෞත ආකරය
 ශ්‍රී ලංකා

2) Zygomycota වංශය

උදා : *Mucor, Rhizopus*

- බොහෝ ජීවීන් මාකෝපර්වීන් වේ
- සමහරු පරපෝෂී හෝ සහභෝජී වේ
- දිලීර ජාලය සංසෙලික හා නිරාවාර වන අතර
- ප්‍රජනක සෛල සෑදෙන ස්ථාන වල පමණක් ආවාර ඇති වේ
- අලිංගික ප්‍රජනනය
 - ප්‍රවේණිකව සමාන ඒකගුණ බීජාණු
 - බීජාණුයානි තුළ අන්තර්ජනාව නිපදවේ
 - එබැවින් මෙම බීජාණු, බීජාණුයානිබීජාණු ලෙස හැඳින්වේ
- ලිංගික ප්‍රජනනය
 - නාෂ්ටියෝගය සහ ජලාස්මයෝගය මගින් සෑදෙන
 - දෘඪ ව්‍යුහයක් වන සංයෝගාණුව නිපදවේ
 - සංයෝගාණුව විසළීම හා අධික සීතලට / මිදීමට ඔරොත්තු දෙන බහු නාෂ්ටික ව්‍යුහයකි
 - එබැවින් මෙම සංයෝගාණුව අහිතකර පරිසර තත්ත්ව වලට ප්‍රතිරෝධී වේ
 - එසේම අහිතකර පරිසර තත්ත්ව වලදී මෙම සංයෝගාණුව පරිවෘත්තීය වශයෙන් නිශ්ක්‍රීය වේ
 - පරිසර තත්ත්ව හිතකර වන විට සංයෝගාණුව ප්‍රවේණිකව වෙනස් ඒකගුණ බීජාණු නිපදවයි




shutterstock.com - 1977812621

3) Ascomycota වංශය

උදා : *Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium*

- කර්දිය, මිරිදිය හෝ භෞමික වේ
- පරපෝෂී හෝ සහජීවී වේ
- බොහෝ ජීවීන් වියෝජකයන් වේ
- ඒකසෙලික හෝ බහුසෙලික වේ

- බහු සෙලික විශේෂ සූත්‍රිකාකාර වන අතර
- සාවාර දිලීර සූත්‍රිකා දරයි
- අලිංගික ප්‍රජනනය **සූත්‍රිකා**
 - විශේෂිත දිලීර ආකාරයක් වන කොනිඩියා කෙළවර
 - බහිර්ජනාව නිපදවෙන කොනිඩියා නමැති අලිංගික බීජාණු මගින් සිදුවේ
- ලිංගික ප්‍රජනනය
 - ලිංගිකව විභේදන ජන්මාණුයානි හා විම මගින් සෑදෙන මඩියක් වැනි ව්‍යුහයක් වන අස්කස සෑදීම මගින් සිදුවේ
 - මෙම අස්කස තුළ අස්ක බීජාණු නමැති ලිංගික බීජාණු අන්තර්ජනාව නිපදවීම සිදුවේ
 - සාමාන්‍යයෙන් එක් අස්කසක් තුළ අස්ක බීජාණු 8ක් පවතී
 - බොහෝ ඇස්කොමයිකොටාවන් විසින් මෙම අස්කස රාශියක් එකට එකතු කරමින් අස්කඵල ලෙස හඳුන්වන ඵලාකර සාදයි





shutterstock.com - 1231711255

4) Basidiomycota වංශය


උදා : *Agaricus*, බෝල හතු, රාක්ක හතු

- භෞමික වේ
- ප්‍රධාන වශයෙන් විශේෂයන් වේ
- සමහරු සහජීවී වේ
- බහුසෛලික වේ
- සාචාර දිලීර සූත්‍රිකා ආකාර දෙකකි. එනම්
 - ඒක න්‍යෂ්ටික දිලීර සූත්‍රිකා
 - ද්විත්‍යාක්ෂික දිලීර සූත්‍රිකා
- ද්විත්‍යාක්ෂික දිලීර සූත්‍රිකා ජාලය ජීවන චක්‍රයේ ප්‍රමුඛ වේ


- අලිංගික ප්‍රජනනය
 - සුලභ නොවේ
- ලිංගික ප්‍රජනනය
 - එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රභේද දෙකකට අයත් ද්විත්‍යාක්ෂික දිලීර සූත්‍රිකා හා වීම මගින් සෑදෙන ව්‍යුහයක් වන බැසිඩියල් සෑදීම මගින් සිදුවේ
 - මෙම බැසිඩියල්යේ තැළි මත බැසිඩි බීජාණු නමැති ලිංගික බීජාණු බහිර්ජනාව නිපදවීම සිදු




Zygomycota ජීවන චක්‍රය



Ascomycota ජීවන චක්‍රය



Basidiomycota ජීවන චක්‍රය



ඇතිමාලියා රාජධානිය

ඇතිමාලියා රාජධානියේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ

- සූ න්‍යෂ්ටික සහ බහුසෛලික ජීවීන් වේ
- මොවුන් අධිග්‍රාහක විෂමපෝෂී ජීවීන් වේ
- එනම් මොවුන් ආහාර කොටස් අධිග්‍රහණය කර එන්සයිම ආධාරයෙන් ඒවා ජීරණය කරනු ලබයි
- මොවුන්ගේ සෛල සංවිධානය වී පටක සෑදෙයි
- වැඩි දෙනෙක් ලිංගික ප්‍රජනනය සිදු කරයි
- ඇතැම් විශේෂ අලිංගිකවද ප්‍රජනනය කරයි
- සමහරු අරිය සමමිතියද සමහරු ද්විපාර්ශ්වික සමමිතියද පෙන්වයි
- ඇතිමාලියා රාජධානියට අයත් ජීවීන්ගෙන් 95ක්% පමණම අපෘෂ්ටවංශීන් වේ
- ඇතිමාලියා රාජධානියට අයත් ප්‍රධාන සත්ත්ව වංශ පහක පරිදි වේ

- 1) නිඩාරියා වංශය
- 2) ජලැටිනෙල්මීන්තෙස් වංශය
- 3) තෙමටෝඩා වංශය
- 4) ඇනිලිඩා වංශය
- 5) ආත්‍රෝපෝඩා වංශය
- 6) මොලුස්කා වංශය
- 7) එකයිනොඩර්මේටා
- 8) කෝඩේටා වංශය

1) නිඩාරියා වංශය

උදා : Obelia, Hydra, මුහුදු මල, ලොඩියා

1) පරිසරය

- සියල්ලෝම ජලජ වාසීන් වේ
- වැඩි විශේෂ සංඛ්‍යාවක් කරදිය වාසී වේ
- පුළු සංඛ්‍යාවක් මිරිදිය වාසී වේ

2) දේහ සංවිධානය

- අන්වීක්ෂීය මෙන්ම මහේක්ෂීය ජීවීන් ඇත
- ද්විප්‍රස්තරකයී ඔර්ම 2 ක්ණ්‍ය ඝෘෂ්ඨ ඇත.
- 1. පිටතින්ම බහිශ්වර්මය
- 2. ඇතුළතින්ම අන්තශ්වර්මය
- අන්තශ්වර්මය සහ බහිශ්වර්මය අතර ජලලිමය සහ අසෛලීය මධ්‍යශ්ලේෂය පිහිටයි
- ආමාශවාහිනී කුහරය (සිලෝමාන්ත්‍රය) නමැති මල්ලක් වැනි ජීරණ කුටීරය ඇත
- මෙය අන්තශ්වර්මයෙන් ආස්තරණය වී ඇත
- තනි සිදුරකින් (මුඛය) බාහිරයට විවෘත වේ
- මෙම මුඛය වටා ග්‍රාහිකා ඇත

- මෙම ග්‍රාහිකා ගොදුරු අල්ලා ගැනීමට සහ ආරක්ෂාවට දායක වේ

- මෙම ග්‍රාහිකා වල පවතින්නේ දංශක කෝෂය




Figure 33.6 A endocyst of a hydra. This type of endocyst:

කුළු, දංශක සෛල නම් විෂ විදිය හැකි තන්තුවක් අඩංගු විශේෂිත සෛල පිහිටයි

- නිඩාරියාවන් මූලික දේහ රූපාකාර දෙකකි. එනම්

1. බුහුබා ආකාරය

- සිලින්ඩරාකාර වේ
- අපමෝඛ කෙළවරින් උපස්තරයට සවි වේ
- මුඛය උඩු පැත්තේ ඇත

2. මෙඩුසා ආකාරය

- පැතලි බුහුබා ආකාර වේ
- නිදැල්ලේ පිහිනමින් වාසය කරයි
- මුඛය උදරියව පිහිටයි




Figure 33.5 Polyp and medusa forms of cnidarians. The

- සමහර නිඩාරියාවන් බුහුබා ආකාරය හෝ සමහර නිඩාරියාවන් මෙඩුසා ආකාරය හෝ පමණක පෙන්වන අතර සමහර නිඩාරියාවන් බුහුබා සහ මෙඩුසා යන ආකාර දෙකම තම ජීවන චක්‍රය තුළදී නිරූපණය කරයි

3) දේහකුහරය : නොදරයි

4) සමමිතිය : අරිය සමමිතක වේ

5) බහිශ්වර්මය : බහිශ්වර්මයක් නොපෙන්වයි

6) ශීර්ෂණය : ශීර්ෂණයක් නොපෙන්වයි

7) ස්නායු පද්ධතිය

- මධ්‍ය ශ්ලේෂය තුළ ගිටුණු නියුරෝන වලින් සමන්විත නියුරෝන ජාලයක් පවතී

8) ශ්වසනය : සරල විසරණය මගින් සිදුවේ

9) සංසරණය : සරල විසරණය මගින් සිදුවේ

10) ආහාර මාර්ගය

- සම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් නොදරයි
- ආමාශ වාහිනී කුහරය අසම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි

11) බහිස්ප්‍රාවය : සරල විසරණය මගින් සිදුවේ


12) සැකිල්ල

- කොරල් බුහුබාවන් පමණක් වූර්ණිකුත බාහිර සැකිල්ලක් දරයි
- මෙය CaCO_3 වලින් සමන්විත වේ


13) ප්‍රජනනය

- ලිංගික හා අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රම දෙකම හමුවේ
- අලිංගික ප්‍රජනනය අංකුරණය මගින් සිදුවේ
- ලිංගික ප්‍රජනනය බාහිර සංසේචනය මගින් සිදුවේ

බුහුබා



මෙඩුසා




හිඩාරියා වංශයේ පිවිත්ව අනන්‍ය ලක්ෂණ

- 1) ද්විප්‍රස්තර ජීවීන් වීම
- 2) ශාඛනය නොවූ ආමාශවාහිනී කුහරයක් දැරීම
- 3) දංශක කෝෂය දැරීම
- 4) බුහුබා සහ මෙඩුසා ලෙස රූපාකාර දෙකක දේහ දැරීම
- 5) සියල්ලෝම ජලජ වාසීන් වීම

ස



දේහ කුහර නිකුත්වන ග්‍රෑකර ප්‍රකාරය. දේහ කුහර නිකුත්වන ක්‍රියාකාරී වීම යුතුය.



භෝජන 03 ක්.


01. ප්‍රතිරෝධීතාව.

02. මහත් ජීවෝත්තමය.

03. ක්‍රියා ජීවෝත්තමය.

*කුහර නිකුත්වන නම් ප්‍රතිරෝධීතාව.

*මධ්‍යම මධ්‍ය භාගයේ ප්‍රතිරෝධීතාව ප්‍රකාර දේහ කුහරය නිකුත් වන මහත් ජීවෝත්තමය වේ.



Acoelomates, such as planarians, lack a body cavity between the digestive cavity and outer body wall.

දේහ කුහර නිකුත්වන ක්‍රියාකාරී ජීවීන්ට පමණි.

2) ජලාධිහෙල්මින්තෙස් වංශය


උදා : *Planaria, Taenia, Fasciola*

1) පරිසරය (ඡර් ඡත්‍රමා)

- නිදැලිවාසී විශේෂ කරදිය මිරිදිය හා තෙත් සහිත භෞමික වාසස්ථාන වල වාසය කරයි
- පරපෝෂි විශේෂ ජීවී දේහ තුළ හෝ මත වාසය කරයි

2) දේහ සංවිධානය

- පෘෂ්ඨෝදරීයව පැතලි දේහ දරයි
- සමහරු පැතලි පටි ආකාර දේහ දරයි
- ක්‍රිපස්තරිකයි
- එනම් දේහය
 1. පිටතින්ම බහිශ්වර්මය
 2. මැදින් මධ්‍යවර්මය
 3. ඇතුළතින්ම අන්තශ්වර්මය
 යන ජනක ස්තර වලින් සමන්විත වේ
- නිදැලිවාසී ආකාර වල දේහය ශ්ලේෂමල ස්‍රාවී ග්‍රන්ථි සහිත පක්ෂමධර අපිච්ඡදයකින් ආවරණය වී ඇත
- දේහයේ උදරීයව පවතින පක්ෂම සංවරණයට දායක වේ
- පරපෝෂිත ආකාර වල දේහයේ මතුපිට දැඩි ආවරණයක් දරයි
- මෙම ජීවීන් සතුව වූයෙකු අංකුෂ වැනි ධාරකයාට සම්බන්ධ වීමට වැදගත් ව්‍යුහ දරයි



▲ Figure 33.10 Anatomy of a planarian.

3) දේහකුහරය :

- දේහ කුහරය නොදරයි
- එබැවින් ක්‍රිපස්තරික අසිලෝමකයන් වේ

- 4) සමමිතිය : ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික වේ
- 5) බණ්ඩනය : සත්‍ය බණ්ඩනයක් නොදරයි

6) ශීර්ෂණය :

- ශීර්ෂණය පිළිබඳව සළකුණු ඇති නමුත් පැහැදිලි ශීර්ෂණයක් නොපෙන්වයි

7) ස්නායු පද්ධතිය

- මද වශයෙන් සංකීර්ණ ස්නායු ස්නායු සහ සංවේදක පද්ධතියක් මුලින්ම හමුවන වංශය වේ
- පූර්ව ගැංග්ලියා යුගලක් සහ අන්වායාම ස්නායු රැහැන් දෙකක් මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට අයත් වේ
- සංවේදී ඉන්ද්‍රිය ලෙස නිදැලිවාසීන් සතුව අක්ෂි ලප පවතී

8) ශ්වසනය : සරල විසරණය මගින් සිදුවේ

9) සංසරණය : සරල විසරණය මගින් සිදුවේ

10) ආහාර මාර්ගය

- සම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් නොදරයි
- ආමාශ වාහිනී කුහරය අසම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි
- ශාඛනය වූ ආමාශවාහිනී කුහරයක් දරයි
- සමරුන්ට බිහිකලනය කළ හැකි ග්‍රසනිකාවක් පවතී (දෘඪ ජීවීන්ගේ දෘඪ ජීවීන්ගේ ඉහළම නිශ්චය)

11) බහිස්ප්‍රාවය :

- සත්ත්ව පරිණාමයේදී මුලින්ම බහිස්ප්‍රාවය සඳහා වෙනම අවයව විකසනය වී ඇත්තේ මෙම වංශයේ ජීවීන්ටය
- මොවුන්ගේ නයිට්‍රජනීය බහිස්ප්‍රාවී පද්ධතිය ප්‍රාක්වාක්ෂිකා වලින් සමන්විත වේ
- මෙය සිළු බල්බ ලෙස හඳුන්වන පක්ෂමධර ව්‍යුහයක් සහිත නාලිකා ජාලයකින් සමන්විත වේ
- මෙවා ආප්‍රාතික සමතුලිතතාවය පවත්වාගැනීමට ද දායක වේ

12) සැකිල්ල : සැකිල්ලක් නොදරයි





13) ප්‍රජනනය

- ලිංගික හා අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රම දෙකම හමුවේ
- අලිංගික ප්‍රජනනය පුනර්වර්ධනය මගින් සිදුවේ
- සියළුම ජීවීන් ද්විලිංගික වේ
- මොවුන් පරසංසේවනය සිදු කරයි

➤ ලිංගික ප්‍රජනනය අභ්‍යන්තර සංසේචනය මගින් සිදුවේ

➤ නිදැලිවාසීන් කීට අවධි නොදරයි

➤ පරපෝෂි ආකාර කීට අවධි දරයි



▲ Figure 33.12 Anatomy of a tapeworm. The inset shows a close-up of the scolex (colorized SEM).

ජලාධිගෝලීයත්තෙස් වංශයේ ජීවීන්ට අනන්‍ය ලක්ෂණ

- 1) ත්‍රිපස්තරික අසිලෝමක ජීවීන් වීම
- 2) පෘෂ්ටෝදරීයව පැතලි දේහ දැරීම
- 3) සිළු බල්ල හා නාලිකා වලින් සමන්විත බහිස්ප්‍රාචී පද්ධතියක් දැරීම

3) තෙමටෝඩා වංශය

උදා : වට පණුවා, කොකු පණුවා, කිරි පණුවා

1. පරිසරය

- වැඩි විශේෂ සංඛ්‍යාවක් කරදියේ නිදැලිවාසී වේ
- සුළු ප්‍රමාණයක් මිරිදිය සහ තෙත් සහිත භෞමික පසේ වාසය කරයි
- ඇතැමුන් ශාක හා සතුන් තුළ පරපෝෂිව වාසය කරයි
- වැඩිම සතුන් සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වන සත්ත්ව වංශය වේ

2. දේහ සංවිධානය

- සිහින් දිගටි සිලින්ඩරාකාර පණු ආකාර දේහ දරයි
- සමහරු අන්වීක්ෂීය වන අතර සමහරු මහේක්ෂීය වේ
- දේහය දැඩි ප්‍රතිරෝධී උච්චර්මයකින් ආවරණය වී ඇත
- එසේම හැව හැලීම සිදු කරයි
- ත්‍රිපස්තරිකයි

3. දේහකුහරය :

- ව්‍යාජ සිලෝමයක් පවතී
- එබැවින් ත්‍රිපස්තරික ව්‍යාජ සිලෝමයන් ලෙස හඳුන්වයි

4. සමමිතිය : ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික වේ

5. බණ්ඩනය : බණ්ඩනයක් නොදරයි

6. ශීර්ෂණය : පැහැදිලි ශීර්ෂණයක් නොපෙන්වයි

7. ස්නායු පද්ධතිය

- සරල වේ
- පූර්ව ගැංග්ලියා සහ අන්වායාම ස්නායු රැහැන් දරයි
- දේහයේ පූර්ව කෙළවර තාපයට සහ රසානික ද්‍රව්‍ය වලට සංවේදී, සංවේදී පිටිකා දරයි

8. ශ්වසනය : සරල විසරණය මගින් සිදුවේ

9. සංසරණය : සරල විසරණය මගින් සිදුවේ

10. ආහාර මාර්ගය

- මුඛයක් සහ ගුදයක් සහිත සම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් දරයි
- සත්ත්ව පරිණාමයේ සම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් විකසනය වූ පළමු සත්ත්ව වංශය වේ

11. බහිස්ප්‍රාචය :

- විකසනය වූ විශේෂ බහිස්ප්‍රාචී ව්‍යුහ නොමැත


- දේහ ඛිත්තියේ බහිස්ප්‍රාථි ජීව වලින් සමන්විත අන්වායාම බහිස්ප්‍රාථි ප්‍රණාල ඇත

12. සැකිල්ල :

- ව්‍යාජ සිලෝමිකයන් බැවින් එම සිලෝමික කරලය ද්‍රවස්ථිතික සැකිල්ලක් ලෙස ක්‍රියා කරයි
- දැඩි උච්චරමය බහිස්සැකිල්ලක් ලෙස ක්‍රියා කරයි
- දේහ ඛිත්තියේ අන්වායාම සිතිදු පේශි පමණක් පිහිටයි
- මේවා සංවරණයට ආධාර කරයි

13. ප්‍රජනනය

- පිරිමි සහ ගැහැණු සතුන් වෙන් වෙන්ව හඳුනාගත හැක
- එනම් ලිංගික ද්විරූපතාවය පෙන්වයි
- ගැහැණු සතුන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වේ
- ලිංගික ප්‍රජනනය සිදුවේ
- ජීව ලිංගික වෙති
- ලිංගික ප්‍රජනනය සිදුවේ
- අභ්‍යන්තර සංසේචනය සිදුවේ



තෙමරෝඩා වංශයේ ජීවිත්ව අනන්‍ය ලක්ෂණ


1. ව්‍යාජ සිලෝමික ජීවින් වීම
2. දැඩි ප්‍රතිරෝධී උච්චරමයක් පැවතීම
3. බණ්ඩනය නොවූ දෙකෙළවරින් සිහින් වන පණු ආකාර දේහ දැරීම

.....

4) ඇතිලිඩා වංශය

උදා : ගැඩවිලා, කුඩාල්ලා, වැරහැලි පණුවා

- 1) පරිසරය
 - කරදිය මිරිදිය සහ තෙත් සහිත භෞමික පරිසර වල වාසය කරයි
- 2) දේහ සංවිධානය
 - සිලින්ඩරාකාර දිගටි පණු ආකාර දේහ දරයි
 - ත්‍රිපස්තරිකයි
 - දැඩිකෙඳි සහ අංශපාදිකා පවතී
 - දැඩිකෙඳි - සංවරණයට හා ආරක්ෂාවට ද
 - අංශපාදිකා - සංවරණයට හා ශ්වසනයට ද දායක වේ
 - බාහිර පරපෝෂී ආකාර වූෂකර දරයි
 - ඇතැම් විශේෂ මෙවුලක් දරයි
 - මෙවුල මගින් මඩියක් වැනි බීජකෝෂය ප්‍රාථමික කරන අතර බීජ කෝෂය තුළ බිත්තර තැන්පත් කිරීමත් සංසේචනයත් සිදුවේ
 - එබැවින් මෙවුල බාහිර සංසේචනයට වැදගත් වේ



- 3) දේහකුහරය :
 - හොඳින් විකසනය වූ සත්‍ය සිලෝමයක් දරයි
 - මුලින්ම සත්‍ය සිලෝමයක් විකසනය වූ සත්ත්ව වංශය වන්නේ මෙයයි
- 4) සමමිතිය : ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික වේ
- 5) බණ්ඩනය :
 - සත්‍ය සමබණ්ඩනයක් දරයි
 - අභ්‍යන්තර මෙන්ම බාහිර සමබණ්ඩනය පෙන්වයි
- 6) ශීර්ෂණය :
 - පැහැදිලි ශීර්ෂණයක් පෙන්වයි
 - පැහැදිලි ශීර්ෂණයක් මුලින්ම විකසනය වූ සත්ත්ව වංශයයි

- > හොඳින් වැඩුණු ස්නායු පද්ධතියක් දරයි
- > එය දේහයේ පූර්ව කෙළවර පවතින
- > පෘෂ්ඨික මස්තික්ෂක ගැංග්ලියමකින්,
- > උදරීය ස්නායු රහානකින් සහ
- > චළයාකාර සම්බන්ධක වලින් සමන්විත වේ
- > ස්නායු රහානේ බණ්ඩිත ගැංග්ලියා පිහිටයි
- > සංවේදී අවයව ලෙස සරල ඇස් ග්‍රාහිකා පිහිටයි
- > මෙම ඇස් කාච දරන අතර ප්‍රතිබිම්බ සාදයි

8) ශ්වසනය :

- > බාහිර ජලක්ලෝම
- > අංශපාදිකා සහ
- > දේහාවරණය ශ්වසන ව්‍යුහ ලෙස ක්‍රියා කරයි
- > මුලින්ම විශේෂිත ශ්වසන ව්‍යුහ (බාහිර ජලක්ලෝම) විකසනය වූ සත්ත්ව වංශය වන්නේ මෙයයි

9) සංසරණය :

- > සංවාත රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් දරයි
- > මුලින්ම රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් විකසනය වූ සත්ත්ව වංශය වන්නේ මෙයයි

10) ආහාර මාර්ගය

- > සම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් සහිත ජීරණ පද්ධතියක් දරයි

11) බහිෂ්ප්‍රාවය :


- > පශ්ව වෘක්කිකා මගින් සිදුවේ
- > මේවා එක දේහ බණ්ඩයක යුගලක් බැගින් පිහිටයි

12) සැකිල්ල :

- > සිලෝමිකයන් බැවින් එම සිලෝමික තරලය ද්‍රවස්ථිතික සැකිල්ලක් ලෙස ක්‍රියා කරයි

13) ප්‍රජනනය

- > ප්‍රධානව ලිංගික ප්‍රජනනය සිදුවේ
- > ඇතැමුන් පුනර්වර්ධනය මගින් අලිංගික ප්‍රජනනයද සිදු කරයි
- > ඒක ලිංගික හෝ ද්විලිංගික ජීවීන් වේ



ඇතිබූවා වංශයේ ජීවීන්ට අනන්‍ය ලක්ෂණ

1. බාහිර හා අභ්‍යන්තර සමබණ්ඩනය පෙන්වන සිලින්ඩරාකාර පණු ආකාර දේහ දැරීම
2. මෙවුල දැරීම
3. දැඩි කෙඳි හා අංශ පාදිකා දැරීම

5) මොලස්කා වංශය

උදා :

මට්ටියා, ගොළුබෙල්ලා, බුවල්ලා, දැල්ලා, අටපියල්ලා, අලිදත් කටුවා, කාවාවියා, හම්බෙල්ලා


1) පරිසරය

- බොහෝමයක් කරදිය වාසී වේ
- ඇතැමුන් මිරිදිය හෝ භෞමිකවාසී වේ

2) දේහ සංවිධානය

- මෘදු දේහය ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ
- එනම්
 1. ජෙෂිමය පාදය
 2. අන්තරංග ගොනුව
 3. ප්‍රාචරණය ලෙසයි

- ජෙෂිමය පාදය සංචරණය සඳහා දායක වේ
- අන්තරංග ගොනුව තුළ අභ්‍යන්තර අවයව ඛණ්ඩනය අන්තර්ගත වේ
- ප්‍රාචරණය මගින් චුර්ණිභූත කවචය ස්‍රාවය කරයි
- මෙම කවචය බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර විය හැකි වේ
- ත්‍රිපස්තරිකයි



3) දේහකුහරය :

- සිලෝමික සතුන් වේ
- නමුත් සිලෝමය රුධිර-වසා තරලයෙන් පිරුණු රුධිර හෙබක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වී ක්ෂීණ වී ඇත

4) සමමිතිය :

- ඇතැමුන් ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික
- ගොළුබෙල්ලන් වැනි සතුන් අසමමිතික වේ

5) බන්ධනය : බන්ධනයක් නොදරයි

6) ශීර්ෂණය : පැහැදිලි ශීර්ෂණයක් දරයි

7) ස්නායු පද්ධතිය

- ගැංග්ලියා සහිත ස්නායු වලයක් හා ඉන් විහිදෙන ස්නායු රැහැන් වලින් යුතු ස්නායු පද්ධතියක් දරයි
- සංවේදී අවයව ලෙස ඇස් සහ ග්‍රාහිකා වැනි ව්‍යුහ පවතී

8) ශ්වසනය :


- ජලජවාසීන් ජලක්ලෝම ද,
- ඇතැමුන් වාහිනීමත් වූ ප්‍රාචරණයද, ශ්වසන ව්‍යුහ ලෙස භාවිතා කරයි

9) සංසරණය :

- පෘෂ්ඨීය හෘදයක් සහිත විවෘත රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් දරයි
- රුධිර හෙබක් පවතී
- අවයව රුධිරයෙන් නැහැවෙමින් පවතී

10) ආහාර මාර්ගය

- සම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් දරයි
- බොහෝ මොලස්කාවන් ආහාර ගැනීම සඳහා මුඛයේ ඇති රේත්‍රිකාව යොදා ගනී
- මෙය කුඩා දත් සහිත කයිටිනිමය රිබන් ආකාර ව්‍යුහයකි



Radula. The mouth region in many mollusc species contains a rasp-like feeding organ called a radula. This belt of backward-curved teeth repeatedly thrusts outward and then retracts into the mouth, scraping and scooping like a backhoe.

11) බහිස්ප්‍රාවය : පශ්චාත් වෘක්කිකා මගින් සිදුවේ

12) සැකිල්ල :

- චුර්ණිභූත කවච ආරක්ෂක සැකිල්ලක් ලෙස ක්‍රියා කරයි

13) ප්‍රජනනය

- ලිංගික ප්‍රජනනය සිදුකරයි
- ප්‍රජනක අවයව අන්තරංග ගොනුව තුළ අන්තර්ගත වේ
- ඒක ලිංගික ජීවීන් වේ
- බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර සංසේචනය සිදු කරයි




මොලස්කා වංශයේ පිළිත්ට අනන්‍ය ලක්ෂණ

1. දේහය, පේශිමය පාදය, අන්තරංග ගොනුව සහ ප්‍රාචරණය ලෙස කොටස් තුනකින් යුක්ත වීම
2. රේත්‍රිකාව දැරීම
3. චුර්ණිකුක කවච දැරීම

6) ආත්‍රොටෝඩා වංශය

උදා :

කෘමීන්, මකුළුවා, ඉස්සා, කකුළුවා, ගෝනුස්සා, කිනිකුල්ලා, මයිටාවා, හැකැල්ලා, පත්තෑයා




අලිප්පු කටුමා

අලිප්පුල්ලා

මොලස්කා

- 1) පරිසරය
 - පෘථිවිය මත ඕනෑම ස්ථානයක වාසය කළ හැකි වේ
 - එනම් භෞමික පස, ජලය හා වායව පරිසරයේ වාසය කරයි
 - වැඩිම ජීව විශේෂ සංඛ්‍යාවක් අඩංගු සත්ත්ව වංශය වේ
 - පෘථිවිය මත වඩාත් සාර්ථකම සත්ත්ව කාණ්ඩය ලෙස සැළකිය හැකිය

- 2) දේහ සංවිධානය
 - ඛණ්ඩනය වූ දේහ දරයි
 - සන්ධි සහිත පාද දරයි
 - කයිටිනීම්‍ය ඛනිජසැකිල්ලක් දරයි
 - මෙම සැකිල්ල නිසා මොවුන්ගේ අඛණ්ඩ වර්ධනයක් සිදු නොවන අතර වරින් වර සැකිල්ල හැලීම සිදුවේ
 - ත්‍රිපස්තරිකයි



- 3) දේහකුහරය :
 - පිලෝමික සතුන් වේ
 - නමුත් පිලෝමය රුධිර-වසා තරලයෙන් පිරුණු රුධිර හෙබක් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වී ක්ෂණ වී ඇත

- 4) සමමිතිය : ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික වේ
- 5) ඛණ්ඩනය : සමඛණ්ඩනයක් දරයි

- 6) ශීර්ෂණය : පැහැදිලි ශීර්ෂණයක් පෙන්වයි


- 7) ස්නායු පද්ධතිය
 - ආදි පෘෂ්ඨීය මොළයක් සහිත හොඳින් විකසනය වූ ස්නායු පද්ධතියක් දරයි
 - එම මොළයෙන් විහිදෙන උදරීය සහ ස්නායු රැහැන් ඇත
 - මෙය ඛණ්ඩනය වී ඇත
 - හොඳින් විකසනය වූ සංවේදක ඉන්ද්‍රිය රාශියක් පවතී
 - උදා : ස්පර්ශක, සරල ඇස්, සංයුක්ත ඇස්

8) ශ්වසනය :

- විශේෂිත ශ්වසන ව්‍යුහ දරයි
- ජලජ ජීවීන් - ජලක්ලෝම
- භෞමික වාසීන් - කයිටිනීම්ය ශ්වාසනාල
- **ගෝලීය** පද්ධති
- ඇරැක්කිඩාවන් - පත් පෙණහලු
- මගින් ශ්වසනය සිදු කරයි

9) සංසරණය :

- විවෘත රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් දරයි
- පෘෂ්ඨීය නාලාකාර හෘදයක් මගින් රුධිර හෙබ කුළුව රුධිරය පොම්ප කරයි
- රුධිර හෙබ කුළ ඇති රුධිරයෙන් පටක නැහැවෙමින් පවතී
- රුධිර කේශනාලිකා නොදරයි



10) ආහාර මාර්ගය : සම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් දරයි

11) බහිස්ප්‍රාවය :

- භෞමිකවාසීන් මැල්ටිජීය නාලිකා මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් යුරික් අම්ලය බහිස්ප්‍රාවය කරයි
- ඉස්සන් සහ කකුළුවන් හරිත ශ්‍රන්ථි මගින් බහිස්ප්‍රාවය සිදු කරයි

12) සැකිල්ල :

- කයිටිනීම්ය උච්චර්මය බහිස්සැකිල්ලක් ලෙස ක්‍රියා කරයි

13) ප්‍රජනනය

- ලිංගික ප්‍රජනනය සිදුකරයි
- ඒක ලිංගික ජීවීන් වේ
- ලිංග වෙන්වී පවතී
- සාමාන්‍යයෙන් අභ්‍යන්තර සංසේචනය සිදු කරයි
- ඇතැම් විශේෂ සාකෙනෝද්භවය මගින් ප්‍රජනනය කරයි


ආත්‍යෝපෝධා වංශයේ ජීවිත්ව අනන්‍ය ලක්ෂණ

1. කයිටිනීම්ය බහිස්සැකිල්ලක් දැරීම
2. සන්ධි සහිත පාද දැරීම
3. සංයුක්ත ඇස් දැරීම

7) එකයිනොඩර්මේටා වංශය

උදා :

මුහුදු තාරකාවා, භංගුර තාරකාවා, මුහුදු ලිලි, පෙදැඟිල්ලන්, මුහුදු කැකිරි, මුහුදු ඉකිරි, මුහුදු කාසි



1) පරිසරය

- සියල්ලෝම කරදිය වාසීන් වේ
- මුහුදේ සෙමින් සංචරණය කරන හෝ ඔන් ජීවීන් වේ

2) දේහ සංවිධානය

- චූර්ණීකූල ඵලකවලින් සමන්විත අන්ත:සැකිල්ල තුනී අපිචර්මයකින් ආවරණය වී පවතී
- ජල වාහිනී පද්ධතිය නම් ජලය ගමන් කරන ශාඛනය වූ නාල පද්ධතියක් දරයි
- එයට සම්බන්ධ වූ නාල පාද පවතී
- මෙම නාලපාද

1. සංචරණය සඳහා
2. හෝර්නස් සඳහා
3. ශ්වසනය සඳහා යොදා ගැනේ

3) දේහකුහරය : සිලෝමිකයන් වේ

4) සමමිතිය :

- පංච අරීය සමමිතික වේ
- කීටයන් ද්විපාර්ශ්වික සමමිතිය පෙන්වයි

5) බණ්ඩනය : බණ්ඩනයක් නොදරයි

6) ශීර්ෂණය : ශීර්ෂණයක් නොපෙන්වයි

7) ස්නායු පද්ධතිය

- දේහයේ මධ්‍යයේ පිහිටි ස්නායු වළයක් සහ එහි සිට විහිදුණු අරීය ස්නායු රැහැන් වලින් සමන්විත ස්නායු පද්ධතියකි

8) ශ්වසනය :

- විශේෂිත ශ්වසන ව්‍යුහ දරයි
- බොහෝ ජීවීන් දේහ බිත්තිය සහ නාල පාද භාවිතයෙන් ශ්වසනය සිදු කරයි
- ඇතැම් ජීවීන් ශ්වසනය සඳහා ශ්වාස රුක් හෝ පායුල භාවිතා කරයි

9) සංසරණය :

- හෘදයක් සහිත ක්ෂීණ වූ සංචාන රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් දරයි

10) ආහාර මාර්ගය :

- සාමාන්‍යයෙන් සම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් දරයි
- මුඛය ජීවියාගේ යටිපැත්තේද
- ගුදය ජීවියාගේ ඉහළ පැත්තේද පිහිටයි

11) බහිස්ප්‍රාවය :


- විශේෂිත ව්‍යුහ නොදරයි
- ජලවාහිනී පද්ධතිය භාවිතයෙන් බහිස්ප්‍රාවය සිදුකරයි

12) සැකිල්ල :

- සම තුළ ගිවිණු වූර්ණිකුත ඵලක වලින් සමන්විත අභ්‍යන්තර සැකිල්ලක් දරයි

13) ප්‍රජනනය

- ඒක ලිංගික ජීවීන්
- ලිංග වෙන්වී පවතී
- බාහිර සංසේචනය
- ඩිප්ටෙරොපෝමි:



වකයිනොඩරමේටා වංශයේ ජීවිත්ව අනන්‍ය ලක්ෂණ

1. සුහුඹුලන් පංච අරීය සමමිතිය දැරීම
2. ජල වාහිනී පද්ධතියක් දැරීම
3. සියල්ලෝම කරදියවාසීන් වීම
4. අපිචරමයෙන් ආවරණය වූ වූර්ණිකුත ඵලක වලින් සමන්විත අභ්‍යන්තර සැකිල්ලක් දැරීම හා ඉන් ඇතිවන බණ්ඩක සහ පෙඩිසලේරියා පැවතීම

8) කෝඩේටා වංශය

- 1) පරිසරය : කරදිය, මිරිදිය හෝ භෞමිකවාසී වේ
- 2) දේහ සංවිධානය : ත්‍රිපස්තරික වේ
- 3) දේහකුහරය : සිලෝමිකයන් වේ
- 4) සමමිතිය : ද්විපාර්ශ්වික සමමිතිය පෙන්වයි
- 5) බණ්ඩනය : සමබණ්ඩනයක් දරයි
- 6) ශීර්ෂණය : ඉතා පැහැදිලි ශීර්ෂණයක් පෙන්වයි

7) ස්නායු පද්ධතිය

- පෘෂ්ඨීය කුහරමය තනි ස්නායු රජ්ජුවකින් සමන්විත ස්නායු පද්ධතියක් දරයි
- ඇතැමුන්ගේ එයින් මොළය සහ සුපුමිනාව විකසනය වේ

8) ශ්වසනය :

- ජලක්ලෝම, පෙණහැළි හා සම, ශ්වසනයට භාවිතා කරයි

9) සංසරණය :

- උදරීය හෘදයක් සහිත සංචාන රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් දරයි

10) ආහාර මාර්ගය : සම්පූර්ණ ආහාර මාර්ගයක් දරයි


11) බහිස්ප්‍රාවය : වෘක්ක මගින් සිදුවේ

12) සැකිල්ල :

- අස්ථි සහ/හෝ කාටිලේජ වලින් සැදුණු අභ්‍යන්තර සැකිළි දරයි
- සමහරැන්ට බාහිර සැකිළි ද ඇත

13) ප්‍රජනනය

- ඒක ලිංගික ජීවීන් වේ
- ලිංග වෙන්වී පවතී
- ලිංගික ද්විරූපතාවය පෙන්වයි
- බොහෝ විට ලිංගික ප්‍රජනනය සිදුවේ
- බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර සංසේචනය සිදු කරයි
- ඩිප්‍රොටෙරොස්ටෝමිකයන් වේ



▲ Figure 34.3 Chordate characteristics. All chordates possess the four highlighted structural trademarks at some point during their development.

කෝඩේටා වංශයේ ජීවීන්ට අනන්‍ය ලක්ෂණ

- අවම තරමින් කළල විකසනයේදී හෝ පමණක්, පූර්ව දිශාවේ සිට අපර දිශාවට, දේහයට සන්ධාරණය සපයමින්, ආහාර මාර්ගය සහ ස්නායු රජ්ජුව අතර පිහිටන, අන්වායාම, ප්‍රත්‍යස්ථ, විකසනයේ මුඛ ප්‍රදේශයේ ආවේණික දණ්ඩාකාර ව්‍යුහයක් වන, පෘෂ්ඨ රජ්ජුව පැවතීම
- එම පෘෂ්ඨ රජ්ජුවට පෘෂ්ඨීයව පිහිටන, කුහරමය, නාලාකාර ව්‍යුහයක් වන, ස්නායු රජ්ජුව පැවතීම

* කෝඩේටා වංශයට අයත් උප වංශයක් වන වර්ටිබ්‍රේටාවන් (පෘෂ්ඨවංශීන්) ප්‍රධාන වර්ග හයකට වර්ග කරනු ලබයි.

එනම්

- 1) කොන්ඩ්‍රික්තියේස් වර්ගය
- 2) මස්ටේසික්තියේස් වර්ගය
- 3) ඇමිබියා වර්ගය
- 4) රෙප්ටිලියා වර්ගය
- 5) ආවේස් වර්ගය
- 6) මැමෙලියා වර්ගය

3. අවම තරමින් කළල අවධියේදී හෝ පමණක්, ග්‍රසනිකාවේ බාහිරට විවෘත වන, ග්‍රසනික පැළම දක්නට ලැබීම

* භෞමික ආකාර වල සුහුඹුල් අවධිය වන විට මේවා වැසී යයි.

* නමුත් භෞමික ආකාර වල කීට අවධි වලත්, ජලජවාසීන්ගේ සුහුඹුල් අවධි වලත් මේවා ශ්වසන ව්‍යුහ ලෙස ක්‍රියා කරයි

4. අවම තරමින් කළල අවධියේදී හෝ පමණක්, ගුදයෙන් අපරව පිහිටන පේශිමය වලිගයක් පැවතීම

* ඇතැම් භෞමික ආකාර වල සුහුඹුල් වන විට එම වලිගය ක්ෂීණ වී ඇත


5. බොහෝ කෝඩේටාවන් තුළ උදරීය පේශිමය හෘදයක් දැකිය හැකි වේ

1) කොන්ඩ්‍රික්තියේස් වර්ගය

උදා : මෝරා, මඩුවා

- සියල්ලෝම ජලජ වාසීන් වේ
- අභ්‍යන්තර සැකිල්ල කාටිලේජීය වේ
- සංවරණය සහ සංකුලනය සඳහා වරල් දරයි
- දේහය තර්කුරුපි සහ අනාකුල හැඩැති වේ
- මුඛය දේහයේ පූර්ව කෙළවර උදරීයව පිහිටයි
- පෞච්ඡ වරල විෂමාංශප්‍රච්ඡ වේ
- වර්මීය රළු කොරළු වලින් දේහය ආවරණය වී ඇත ශ්වසනය සඳහා ජලක්ලෝම දරයි
- ජලක්ලෝම පිධානයකින් ආවරණය වී නෑත
- ද්විකුටීර හෘදයක් දරයි
- ඒක සංසරණයක් දරයි
- වාතාශයක් නොදරයි
- වලනාපීන් වේ
- අභ්‍යන්තර සංසේචනය පෙන්වයි
- සමහරු අණ්ඩජලාබුජ වේ. ඇතැමුන් අණ්ඩජ හෝ ජලාබුජ වේ
- ප්‍රජනක ප්‍රණාල බිහිස්සාව ප්‍රණාල ආහාර මාර්ගය තනි විවරයකින් බාහිර පරිසරයට

විවෘත වන පොදු කුටීරයක් වන ජම්බාලියකට
විවෘත වේ



(a) Blacktip reef shark (*Carcharhinus melanopterus*). Sharks are fast swimmers with acute senses. Like all gnathostomes, they have paired pectoral and pelvic fins.

මත්ස්‍යන්ගේ ජලජ අනුවර්තන

1. තර්කුරුපි අනාකූල හැඩය
2. සංවරණයට සහ සංකූලනයට වරල් පැවතීම
3. ශ්වසනය සඳහා ජලක්ලෝම දැරීම
4. වාතාශයක් දැරීම
5. දේහය කොරළ වලින් ආවරණය වීම
6. අංශ රේඛා පද්ධතියක් දැරීම


ජලයේ භාවිතය හඳුනාගැනීම

දෘෂ්ටාන්තය

විෂමය (3) ඇමිනියා වර්ගය

- ඉච්ථි


උදා : මැඩියා, ගෙමඩා, *Ichthyophis*



2) ඔස්ටේක්ටික්ස් වර්ගය

උදා : කාපයා බලයා


- > සියල්ලෝම ජලජ වාසීන් වේ
- > අභ්‍යන්තර සැකිල්ල අස්ථිමය වේ
- > සංවරණය සහ සංකූලනය සඳහා වරල් දරයි
- > දේහය තර්කුරුපි සහ අනාකූල හැඩැති වේ
- > මුඛය දේහයේ පූර්ව කෙළවර අග්‍රස්ථව පිහිටයි
- > පෞච්ඡ වරල සමාංශපූර්ව වේ
- > පැතළි කංකනාහ කොරළ සහ වක්‍රාකාර කොරළ වලින් දේහය ආවරණය වී ඇත
- > ශ්වසනය සඳහා ජලක්ලෝම දරයි
- > ජලක්ලෝම අස්ථිමය පිධානයකින් ආවරණය වී ඇත
- > ද්විකුටීර හෘදයක් දරයි
- > ඒක සංසරණයක් දරයි
- > උත්ප්ලාවකතාවය පාලනයට වාතාශයක් දරයි
- > වලකාපිත් වේ
- > බොහෝ ජීවීන් බාහිර සංසේචනය ද, සමහරුන් අභ්‍යන්තර සංසේචනය පෙන්වයි
- > බොහෝ ජීවීන් අණ්ඩජලාබුජ වේ.



දෘෂ්ටාන්තය

විෂමය (3) ඇමිනියා වර්ගය

- ඉච්ථි



- > භෞමික පරිසරය ආක්‍රමණය කළ පළමු කාණ්ඩයයි උපකරණය, වංශගතය
- > නමුත් ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ජලය අත්‍යවශ්‍ය වේ
- > ජලය හා ගොඩබිම යන දෙකෙහිම ජීවත් වෙයි
- > මිරිදියෙහි හෝ ගොඩබිම පමණක් හමුවේ
- > එනම් කර්දියවාසීන් නොමැත
- > අභ්‍යන්තර සැකිල්ල අස්ථිමය වේ
- > සංවරණය සඳහා ගාත්‍රා දරන පළමු සත්ත්ව විශේෂයයි උපකරණය, වංශගතය
- > භෞමික පරිසරයේ සංවරණය පහසු වන ලෙස මෙම ගාත්‍රා මගින් ශරීරය ඉහළට මිසවා ඇත
- > නමුත් සමහරුන්ට ගාත්‍රා නැත
- > සමහරු සිව්පාවෝ වෙති

- ගාත්‍රා දරන ජීවීන් ඇඟිලි සහිත ගාත්‍රා දරයි
- ශරීරය තුනී සහ තෙත් ග්‍රන්ථීමය සමකින් ආවරණය වී ඇත
- කොරපොතු නොපිහිටයි
- පරිසර වෙනස්වීම් වලට සංවේදී වේ
- ඇතැම් කීට අවධි, ජලක්ලෝම හරහා ශ්වසනය කරයි
- ඇතැම් සුහුඹුලන් සම හෝ මුඛ තුළ ආස්තරණය මගින් ශ්වසනය කරයි
- බොහෝ ඇමිබියාවන් ශ්වසනය සඳහා පෙණහලු යුගලක් දරයි
- කුටීර 03ක් සහිත හෘදයක් දරයි
- අසම්පූර්ණ ද්විත්ව සංසරණයක් දරයි
- චලනය කළ හැකි ඇසිපිය දරයි
- ඇස ආවරණය කරමින් ඇසිපිය වලට පසුපසින් නිමිලන පටලයක් ඇත
- ඇසට පසුපසින් කර්ණපටහ පටලයක් පවතී
- චලනාපිත් වේ ඵබාවිත් බාහිර පරිසරයේ උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම්වලට අනුව ශරීර උෂ්ණත්වය වෙනස් කරගනී
- මේ නිසා පරිවෘත්තිය සීමා වේ
- බොහෝ ඇමිබියාවන් බාහිර සංසේචනය පෙන්වයි
- අණ්ඩජ වේ. නමුත් කවච රහිත බිත්තර ජලයේ දමනු ලබයි

ඇමිබියාවන්ට ජලය අත්‍යවශ්‍ය වීමට හේතු

1. කීටයා ජලජ වීම
2. කීටයාට ශ්වසනය සඳහා පවතින්නේ ජලක්ලෝම වීම
3. බාහිර සංසේචනය සිදුවීම සඳහා
4. බිත්තර කවච රහිත වීම නිසා විජලනයෙන් ආරක්ෂා කරගැනීමට



4) රෙප්ටිලියා වර්ගය

උදා :

කටුස්සා, සර්පයා, කැස්බෑවා, කිඹුලා, ඇලිගේටරයා

- සම්පූර්ණ භෞමික පරිසරයකට අනුවර්තනය වූ පළමු සත්ත්ව කාණ්ඩයයි (6 ක් 6 ඩිටා මන් 6 ගත්)
- බහුතරයක් භෞමික වන අතර සමහරක් ජලජ වේ
- අස්ථිමය සැකිල්ලක් දරයි
- සංචරණය සඳහා ඇඟිලි සහිත ගාත්‍රා දරයි
- සමහර රෙප්ටිලියාවන් ගාත්‍රා නොදරයි
- දේහය කෙරවිනීමය ශල්ක දරන

- ග්‍රන්ථි රහිත වියළි සමකින් ආවරණය වී ඇත
- ජල සංරක්ෂණයට හා ඇතිල්ලීමට ඔරොත්තු දීම සඳහා කෙරවිනීමය ශල්ක වැදගත් වේ
- වායව ශ්වසනය සඳහා පෙණහළු දරයි
- කුටීර 03ක් සහිත හෘදයක් දරයි
- අසම්පූර්ණ ද්විත්ව සංසරණයක් දරයි
- චලනාපිත් වේ
- අභ්‍යන්තර සංසේචනය පෙන්වයි
- අණ්ඩජ වේ. කැල්සිහවනය වූ කවච සහිත බිත්තර ගොඩබිම දමයි
- කීට අවස්ථා නොදරයි



රෙප්ටිලියාවන්ගේ භෞමික අනුවර්තන

1. කෙරවිනිතවනය වූ ශල්ක වලින් ආවරණය වූ දේහයක් දැරීම
2. ග්‍රන්ථි රහිත වියළි සමක් දැරීම
3. ඇඟිලි සහිත ගාත්‍රා දැරීම
4. ශ්වසනය සඳහා පෙණහලු දැරීම
5. අභ්‍යන්තර සංසේචනය දැරීම
6. කවච සහිත කැල්සිහවනය වූ බිත්තර දැරීම
7. යුරික් අම්ලය බහිස්සාවය කිරීම

බාහිර භංග්‍රණයට අලය ඉමණය වේ.
(ගැබ්බිලා හැර (මෙවල භූමි ගබඩා කරගනී.)

5) ආවේස් වර්ගය

උදා : කපුටා, ගිරවා, පැණි කුරුල්ලා, රාජාලියා

- භෞමික හා ජලජ වාසස්ථාන ජීවත් වේ
- අභ්‍යන්තර සැකිල්ල අස්ථිමය වේ
- මෙය දැඩි හා සැහැල්ලු වේ
- අස්ථි තුළ වාත කුහර දැරීමෙන් සැහැල්ලු වී ඇත
- පියාසැරිය සඳහා පූර්ව ගාත්‍රා පිහාටු සහිත පියාපත් බවට සැකසී ඇත
- කෙරටිනිභවනය වූ පිහාටු මගින් දේහය ආවරණය වී ඇත
- ගාත්‍රා වල ශල්ක හමුවේ
- දේහය අනාකූල හැඩැති වේ
- වර්ණ දෘශ්‍යය ඇත
- දියුණු දෘෂ්ටියක් ඇත
- මුඛය දත් රහිත භෝටක් බවට පත්වී ඇත
- ශ්වසනය සඳහා පෙණහලු පවතී
- මේවා තුළ වාතකෝෂ රාශියක් අඩංගු වේ
- කුටීර 04කින් යුතු හෘදයක් දරයි
- සම්පූර්ණ ද්විත්ව සංසරණයක් දරයි
- වාතාශයක් නොදරයි
- අවලක්‍ෂ්‍ය වේ
- අධික පරිවෘත්තියක් දරයි
- අභ්‍යන්තර සංසේචනය දරයි
- අණ්ඩජ වේ. කවච සහිත බිත්තර දමයි



පක්ෂීන්ගේ පියාසැරිය සඳහා වන අනුවර්තන

1. පූර්ව ගාත්‍රා පියාපත් බවට විකරණය වීම
2. දේහය අනාකූල හැඩැති වීම
3. දේහය සැහැල්ලු වීම
4. දේහ ප්‍රමාණය කුඩා වීම
5. වාත කුටීර සහිත සැහැල්ලු අස්ථි දැරීම
6. අධික පරිවෘත්තිය ශීඝ්‍රතාවය



(b) Bone structure



6) මැමාලියා වර්ගය

උදා : වවුලා, කල්මසා, වඳුරා, ගවයා

- බහුතරයක් භෞමික ජීවීන් වන අතර ඇතැම් ජීවීන් ජලජ පරිසර වල ව්‍යාප්ත වී ඇත
- අභ්‍යන්තර සැකිල්ල, කාටිලේජීය සන්ධාන පෘෂ්ඨවලින් සමන්විත අස්ථි වලින් සැදී ඇත
- බහුතරයක් සංචරණය සඳහා ගාත්‍රා භාවිතා කරයි
- ඇතැම් ජීවීන් පියාසැරියට ද, ඇතැම් ජීවීන් ජලජ පරිසර වලට ද අනුවර්තනය වී ඇත
- දේහය රෝමවලින් ආවරණය වී ඇති අතර, ඒවා කාප පරිවරණය සඳහා දාය වේ
- සමේ ග්‍රන්ථි පවතී
- ළපැටියෝ ස්තන ග්‍රන්ථිවලින් නිපදවෙන කිරි මත යැපෙයි
- විභේදනය වූ දත් වර්ග ඇත (විෂමදන්ති වේ)
- පෙණහඳු සහිත කාර්යක්ෂම ශ්වසන පද්ධතියක් දරයි
- පෙණහඳු වාතනය සඳහා පේශිමය මහා ප්‍රාචීරය වැදගත් වේ
- කුටීර 04ක් සහිත හෘදයක් දරයි
- සම්පූර්ණ ද්විත්ව සංසරණයක් දරයි
- අනෙකුත් පෘෂ්ඨවංශීන්ට වඩා විශාලව වැඩුණු මොළයක් පිහිටයි
- බුද්ධිමත් වේ. ඉගෙනීමේ කුසලතාවය සහ මතකය ඇත
- විවිධ සන්නිවේදන ක්‍රම භාවිතා කරයි
- අවලංගු වීම් වේ
- බොහෝ සාමාජිකයින් ඉහළ පරිවෘත්තීය ශීඝ්‍රතා දක්වයි
- අභ්‍යන්තර සංසේචනය පෙන්වයි
- බහුතරයක් ජීවීන් ජලාබ්‍රජ වේ (භෑරිඳු)
- ළපැටියෝ දීර්ඝ කාලයක් මවුපිය ආරක්ෂාව යටතේ වර්ධනය වේ (පශ්චාත් ප්‍රසව රැකවරණය පෙන්වයි)

