

Unit 05 සත්ව ආකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය Animal Form & Function


සත්ව පටක

- පටකයක් යනු
 - විශේෂිත කාර්යයක් හෝ කාර්යයන් කිහිපයක් ඉටු කිරීමට හැඩගැසී ඇති
 - සෛල වර්ග එකක් හෝ වැඩි ගණනක් යුතු
 - සෛල සමූහයක් එක්ව ගත් විට
 - එය පටකයක් ලෙස හැඳින්වේ
- සත්ව පටක ප්‍රධාන වර්ග හතරකි. එනම්
 - අපිච්ඡද පටකය
 - සම්බන්ධක පටකය
 - පේශි පටකය
 - ස්නායු පටකය

1) අපිච්ඡද පටකය

- ලාක්ෂණික ලක්ෂණ
 - අවයව වල බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර නිදහස් පෘෂ්ඨ ආවරණය (ආස්කරණය) කරයි
 - සෛල ඉතා තදින් ආසන්නව ඇසිරී ඇත
 - අපිච්ඡද පටකයේ සෛල වලට එකිනෙකට වෙනස් පෘෂ්ඨ දෙකක් පවතී
 - එනම්
 - අග්‍රස්ථ පෘෂ්ඨය මෙය නිදහස් ව පවතී.
 - පාදස්ථ පෘෂ්ඨය මෙය දරණු පටලයට සම්බන්ධ වී පවතී
 - පටකය තුළ රුධිරවාහිනී නැත

simple epithelium



- එබැවින් අපිච්ඡද පටක පෝෂක ලබාගන්නේ ඊට පහළින් ඇති සම්බන්ධක පටකය මගින් විසරණයෙනි
- නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ස්නායු සැපයුමක් පවතී
- කෘත්‍යය
 - ආරක්ෂාව සැපයීම
(උදා : යාන්ත්‍රික හානිවලට ව්‍යාධිජනකයින්ට හා තරල හානියට එරෙහිව බාධකයක් ලෙස කිරීම)
 - ප්‍රාවය සිදු කිරීම
(උදා : එන්සයිම හෝමෝන ශ්ලේෂ්මල දහදිය)

3. ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය (උදා : පෝෂක)

- දරණු පටලය මත ඇති සෛල ස්ථර ගණන අනුව අපිච්ඡද පටක ආකාර දෙකකි.

- එනම්

1. සරල අපිච්ඡද

තනි සෛල ස්ථරයකි

උදා :

- සරල ශල්කමය අපිච්ඡදය
- සරල සනාකාර අපිච්ඡදය
- සරල ස්ථම්භික අපිච්ඡදය
- ව්‍යාජ ස්ථරික අපිච්ඡදය

2. සංයුක්ත අපිච්ඡද

සෛල ස්තර කිහිපයකි

උදා :

- ස්ථරික ශල්කමය අපිච්ඡදය
- සංක්‍රාන්ති අපිච්ඡදය

1. සරල අපිච්ඡද

❖ සරල ශල්කමය අපිච්ඡදය

- තැටි ආකාර සෛල වලින් සැදී ඇති තනි සෛල ස්ථරයකි
- කුනී අපිච්ඡදයකි
- මේ නිසා එය හරහා ද්‍රව්‍ය කාන්දු වීම පහසුවෙන් සිදුවේ
- එබැවින් මෙම පටකය විසරණය මගින් ද්‍රව්‍ය හුවමාරු වන ස්ථාන වල ප්‍රධාන වශයෙන් පවතී

❖ පිහිටන ස්ථාන

- රුධිර කේශනාලිකා වල බිත්තිය
- ධමනි සහ ශිරා වල අන්තස්වදය
- ගර්භ බිත්තිය
- බෝමාන් ප්‍රාචරය

❖ සරල සනාකාර අපිච්ඡදය

- දෘඪ තැටි හැඩැති සෛල වලින් සැදී ඇති තනි සෛල ස්ථරයකි
- ප්‍රාවය සඳහා විශේෂණය වී ඇති පටකයකි
- භූගර්භ වල ඉරිත


❖ පිහිටන ස්ථාන

- වෘක්ක නාලිකා
- තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය
- බේට් ග්‍රන්ථිය

❖ සරල ස්ථම්භික අපිච්ඡදය

- විශාල ගවොල් කැට හැඩැති තනි සෛල ස්ථරයකින් යුක්ත වේ
- ද්‍රව්‍ය ස්‍රාවය හෝ අවශෝෂණයට වැදගත් වන ස්ථාන වල බොහෝ විට පවතී
- පිහිටන ස්ථාන
 - ආන්ත්‍රික ආස්තරණය


❖ ව්‍යාප්ත ස්ථම්භික ස්ථම්භික අපිච්ඡදය



- විවිධ උස වලින් යුතු සෛල සහිත තනි සෛල ස්ථරයකින් සමන්විත වේ
- සෛල වල නාස්ට් පිහිටන මට්ටම් විවිධ වේ
- එබැවින් මෙම පටකය සෛල ස්තර කිහිපයකින් සමන්විත ලෙස දක්නට ලැබේ
- බොහෝ පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ මෙම අපිච්ඡදය පිහිටන ස්ථානය අනුව යම් යම් විකරණය වීම් දැකීමට හැකි වේ
- එනම් සෛල වල නිදහස් කෙළවර පක්ෂම පැවතීම සහ
- පටකයේ වූ සෛල අතර ශ්ලේෂ්මලසූචි කළස් සෛල පැවතීමයි
- මෙසේ පවතින පක්ෂම අපිච්ඡද පටකයේ මතුපිට පෘෂ්ඨය හරහා ශ්ලේෂ්මලය පැතිරීමට උදව් කරයි
- පිහිටන ස්ථාන
 - නාස් මාර්ගයේ ඇතුළු ආස්තරණය
 - ශ්වාසනාලයේ ඇතුළු ආස්තරණය

2. සංකීර්ණ අපිච්ඡදය

❖ ස්ථම්භික ශල්කමය අපිච්ඡදය




- සෛල ස්ථර ගණනාවකින් යුක්ත වේ
- මෙම අපිච්ඡදයේ වූ සෛල ඉතා ඉක්මනින් පුනර්ජනනය වේ
- මෙහිදී දරණු පටලයට ආසන්නයේ නව සෛල නිපදවෙන අතර
- මෙසේ නිපදවෙන නව සෛල මගින් පැරණි සෛල ප්‍රතිස්ථාපනය වේ
- මෙහිදී පැරණි සෛල ගැලවී ඉවත් වේ
- මෙම පටකය සිරුම්වලට සහ සර්වණයට ලක්වන ස්ථාන වල ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම පටකය පිහිටයි

➢ පිහිටන ස්ථාන

- සමේ පිටත ප්‍රදේශය (අපිච්ඡරමය)
- මුඛ කුහර ආස්තරණය
- ග්‍රසනිකාව
- අන්තසෛෂ්‍රිතයේ ඇතුළු ආස්තරණය
- ගුදය
- යෝනි මාර්ග ඇතුළු ආස්තරණය

❖ සංක්‍රාන්ති අපිච්ඡදය



- මෙයද සෛල ස්ථර ගණනාවකින් සමන්විත වේ
- මෙහි පිහිටන සෛල තරමක පෙයාර්ස් හැඩයක් ගනී
- මෙම සෛල වල සැකැස්ම නිසා මෙම අපිච්ඡදයට ආතතියක් හමුවේ ඇදී යාමට හැකි වේ
- පිහිටන ස්ථාන
 - මුත්‍රාශ බිත්තිය
 - මුත්‍ර මාර්ගයේ සමහර කොටස්

2) සම්බන්ධක පටකය

- දේහය තුළ වඩාත් බහුලව පවතින පටකය වේ
- මෙමගින් අවයව හා පටක ව්‍යුහමය සහ කාර්යමය ලෙස සම්බන්ධ කිරීමට උපකාරී වේ

- මෙම වර්ගයේ පටක සමන්විත වන්නේ
 1. විශාල ප්‍රමාණයේ බහිස්සෙලිය පුරකයක්
 2. පුරකය තුළ ගිලී පවතින විවිධ සෙල
 3. පුරකය තුළ පැතිරී ඇති විවිධ තන්තු වලිනි

- මෙම පටකයේ පවතින පුරකය
 - සන (සන සහ දැඩි)
 - අර්ධ සන (රෙලි ආකාර)
 - ද්‍රව විය හැකි වේ

- මෙම පටකයේ පවතින විවිධ තන්තු වර්ග සහ ඒවායේ කාර්යය ලෙස
 - කොලැජන් තන්තු (ශක්තිය සහ සුනම්‍යතාවය සපයයි)
 - ජාලාකාර තන්තු (සම්බන්ධක පටක යාබද පටකවලට සම්බන්ධ කරයි)
 - ප්‍රත්‍යස්ථ තන්තු (පටකයේ ප්‍රත්‍යස්ථ බව ඇති කරයි)

- මෙම පටකයේ පවතින විවිධ සෙල වර්ග සහ ඒවායේ කාර්යය ලෙස
 - තන්තු සෙල (තන්තු ප්‍රෝටීන ස්‍රාවය කරයි)
 - මහා හක්ෂාණු (හක්ෂකසෙලිකතාවය මගින් ආගන්තුක අංශු සහ සෙල සුන්බුන් පරිග්‍රහණය කරයි)
 - කුඩා සෙල (හෙපැරින් හා හිස්ටැමින් ස්‍රාවය කරයි)
 - මේද සෙල (මේද ගබඩා කිරීම සහ පරිවරණය කරයි)
 - සුදු රුධිරාණු (ආරක්ෂාව සපයයි)

- සම්බන්ධක පටක වර්ග කිහිපයකි. ඒවා නම්

1. ලිහිල් සම්බන්ධක පටකය
2. ඝන සම්බන්ධක පටකය
3. මේද පටකය
4. රුධිර පටකය
5. කාර්ටිලේජ පටකය
6. අස්ථි පටකය


1. ලිහිල් සම්බන්ධක පටකය (අරියල පටකය)

- පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ දේහ තුළ වඩාත්ම පුළුල්ව ව්‍යාප්ත වූ සම්බන්ධක පටකයයි
- මෙම පටකය සමාන්තර සම්බන්ධක පටකය ලෙස සැළකිය හැකි වේ

- මෙම පටකයෙහි තන්තු සෙල මහාහක්ෂාණු කුඩා සෙල සුදු රුධිරාණු හා මේද සෙල පවතී
- මෙම පටකය තුළ තන්තු වර්ග තුනම හමුවේ
- මෙම තන්තු ලිහිල්ව ඇසිරී ඇති අතර රුධිර ආකාර ස්වභාවයක් ගනී

කාර්යය

- මෙම පටකය අපිච්ඡද සහ ඊට යටින් පිහිටි පටක බැඳ තබා ගනී
- මෙමගින් අවයව නියමිත ස්ථාන වල රඳවා තබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබේ
- මෙම පටකය සමට යටින් සහ දේහය පුරා පැවතී ඇත



2. ඝන සම්බන්ධක පටකය (ඝන සම්බන්ධක පටකය)

- මෙම පටකය කොලැජන් තන්තු මගින් ඝනව ඇසිරී ඇත
- එබැවින් පුරකය සාපේක්ෂව ක්ෂීණ වී ඇත
- මෙහි සෙල (තන්තු සෙල) ඉතා සුළු සංඛ්‍යාවක් පවතී

කාර්යය

- මෙම පටකය ආනතය ශක්තිය අවශ්‍ය ස්ථාන වල පවතී (උදා : බන්ධන වල, බණ්ඩරා වල)

3. මේද පටකය

- මෙය මේද සෙල වලින් සමන්විත වේ
 - මෙහි පවතින සෑම මේද සෙලයක්ම පාහේ මේද ගෝලිකාවකින් යුක්ත වේ
 - මෙය විශේෂණය වූ විශේෂිත ලිහිල් සම්බන්ධක පටක වර්ගයක් වේ
- කාර්යය**
- මෙය දේහය පරිවරණය කරයි
 - දේහ පිරවුමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි
 - ඉන්ධන ලෙස මේද අණු ගබඩා කරයි
 - මෙය සමට යටින් පිහිටා ඇති අතර එහි මෙම පටකය තාප පරිවරණය සහ ශක්ති ගබඩාවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි

3) ජේෂ් පටකය

- ජේෂ් පටකය වලනය සඳහා දායක වේ
- ජේෂ් පටකයේ සෛල ඇක්ටින් හා මයොසින් ප්‍රෝටීන් වලින් සමන්විත වේ
- මේ පටකයට සංකෝචනයට සහ ඉහිල් වීමට හැකියාව පවතී
- පෘෂ්ඨවංශී සිරුර තුළ මූලික ජේෂ් පටක ආකාර 3ක් පවතී.
- එනම්
 1. සිනිඳු ජේෂ් පටකය
 2. කංකාල ජේෂ් පටකය
 3. හෘත් ජේෂ් පටකය

1. සිනිඳු ජේෂ් පටකය

- සෛල වල හැඩය තර්කුරූපී වේ
- සෛල ඒකාන්ත වේ
- සෛල නිරවිදික වේ
- අනිවාර්‍යව ක්‍රියා කරයි

කෘත්‍යය

- ආමාශයේ සිදුවන මත්ගැම
- ධමනි සංකුචනය වැනි දේහයේ සිදුවන අනිවාර්‍යව කෘත්‍යයන් සඳහා වැදගත් වේ

පිහිටන ස්ථාන

- ආහාර මාර්ගය තුළ
- මුත්‍රාශයේ
- ධමනි බිත්ති වල

2. කංකාල ජේෂ් පටකය

- සෛල දිගු සිලින්ඩරාකාර හැඩැති වේ
- සෛල කළඹක් ආකාරයට පිහිටයි
- සෛල බහුතාන්ත්‍රික වේ
- සෛල විලිඛිත වේ
- මේවායේ සංකෝචක ඒකක ලෙස සාකොමියර පවතී
- විලිඛිත පෙනුම ලැබෙන්නේ මෙම සාකොමියර වල පිහිටීම නිසා වේ
- ඉවහරුනුව ක්‍රියා කරයි


කෘත්‍යය

- දේහයේ ඉවහරුනුව වලන වලට දායක වේ
- පිහිටන ස්ථාන
- සිරුරේ පවතින අස්ථි වලට සම්බන්ධ වී පවතී

3. හෘත් ජේෂ් පටකය

- සෛල සිලින්ඩරාකාර සහ ශාඛනය වී පවතී
- ඒක තාන්ත්‍රික සෛල වේ
- සෛල වල සාකොමියර පැවතීම නිසා විලිඛිත වේ
- හෘත් ජේෂ් සෛල අතර පමණක් පවතින විශේෂිත ව්‍යුහයක් වන අන්තරාස්ථාපිත මඬල පවතී
- මෙය සෛලයෙන් සෛලයට සංඥා හුවමාරුවට සහ

- හෘදයේ සමකාලිකව සංකෝචනයට ඉවහල් වේ
- අනිවාර්‍යව ක්‍රියා කරයි



කෘත්‍යය

- හෘදයේ අනිවාර්‍යව සංකෝචනය සිදු කිරීම පිහිටන ස්ථාන
- හෘද බිත්තියේ පමණක් පිහිටයි

4) ස්නායු පටකය

• ස්නායු පටකය

1. නියුරෝන සෛල
2. නියුරොග්ලියා සෛල

යන සෛල වලින් සමන්විත වේ

1. නියුරෝන සෛල

- ස්නායු පද්ධතියේ මූලික ව්‍යුහමය ඒකකය නියුරෝන වේ
- නියුරෝනයකට සෛල දේහයක් අනුශාඛිකා සහ අක්සනයක් පවතී
- අනුශාඛිකා හා සෛල දේහ වලින් වෙනත් නියුරෝන වලින් පැමිණෙන ආවේග ලබා ගනී
- අක්සන මගින් වෙනත් නියුරෝන වලට හෝ ජේෂ්වලට ආවේග සම්ප්‍රේෂණය සිදු කරයි
- නියුරෝන වල අක්සන රාශියක් කදම්භයක් ආකාරයට එක් වී ස්නායු සැදී ඇත

2. නියුරොග්ලියා සෛල

- නියුරොග්ලියා සෛල මගින් නියුරෝන වල සන්ධාරණය සැපයීම ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරයි
- මේවා ග්ලියා සෛල විශේෂයකි
- ග්ලියා සෛල වල කාර්යභාරය ලෙස
 1. ස්නායු සෛල වලට පෝෂණය සැපයීම
 2. ස්නායු සෛල පරිවරණය කිරීම
 3. ස්නායු සෛල වල අඩුව සම්පූර්ණ කි සහ පිරවීම
 4. සමහර අවස්ථා වල ස්නායු සෛල කෘත්‍යය නිසි පරිදි හැසිරවීම

- සත්ත්ව පෝෂණය යනු
 - දේහයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලි සඳහා අවශ්‍ය වන
 - කාබන් සහ ශක්ති අවශ්‍යතාවය
 - බාහිර පරිසරයෙන් ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලියයි

- සතුන් සියල්ලම විෂමපෝෂී පෝෂණය පෙන්වයි
- විෂමපෝෂී පෝෂණ ක්‍රියාවලිය යනු, අනෙකුත් ජීවීන් අධිග්‍රහණයෙන් හෝ අනෙකුත් ජීවීන්ගෙන් ව්‍යුත්පන්න වූ ද්‍රව්‍ය මගින් කාබනික ආහාර අණු ලබා ගැනීමයි.
- සතුන්ට අමතර ව දිලීර, බොහෝ බැක්ටීරියා විෂමපෝෂී වේ.

- (1) සත්ත්ව සදාශ පෝෂණය හා
- (2) සහජීවනය ලෙස විෂමපෝෂී ආකාර දෙකකි.

(1) සත්ත්ව සදාශ පෝෂණය

- බොහෝ සතුන් සත්ත්ව සදාශ පෝෂණ ආකාරයක් පෙන්වනු කරන අතර, එහි දී ඔවුහු ආහාර මාර්ගයට ආහාර අධිග්‍රහණය කරයි.
- මේ පෝෂණ ආකාරය ප්‍රධාන පියවර පහකින් යුක්ත වේ.

- (1) අධිග්‍රහණය,
- (2) ජීර්ණය,
- (3) අවශෝෂණය,
- (4) ස්විකරණය හා
- (5) බැහැර කිරීම/ පහ කිරීමයි.

සත්ත්ව සදාශ පෝෂණ ක්‍රමයේ ප්‍රධාන අදියර

(1) අධිග්‍රහණය:

- මෙය පළමු අදියර වන අතර, බුද්ධි හෝ හෝස්තය යන ක්‍රියාවලිය සිදු වේ.
- මෙය ආහාර ප්‍රභවය හා සත්ත්ව විශේෂ අතර වෙනස වේ.
- ආහාරය හා පරිසරය මත පදනම්ව විවිධ සත්ත්ව විශේෂයන්ට විවිධ ආහාර අධිග්‍රහණ ආකාර ඇත.

(2) ජීර්ණය:

- මෙහි දී ජලාස්ම පටලය හරහා ජීවීන්ගේ සෛල තුළට ඇතුළු වීමට තරම් ප්‍රමාණවත් කුඩා අණුවලට ආහාර බිඳ දැමීම සිදු වේ.
- ආහාර ජීර්ණය යාන්ත්‍රිකව (දත් මගින්/ පේෂි ක්‍රියාකාරීත්වයෙන්) හා රසායනික ව (එන්සයිම) මගින් සිදු විය හැකි ය.
- යාන්ත්‍රික ජීර්ණයේ දී ආහාර කුඩා කොටස්වලට බිඳ දමන අතර, එමගින් කාර්යක්ෂම රසායනික ජීර්ණය සඳහා පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි කෙරේ.
- රසායනික ජීර්ණයේ දී එන්සයිම මගින් විශාල අණුවල ඇති බන්ධන බිඳ දමමින් කුඩා අණු බවට බිඳ හෙළේ.
- ආහාර ජීර්ණය අවසානයේ දී, ආහාර සැකසුම් කිරීමේ අවසාන ක්‍රියාවලි දෙක සිදු වේ.

(3) අවශෝෂණය:

- මේ අවධියේ දී, සත්ත්වයන්ගේ සෛල මගින් කුඩා අණු ලබා ගනී. උදා: සරල සීනි, ඇමයිනෝ අම්ල

(4) ස්විකරණය:

- ශරීරයේ විවිධ කෘත්‍ය සඳහා අවශෝෂණය කරන ලද පෝෂක ප්‍රයෝජනකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

(5) පහ කිරීම:

- ජීර්ණය නොකරන ලද ද්‍රව්‍ය ආහාර මාර්ගයෙන් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.
- මෙය බහිස්ප්‍රාවය සමග පටලවා නොගන්න

සතුන්ගේ හෝස්ත යන්ත්‍රණ

- ප්‍රධාන ආකාර 4කි

(1) පෙරා බුද්ධිනෝ (Filter & feeders)

- අවට ඇති ජලීය මාධ්‍යයෙන් අවලම්බිත ආහාර අංශු පෙරා ගනිති.
- ඒ සඳහා ඇල්ලා ගැනීම, උගුල් වැනි විවිධ යන්ත්‍රණ යොදා ගනිති.
- උදා: කාවටියන් සහ මවටියන්ගේ ජලක්ලෝම මගින් ගමන් කරන ජලයේ ඇති කුඩා ආහාර අංශු හෝස්තය කරනු ලැබේ. මෙහි දී එම ආහාර අංශු කුඩා ශ්ලේෂ්මල පටලයක් තුළින්, ජලක්ලෝමවල ඇති පක්ෂම සැලීම මගින් සත්ත්වයාගේ මුඛය දක්වා ඇදී යයි.
- තල්මසා - බැලින් තල්මසා පෙරා බුද්ධි සිදු කරයි.

(2) තරල බුද්ධිනෝ (Fluid & feeders)

- ජීවී ධාරකයාගේ පෝෂකවලින් සරු තරලය හොඳින් අනුවර්තිත මුඛ කොටස් භාවිත කරමින් උරා ගනිති.
- උදා: මදුරුවා - මිනිසාගේ රුධිරය උරා බීම
- කුඩත්තා ශාකවල ජලෝයම යුෂය උරා බීම
- මීමැස්සා හා ගුමනකුරුල්ලා මල් වලින් පැණ උරා බීම.

(3) උපස්තර බුද්ධිනෝ (Substrate feeders)

- මෙම සත්තු ආහාර ප්‍රභවය මතු හෝ ආහාර ප්‍රභවය තුළ සිටිමින් ආහාර අනුභව කරති.
- කොළ කන දළඹුවා (The leaf miner Caterpillar): ශාක පත්‍ර තුළින් අනුභව කරයි. **භෞමික 6640 භෞමික 6640**
- ගුහර පත්‍රවා (Maggots-fly larvae):- සත්ත්ව මළකුණු තුළට භාරයි.

(4) තොග බුද්ධිනෝ (Bulk feeders)

- සාපේක්ෂව විශාල ආහාර කොටස් අනුභව කරන සත්තු තොග බුද්ධිනෝ ය.
- ආහාර ඉරීම හෝ ගොදුර ග්‍රහණය කිරීමට මේ සතුන්ට විවිධ ආකාරයේ අනුවර්තන ඇත. (උදා: හනු, දත්, ග්‍රාහිකා, තබර, විෂ දළ)
- උදා: මිනිසා ඇතුළු බොහෝ සත්තු

(2) සහජීවනය

- එකිනෙකාට සමීපව ජීවත් වන
- වෙනස් විශේෂ දෙකකට අයත් වන ජීවීන් අතර,
- පෝෂණය මුල් කරගෙන ඇතිවන
- ඇති පාරිසරික සම්බන්ධතාවයයි.
- එය ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුනකට බෙදිය හැකි ය. එනම්

- (1) අන්‍යෝන්‍යාධාරය,
- (2) පරපෝෂිතාවය සහ
- (3) සහභෝජිත්වය ලෙස ය.

(1) අන්‍යෝන්‍යාධාරය (Mutualism)

- වෙනස් විශේෂ දෙකක ජීවීන් දෙදෙනෙකු අතර, සමීප සම්බන්ධතාවකි. සාමාජිකයන් දෙදෙනාට ම වාසි ලැබේ.
- උදා: රෝමාන්තකයන්ගේ සෙලියුලෝස් ජීරණය කරන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හා රෝමාන්තකයෝ,
- වේයන් තුළ සිටින සෙලියුලෝස් ජීරණය කරන බැක්ටීරියා සහ වේයා,
- මිනිසා සහ විටමින් K නිපදවන ආන්ත්‍රික බැක්ටීරියා

(2) සහභෝජිත්වය (Commensalism)

- විවිධ විශේෂවල ජීවීන් දෙදෙනෙකු අතර, ඇති සමීප සම්බන්ධතාවයකි.
- එහි දී එක් ජීවියකුට වාසි සැලසෙන අතර, අනෙක් ජීවියාට බලපෑමක් සිදු නොවේ (වාසියක් හෝ හානියක් සිදු නොවේ).
- උදා: තල්මසා සහ තල්මසාට සවි වී සිටින බෙලි ඇණයා / බණ්ඩාවාරකයා (Barnacle)
- ගවයා සහ කොකා

(3) පරපෝෂිතාව (Parasitism)

- වෙනස් විශේෂවලට අයත් ජීවීන් දෙදෙනෙකු අතර, ඇති සමීප සම්බන්ධතාවකි.
- එහි දී එක් ජීවියකුට (පරපෝෂිතයාට) වාසි සැලසෙන අතර, අනෙක් ජීවියාට (ධාරකයාට) හානි පෑමකි.
- පරපෝෂිතයා ධාරකයා මත හෝ ධාරකයා තුළ ජීවත් වන අතර, ඔවුන්ගෙන් පෝෂක ලබා ගනී.
- උදා: පට්ටණුවා සහ මිනිසා,
- උකුණා සහ මිනිසා සහ *Plasmodium* (මැලේරියා පරපෝෂිතයා)

මානව ජීරණ පද්ධතිය

මානව ජීරණ පද්ධතියේ ව්‍යුහය හා කෘත්‍යය

- මානව ආහාර මාර්ග නාලය දිගු නලයක්/ මාර්ගයක් වන අතර, එය බාහිර පරිසරයට සම්බන්ධ වේ.
- මෙය සත්ත්ව සදෘශ පෝෂණ ආකාරයේ පිටවර සම්පූර්ණ කිරීමේ හැකියාව දරයි.

- මානව ජීරණ පද්ධතිය ආහාර මාර්ගය හා එය ආශ්‍රිත ශ්‍රන්ථිවලින් සමන්විත වේ.
- ආහාර මාර්ගය පහත කොටස්වලින් සමන්විත වේ.
- මුඛ කුහරය, ග්‍රසනිකාව, අන්ත්‍රසෘෂ්ටය, ආමාශය, කුඩා අන්ත්‍රය, මහා අන්ත්‍රය, ගුද මාර්ගය හා ගුදය, ආහාර මාර්ගය ආශ්‍රිත ශ්‍රන්ථි ලෙස බෙට් ශ්‍රන්ථි අක්මාව සහ අන්ත්‍රාශය ඇත.

(1) මුඛය/ මුඛ කුහරය

- මුඛ කුහරය දිව, දත් හා බෙට් ශ්‍රන්ථිවලින් සමන්විත වේ.
- අධ්‍යුග්‍රණය හා ආහාර ජීරණයේ මූලික පියවර මුඛ කුහරය තුළ සිදු වේ.
- මුඛය තුළ රසායනික හා යාන්ත්‍රික ජීරණය යන ආකාර දෙකම සිදු වේ.
- මුඛය තුළ දත් ආකාර හතරක් දක්නට ලැබේ.
- ඒවා නම් කෘත්කක, රදනක, පුර්ණ වාර්ථක හා වාර්ථක
- වෙනස් හැඩ සහිත, වෙනස් වර්ගවල දත් මගින් ආහාර කැපීම, පොඩි කිරීම හා ඇඟිරීම සිදු කෙරේ.
- මෙමගින් ආහාර ගිලීම පහසු කිරීම,
- ආහාර ජීරණය සඳහා පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි කිරීම සිදු කරයි.
- මුඛ කුහරයට බෙට් ශ්‍රන්ථිවල ඇති ප්‍රනාල මස්සේ බෙට්වය ස්‍රාවය කරයි.
- මුඛ කුහරයට ආහාර ඇතුළු වීමේ දී ස්නායු ප්‍රතිකයක් මගින් බෙට්වය මුඛ කුහරයට නිදහස් කරයි.
- ආහාර මුඛ කුහරයට ඇතුළු වීමට පෙර වෙනත් විවිධ උත්තේජ මගින් ද බෙට් ස්‍රාවය උත්තේජනය කරයි. (උදා: ආහාරය දැකීම, ආහාරයේ ගන්ධය ආදිය).

බෙට්වයේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය

- ජලය,
- ඇමයිලේස්,
- ශ්ලේෂ්මල (ලවන, සෙල හා ලිහිසි ශ්ලයිකො ප්‍රෝටීනයක් වන මියුසින් සහිත දුස්ස්‍රාවී මිශ්‍රණයකි)
- ස්චාරක්ෂක සංඝටක
- ප්‍රතික්ෂුද්‍ර ජීවී සංඝටක

බෙට්වයේ කෘත්‍ය

- (1) බෙට් ඇමයිලේස්: පොලිසැකරයිඩ (උදා: පිෂ්ඨය) රසායනිකව ජීරණය කර, කුඩා පොලිසැකරයිඩ හා ඩයිසැකරයිඩ (මෝල්ටෝස්) බවට පත් කරයි.
- (2) ජලය: රසායනික ජීරණය සඳහා ආහාර ද්‍රාව්‍යකරණය හා ජලීය මාධ්‍යයක් සපයයි. රස ප්‍රතිග්‍රහණයට ආධාර සපයයි.
- (3) ශ්ලේෂ්මල: ආහාර ස්නේහනය මගින් ආහාර ගිලීම පහසු කරයි. මුඛය පිරිසිදු කිරීම හා මුඛ ආස්තරණය පිරිමවලින් ආරක්ෂා කරයි.
- (4) ප්‍රතික්ෂුද්‍ර ජීවී ද්‍රව්‍ය - ඉමියුනොග්ලොබියුලින් හා ලයිසොසයිම් වැනි ද්‍රව්‍ය: මුඛයට ඇතුළු වන බැක්ටීරියාවන්ට එරෙහි ක්‍රියා කිරීමෙන් ආරක්ෂාව සපයයි.

ඇර්මී, ප්‍රෝටීන, කුඩා පොලිපෙප්ටයිඩ බවට පත් කරයි.

- (4) ජලය, මධ්‍යසාර, සමහර මෘතධ වර්ග වැනි ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කරයි.
- (5) විශිෂ්ට නොවන ආරක්ෂාව - HCl ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කරයි.
- (6) ආලාර චක්‍රපිධානය මස්සේ ආමලසය කුඩා ප්‍රමාණවලින් විදිමින් (small jets) පිටතට තල්ලු කරයි.
- (7) ආමාශයේ ජීරණ ක්‍රියාවලිය යාමනය කරන ගැස්ට්‍රින් හෝර්මෝනය ප්‍රාචය කරයි.

(6) කුඩා අන්ත්‍රය:

- ආහාර මාර්ගයේ දීර්ඝතම අවයවයයි.
- එය කොටස් තුනකට බෙදිය හැකි ය. ඒවා නම්
- **ග්‍රහනිය (Duodenum)**
අන්ත්‍රාශයික හිස වටා ඇති C හැඩැති චක්‍රයක් ලෙස සැකසුන කුඩා අන්ත්‍රයේ පූර්ව කොටසයි. (විෂ්කම්භය 0.75-1.25 cm)
- **ඉන්තාන්ත්‍රය (Jejunum)**
කුඩා අන්ත්‍රයේ මැද කොටසයි.
- **ශේෂාන්ත්‍රය (Ileum)** වේ.
කුඩා අන්ත්‍රයේ ඇති අවසාන කොටසයි.
කුඩා අන්ත්‍රයේ ඇති ස්ථිර වෘත්තාකාර නැමුම් සහ අංගුලිකා නිසා එහි පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය අතිශයින් වැඩි වී ඇත.
අංගුලිකා, කුඩා අන්ත්‍රයේ බිත්තියේ ඇති කුඩා ඇඟිලි ආකාර තෙරුම් වේ.
ග්‍රහනිය තුළ දී ජීරණයේ වැඩි කොටසක් අවසන් වේ.
පෝෂක අවශෝෂණය ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු වන්නේ ඉන්තාන්ත්‍රය හා ශේෂාන්ත්‍රය තුළ දී ය.

කුඩා අන්ත්‍රය තුළ සිදු වන රසායනික ජීරණය

- කුඩා අන්ත්‍රයට, ආමාශයෙන් ආමලසය ලැබේ.
- මෙය සිදු වීමට ක්‍රමානුචිත සංකෝචනයන් ආධාර වේ.
- ආමලසය කුඩා අන්ත්‍රය තුළට යැවීම ආලාර චක්‍රපිධානය මගින් යාමනය වේ.
- අන්ත්‍රික බිත්තියේ ඇති ග්‍රන්ථිවල ප්‍රාචයන්, අන්ත්‍රාශයෙන් හා අක්මාවේ ප්‍රාචයන් සමඟ ආමලසය මිශ්‍ර වීම සිදු වේ.
- ග්‍රහනියේ ඇති අපිච්ඡදය ජීරණ එන්සයිම ගණනාවක් ප්‍රාචය කරයි.
- ඩයිසැකරයිඩේස, ඩයිපෙප්ටයිඩේස, කාබොක්සිපෙප්ටයිඩේස, ඇමයිනෝපෙප්ටයිඩේස, නියුක්ලියෝටයිඩේස, නියුක්ලියෝසයිඩේස සහ පොස්ෆෝවේස වැනි එන්සයිම ආන්ත්‍රික බිත්තියේ ඇති ග්‍රන්ථි මගින් ප්‍රාචය කරයි.
- සමහර එන්සයිම ආන්ත්‍රික කුහරයට ප්‍රාචය කරන අතර,

- අනෙකුත් එන්සයිම අපිච්ඡදයේ මතුපිට පෘෂ්ඨයට බැඳී පවතී.
- ග්‍රහනිය මගින් කොලිසිල්වොකයිනීන් හා සික්ලීන් යන හෝමෝන දෙක ප්‍රාචය කරයි.
- ඒවා මගින් අන්ත්‍රාශයික යුෂ හා පිත් නිදහස් කිරීම උත්තේජනය කරයි.
- අන්ත්‍රාශයික යුෂයේ ට්‍රිප්සින්, කයිමොට්‍රිප්සින්, අන්ත්‍රාශයික ඇමයිලේස්, අන්ත්‍රාශයික කාබොක්සිපෙප්ටයිඩේස්, අන්ත්‍රාශයික නියුක්ලියේස සහ අන්ත්‍රාශයික ලයිපේස යන එන්සයිම අඩංගු වේ.
- මීට අමතරව එහි බයිකාබනේට් ද අඩංගු වේ.
- අක්මාව මගින් ප්‍රාචය කරන පිත් ග්‍රහනියට නිදහස් කරන තුරු පිත්තාශය තුළ ගබඩා කර තිබේ.
- පිතෙහි, පිත් ලවණ අඩංගු වේ.
- එමගින් මේද තෙලෝද්ධරණය කරන අතර, එය මේද ජීරණයට සහ අවශෝෂණයට උදවු වේ.

කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජීරණය

ජීරණ රටා

කොලිකර්මාලයේ අනුග්‍රහණය වී ඩයක්සා කරයි.
(ශ්‍රී භරණය) ඇමයිලේස්

ඩයක්සා කරයි අනුග්‍රහණය වී මොනොසැකරයිඩ්
(ශ්‍රී භරණය) ඩයක්සා කරයි

* බේට්ටේස්
* ප්‍රොෂීස්
* ලැක්ටේස්

මේද ජීරණය

ප්‍රතිකර්මකර්මයේ ජීර්ණය මොනොලැක්ටේස්
(ශ්‍රී භරණය)

ප්‍රතිකර්මකර්මයේ ජීර්ණය මොනොලැක්ටේස්
(ශ්‍රී භරණය)

ප්‍රතිකර්මකර්මයේ ජීර්ණය මොනොලැක්ටේස්
(ශ්‍රී භරණය)

තෙල්ලෙන් ලැබෙන $\rightarrow$ කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන
 කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන $\rightarrow$ කුඩා කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන
 කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන $\rightarrow$ කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන
 කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන $\rightarrow$ කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන
 කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන $\rightarrow$ කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන


කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන
 කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන
 කුඩා තෙල්ලෙන් ලැබෙන

- කාර්යක්ෂම අවශෝෂණය සඳහා, ආන්ත්‍රික බිත්තියේ පාෂාණ ක්ෂේත්‍රය ව්‍යුහමය විකරණයන් තුනක් මගින් වැඩි වී ඇත. ඒවා නම්
- (1) සහ ස්ථිර නැමීම.
- (2) අංශුලිකා නම් ආන්ත්‍රික බිත්තියේ ඇති ඇඟිලි බදු තෙරුම්.
- (3) ක්ෂුද්‍ර අංශුලිකා නම් අංශුලිකාවල අපිච්ඡද සෛලවල ඇති ඇඟිලි වැනි අන්වීක්ෂීය තෙරුම්, මේ ක්ෂුද්‍ර අංශුලිකා ආන්ත්‍රික කුහරයට නිරාවරණය වී පවතී. මෙමගින් බුරුසුමය පෙනුමක් ලබා දෙයි (බුරුසු ආරය).

- අපිච්ඡදය හරහා පෝෂක පරිවහනය සක්‍රීය. හෝ අක්‍රීය විය හැකි ය.
- අක්‍රීය පරිවහනය ශරීරයේ (පහසු කළ විසරණය)
- සක්‍රීය පරිවහනය ඇමයිනෝ අම්ල, කුඩා පෙප්ටයිඩ, විටමින් සහ බොහෝ ග්ලූකෝස් අණු
- ඉන් පසු මේ පෝෂක අපිච්ඡද සෛලවල සිට අංශුලිකා තුළ ඇති රුධිර කේශනාලිකාවලට පරිවහනය කෙරේ.
- මේ රුධිර කේශනාලිකා යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරාව සෑදීමට අභිසාරී වී එකට එකතු වේ.
- මේ පෝෂක යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරාව මස්සේ අක්මාවට රැගෙන යයි. අක්මාවේ සිට මේ පෝෂක පිරි රුධිරය පටකවලට පරිවහනය කරයි.

මේද අවශෝෂණය

- මේද අම්ල හා මොනොග්ලිසරයිඩ ක්ෂුද්‍ර අංශුලිකා හරහා සෛලය තුළට ඇතුළු වේ.
- සෛල තුළ දී වයිශ්ලිසරයිඩ නැවත නැවත ඇති වේ. ඉන් පසු මේ වයිශ්ලිසරයිඩ නැවත සැකසී, කයිලොමයික්‍රෝන නම් වූ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය කුඩා ගෝලිකා තුළට අන්තර්ගත වේ. ඉන් පසු මේ කයිලොමයික්‍රෝන පයෝලස නාලිකාවට පරිවහනය කෙරේ.
- ඉන් පසු පයෝලස නාලිකාවේ සිට වසා හරහා රුධිර වාහිනීවලට ඇතුළු වේ.
- ඉන් පසු මේ කයිලොමයික්‍රෝන සංසරණ පද්ධතිය මස්සේ දේහය පුරා සංසරණය වේ.
- පෝෂක අවශෝෂණයට අමතර ව, ජලය හා අයන නැවත ලබා ගැනීම කුඩා අන්ත්‍රයේ දී සිදු වේ.



නිපුණත්ව අම්ල ජීරණය

DNA/ RNA නිපුණත්ව අම්ල ජීරණය

නිපුණත්ව අම්ල ජීරණය
 නිපුණත්ව අම්ල ජීරණය
 නිපුණත්ව අම්ල ජීරණය
 නිපුණත්ව අම්ල ජීරණය
 නිපුණත්ව අම්ල ජීරණය

- සිරුරට ලබා ගන්නා ජලය ප්‍රමාණයට (21 පමණ) අමතර ව, ජීරණ යුෂයෙන් තවත් ජලය (71) පමණ කුඩා අන්ත්‍රයට එකතු කෙරේ.
- මේ ජලයෙන් වැඩි කොටසක් ආප්‍රාති ය මගින් නැවත අවශෝෂණය සිදු කෙරේ.

(7) මහා අන්ත්‍රය

- ආහාර මාර්ගයේ අවසාන කොටස මහා අන්ත්‍රයයි.
- එය ප්‍රදේශ තුනකට බෙදිය හැකි ය.
- ඒවා නම්

> මහාන්ත්‍රකය (Colon)

- ජලය ප්‍රතිඅවශෝෂණය සම්පූර්ණ කරයි.
- ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ආධාරයෙන් සමහර විටම B සංකීර්ණ, විටමින් K සහ ෆෝලික් අම්ල සංස්ලේෂණය වේ.
- මහාන්ත්‍රකය ගුද මාර්ගයට හා ගුදයට යොමු වේ.
- මළ (තත්තු වැනි ජීරණය නොවූ ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ). ක්‍රමානුචිතය මගින් මහාන්ත්‍රකය තුළින් ගුදය වෙත ගමන් කිරීම සිදු වේ.

> උණ්ඩුකය (Cecum)

- කුඩා අන්ත්‍රය මහාන්ත්‍රයට "T" හැඩැති සන්ධියකින් සම්බන්ධ වේ.
- මේ "T" සන්ධියේ එක් බාහුවක් මහාන්ත්‍රකය වන අතර, අනෙක් බාහුව කුඩා පැසක් වැනි උණ්ඩුකය වේ.
- උණ්ඩුකයේ උණ්ඩුකප්‍රවණය නම් වූ ඇගිල්ලක් වැනි තෙරුමක් ඇත.
- ජීරණය නොවූ ද්‍රව්‍ය ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් පැසීම සඳහා උණ්ඩුකය වැදගත් වේ.
- එය සිදුවන්නේ විශේෂයෙන් විශාල වශයෙන් ශාක ද්‍රව්‍ය ආහාරයට ගන්නා සත්ත්වයන්ගේ ය.

> ගුද මාර්ගය අනුමාණය කළ ක්‍රමයන්

- බැහැර කරන තෙක් මළ ගබඩා කරයි.
- ගුද මාර්ගය හා ගුදය අතර, පවතින චක්‍රපිඛාන දෙක හේතුවෙන් මළ ගමන් කිරීම යාමනය කරයි.
- මහාන්ත්‍රකය තුළ ප්‍රබල සංකෝචනයන් මළ පහ කිරීම ක්‍රියාත්මක කරයි.

බාහිරාසර්ගී - භූල ඛණ්ඩ

අනුමාණය කළ ක්‍රමයන්

අනුමාණය කළ ක්‍රමයන්

රාශිය

ගුද ක්‍රමයන්

ගුද ක්‍රමයන්

ගුද ක්‍රමයන්

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ


අන්ත්‍රාශය

අන්ත්‍රාශයේ පටකීය ව්‍යුහය


අනුමාණය කළ ක්‍රමයන්

රාශිය - ගුද ක්‍රමයන්

ගුද ක්‍රමයන්



- අන්ත්‍රාශය ලා අළු පැහැති ග්‍රන්ථියකි.
- එය පළල් හිසක්, දේහය සහ පටු වලිගයකින් සමන්විත ය.
- හිස ග්‍රහණී වක්‍රය තුළ පිහිටා ඇත.
- අන්ත්‍රාශය බාහිරාසර්ගී හා අන්තරාසර්ගී ග්‍රන්ථියකි.
- අන්ත්‍රාශයේ බාහිරාසර්ගී කොටස අනුබණ්ඩිකා විශාල සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත වේ.
- මේ අනුබණ්ඩිකා කුඩා බදුරිකාවලින් සමන්විත වන අතර, ඒවායේ බිත්තිය සුළු සෛලවලින් සමන්විත වේ.
- එක් එක් අනුබණ්ඩිකා ඉතා කුඩා ප්‍රනාලවලට සම්බන්ධ වන අතර, එම ප්‍රනාල එකතු වීමෙන් අවසානයේ දී අන්ත්‍රාශයක ප්‍රනාලය සෑදේ.
- මේ අන්ත්‍රාශයක ප්‍රනාලය පිත්ත ප්‍රනාලය සමඟ සම්බන්ධ වී, යාකෘත්-අන්ත්‍රාශයක ප්‍රනාලය සෑදයි.
- මෙය ග්‍රහණීයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ දී එය තුළට විවෘත වේ.
- අන්ත්‍රාශයේ බාහිරාසර්ගී කොටස් අන්ත්‍රාශයක යුෂය ප්‍රාවය කරයි.
- අන්ත්‍රාශයක යුෂයේ සංඝට්ඨ ලෙස බයිකුබිනේට්, කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජීරණය එන්සයිම (අන්ත්‍රාශයක ඇගිල්ලේ), අන්ත්‍රාශයක ලයිපේස්, නියුක්ලියේස් හා ප්‍රෝටීන් ජීරණය එන්සයිමවල අක්‍රිය ආකාර (ට්‍රිප්සිනෝජන් සහ කයිමොට්‍රිප්සිනෝජන්) අඩංගු වේ.
- මේ අක්‍රිය එන්සයිම ග්‍රහණීයේ කුහරයට ප්‍රාවය වීමත් සමඟම සක්‍රීය එන්සයිම (ට්‍රිප්සින් හා කයිමොට්‍රිප්සින්) බවට පරිවර්තනය කෙරේ.
- අන්ත්‍රාශයේ අන්තරාසර්ගී කොටස සමන්විත වන්නේ ලැන්ගහැන් දිපිකා වන අතර, එය විශේෂණය වූ සෛල සමූහයකින් යුක්ත වේ. ඒවාට ප්‍රනාල නැත.
- ලැන්ගහැන් දිපිකා ග්‍රේකයන් හා ඉන්සියුලින් යන හෝමෝන ප්‍රාවය කරයි. කෙළින්ම රුධිරයට.
- ඒවා ග්‍රේකෝස් සමස්ථිතිය සඳහා දායක වේ.



අනුමාණය කළ ක්‍රමයන්

රාශිය

- ආහාර ආමාශයට ළඟා වීම මඟින් මත්ගැමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වන අතර, ආමාශයක යුෂ නිදහස් වීම ද සිදු වේ.
- අත්තරාසර්ග පද්ධතිය ජීර්ණයේ දී විශේෂයෙන් ම ආමාශයේ දී හා කුඩා අන්ත්‍රයේ දී සිදු වන ජීර්ණය තුළ ඉතා වැදගත් මෙහෙයක් ඉටු කරයි.
- ආමාශයට ආහාර ළඟා වීමේ දී ආමාශ බිත්තිය ඇදෙයි.
- මේ හේතුවෙන් ගැස්ට්‍රින් හෝමෝනය නිදහස් වීම ක්‍රියාත්මක වේ.
- ගැස්ට්‍රින් රුධිරය හරහා සංසරණය වී ආමාශයට ළඟා වේ.
- ආමාශය තුළ දී ආමාශයක යුෂ නිපදවීම ගැස්ට්‍රින් මඟින් උත්තේජනය වේ.
- ආමලසයේ ඇති මේද අම්ල හෝ ඇමයිනෝ අම්ල ග්‍රහණයෙන් කොලිසිස්ටොකයිනින් හා සික්‍රටින් නිදහස් කිරීම ක්‍රියාත්මක කරයි.
- කොලිසිස්ටොකයිනින් මඟින්
 - පිත්කාශයෙන් පිත නිදහස් කිරීම සහ
 - අන්ත්‍රාසයෙන් ජීර්ණ ඵත්සයිම නිදහස් කිරීමත් ක්‍රියාත්මක කරයි.
- සික්‍රටින් මඟින්
 - අන්ත්‍රාසයෙන් බයිකාබනේට් නිදහස් කිරීම උත්තේජනය වේ.
- ආමාශයෙන් ලැබෙන, ආමලසය බයිකාබනේට් මඟින් උදාසීන කරයි.
- ආමලසය මේද මඟින් පොහොසත් වූ විට, ග්‍රහණයෙන් නිපදවන කොලිසිස්ටොකයිනින් සහ සික්‍රටින් ඉහළ මට්ටම හේතුවෙන් ආමාශයේ දී ආහාර ජීර්ණය සෙමෙන් සිදු වේ.
- මේ හෝමෝන ආමාශය මත ක්‍රියා කර, ක්‍රමාකූලවනය හා ආමාශයක යුෂ ප්‍රචාරය නිශේධනය කරයි.
- ඒ හේතුවෙන් ජීර්ණය සෙමෙන් සිදු වේ.

සමබල ආහාරය/ තුළිත ආහාරය

සමබල ආහාර වේලක් යනු

- යහපත් සෞඛ්‍ය පැවැත්මක් සඳහා
- අත්‍යවශ්‍ය සියලු පෝෂක
- යෝග්‍ය අනුපාතයකින් අඩංගු වන ආහාර වේලක් වේ
- සමබල ආහාරයක අඩංගු අත්‍යවශ්‍ය සංඝටක වන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ්, තන්තු, ඛනිජ, විටමින් සහ ජලය වේ.
- කාබෝහයිඩ්‍රේට් හා ලිපිඩ් ශක්තිය සපයයි. ශක්ති අවශ්‍යතාව වයස, ස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවය මත, දේහ ප්‍රමාණය හා ක්‍රියාකාරිත්වය මත වෙනස් වේ.

ආහාරයේ සංඝටක හා ඒවායේ කෘත්‍ය

කාබෝහයිඩ්‍රේට්

- කාබෝහයිඩ්‍රේට් සීනි හා පොලිසැකරයිඩ වේ.
- බත්, පාන්, බිස්කට්, ධාන්‍ය, ආජප වැනි විවිධ ආහාර වර්ගවල අඩංගු වේ.
- ජීර්ණයේ දී බොහෝ කාබෝහයිඩ්‍රේට්, මොනොසැකරයිඩ බවට බිඳ හෙළනු ලබන අතර, ඒවා රුධිර ධාරාවට අවශෝෂණය කෙරේ.

ජීර්ණය කළ හැකි කාබෝහයිඩ්‍රේට්වල කෘත්‍ය

- (1) ශක්තිය හා තාපය ලබා දීම
කාබෝහයිඩ්‍රේට් බිඳ හෙළීම මඟින් දේහයේ කෘත්‍ය සඳහා අවශ්‍ය ATP ලබා දෙන අතර, තාපය ජනනය කරයි.
- (2) ශක්ති සංචිතයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි
අතිරික්ත කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ග්ලයිකෝජන් හා මේද බවට පරිවර්තනය කෙරේ.
- (3) ප්‍රෝටීන ඉතුරු කිරීම පහසු කරයි
ආහාරයේ ප්‍රමාණවත් තරම් කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඇති විට ශක්තිය නිපදවීම සඳහා ප්‍රෝටීන යොදා නොගනී.

ප්‍රෝටීන

- ප්‍රෝටීන ඇමයිනෝ අම්ලවලින් සෑදී ඇත.
- ජීර්ණයේ දී ප්‍රෝටීන ඇමයිනෝ අම්ලවලට බිඳ හෙළා ඒවා රුධිර ධාරාවට අවශෝෂණය කර ගනී.
- ඇමයිනෝ අම්ල ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකට බෙදනු ලැබේ. ඒවා නම්
 - අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල (උදා: ලයිසීන්, හිස්ටිඩීන්, මෙතියොනීන්)
 - අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමයිනෝ අම්ල (උදා: ඇලනීන්, සිස්ටීන්)

- මේ අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල ශරීරය තුළ සංස්ලේෂණය කළ නොහැකි ය.
- එනිසා ඒවා ශරීරය තුළට ආහාර හරහා ලබාගත යුතු ය.
- අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමයිනෝ අම්ල ශරීරය තුළ දී සංස්ලේෂණය කළ හැකිය.
- එනිසා ඒවා ආහාර මඟින් ශරීරයට ලබා ගැනීම අනිවාර්ය නොවේ.
- ශරීරය තුළ ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණය සඳහා ඇමයිනෝ අම්ල 20 අතරින් වැඩි ඇමයිනෝ අම්ල ප්‍රමාණයක් දේහය තුළ අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමයිනෝ අම්ල වේ
- සත්ත්ව ප්‍රෝටීනවල සියලු අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල නිවැරදි අනුපාතවලින් අඩංගු වන අතර,
- ශාක ප්‍රෝටීනවල අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ලවලින් එකක් හෝ කිහිපයක් අඩංගු නොවේ.
- එනිසා නිර්මාංශ ශාකමය ආහාර වේලක අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ ශාක ප්‍රෝටීන ප්‍රභව යොදා ගත යුතු ය.

ආහාරයේ ඇති ප්‍රෝටීනවල කෘත්‍යය

- (1) ප්‍රෝටීන මගින් ඇමයිනෝ අම්ල සපයයි. එම ඇමයිනෝ අම්ල දේහයේ සෛල හා පටක වර්ධනය හා අයුරුවැඩියාව සඳහා භාවිතා කරයි.
- (2) ජලාස්මා ප්‍රෝටීන, එන්සයිම, ප්‍රතිදේහ හා සමහර හෝමෝන සංස්ලේෂණයට භාවිතා කරයි
- (3) ශරීර කාර්යයන්ට ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ලිපිඩ

ආහාරයේ ඇති ලිපිඩ ප්‍රධාන වශයෙන් මේද සහ තෙල්වලින් සමන්විත ය.

- ආහාරයේ ඇති ලිපිඩ ප්‍රධාන වශයෙන් මේද සහ තෙල්වලින් සමන්විත ය.
- මේද හා තෙල්වල ව්‍යුහමය සංයුතියක් වන්නේ මේද අම්ලයි.
- අත්‍යවශ්‍ය හා අත්‍යවශ්‍ය නොවන මේද අම්ල ලෙස වර්ග කළ හැකි ය.
- අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ල ශරීරය තුළ සංස්ලේෂණය කළ නොහැකි අතර, අත්‍යවශ්‍ය නොවන මේද අම්ල ශරීරය තුළ සංස්ලේෂණය කළ හැකිය.
- එනිසා අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ල ආහාරය මගින් ලබා ගත යුතුම ය.

ආහාරයේ ඇති ලිපිඩවල කෘත්‍යය

- (1) ශක්තිය හා තාපය සපයයි. (බර මත පදනම්ව, කාබෝහයිඩ්‍රේට් හා ප්‍රෝටීනවලට සාපේක්ෂව, මේද සහ තෙල් වැඩි ශක්ති ප්‍රමාණයක් සපයයි)
- (2) මේදයේ ද්‍රාව්‍ය විටමින් වන විටමින් A, D, E සහ K පරිවහනය හා සංචිත කිරීමට උදවු වේ
- (3) මේදය ලෙස මේද පටකය තුළ ශක්තිය සංචිත කරයි.
- (4) කොලෙස්ටරෝල් වලින් ස්ටෙරොයිඩ් හෝමෝන සංස්ලේෂණයට උදවු වේ.
- (5) පරිවරනය සපයයි. (සමී අධ්‍යවර්මීය පටක ස්ථරයේ ඇති මේදය තාප හානිය අඩු කරයි. නියුරෝනවල ඇති මයිලීන් කොටුව)

විටමින්

- විටමින් යනු, සාමාන්‍ය සෞඛ්‍යය පවත්වා ගැනීමට හා පරිවෘත්තිය පවත්වා ගැනීම සඳහා ඉතා කුඩා ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය කාබනික සංයෝගයි.
- බොහෝ විටමින් ශරීරය තුළ නිපදවීමට නොහැකි නිසා ආහාර මගින් ලබා ගත යුතු වේ.
- ප්‍රමාණවත් ලෙස විටමින් ශරීරයට ලබා ගැනීමට නොහැකි වුව හොත් ද්‍රාව්‍ය රෝග ඇති වේ.
- විටමින් ජල ද්‍රාව්‍ය (විටමින් B සහ C) හා මේද ද්‍රාව්‍ය (විටමින් A,D,E,K) ලෙස වර්ග දෙකකි.

විටමින් K හා B_{12} ආහාර මාර්ගයෙන් ලබා ගත හැක.

විටමින්වල ප්‍රධාන කෘත්‍යය

විටමින්	කෘත්‍යය
විටමින් A	• ඇස් දෘෂ්ටි වර්ණක සෑදීම • අපිච්ඡද පටක පවත්වා ගැනීම • වර්ධනය හා ප්‍රතිශක්තිය දිරිමත් කිරීම
විටමින් B	• FAD, NAD⁺ වැනි සහඑන්සයිමවල සංඝටකයකි. • රතු රුධිර සෛල නිපදවීම දිරිමත් කරයි.
විටමින් C	• ප්‍රතිශක්තිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. • කොලැජන් සංස්ලේෂණ
විටමින් D	• Ca හා P අවශෝෂණයට ආධාර කරයි.
විටමින් E	• ප්‍රතිශක්තිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
විටමින් K	• රුධිර කැටි ගැසීම සඳහා වැදගත් වේ.

බනිජ

සාමාන්‍ය දේහ සෞඛ්‍යයට සහ බොහෝ දේහ කෘත්‍යන්ට වැදගත් වන අකාබනික ද්‍රව්‍ය බනිජ වේ. මිනිසාට අවශ්‍ය වන ප්‍රධාන බනිජ වන්නේ Ca,P,S,K,Cl,Na සහ Mg මිට අමතරව අංශු මාත්‍ර ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය වන බනිජ වන්නේ Fe,F,I,Co,Cu,Mn,Mo,Se සහ Zn.

බනිජවල ප්‍රධාන කෘත්‍යය

බනිජය	කෘත්‍යය
Ca	• දත් සහ අස්ථි සෑදීම • රුධිර කැටි ගැසීමට උදවු වේ. • ස්නායු හා පේශි ක්‍රියාකාරීත්වයට උදවු වේ.
P	• දත් සහ අස්ථි සෑදීම • අම්ල-භස්ම සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට උදවු කිරීම
S	• සමහර ඇමයිනෝ අම්ලවල සංඝටක
K	• අම්ල-භස්ම හා ජල සමතුලිතතාවට උදවු වේ • ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වයට
Cl	• අම්ල-භස්ම සමතුලිතතාවට • අසුරු සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීම • ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වයට
Na	• අම්ල-භස්ම හා ජල සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට • ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වයට
Mg	• එන්සයිම සහසාධක ලෙස ක්‍රියා කරයි.
Fe	• හිමොග්ලොබින් හා ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහකවල සංඝටක • එන්සයිම සහසාධක ලෙස ක්‍රියා කරයි.

F	දත්වල ව්‍යුහය පවත්වා ගැනීම.
I	කයිටොසයිඩ හෝර්මෝනයේ සංඝටකයකි.

ජලය

- මිනිස් දේහයේ ස්කන්ධයෙන් 60%ක ප්‍රමාණයක් ජලය ඇත.
- සාමාන්‍යයෙන් මුත්‍ර, මල සහ දහඩිය හරහා ජලය හානි වේ. එනිසා ශරීරය තුළ ජල සමතුලිතතාව පවත්වා ගත යුතු ය.
- ශරීරය තුළට මේ ජලය පානයෙන් හා ආහාර මගින් ලබා ගත හැකි ය.

මිනිස් ශරීරය තුළ ජලයේ කෘත්‍යය

- (1) සියලු ජීව සෛල සඳහා තෙත් අභ්‍යන්තර පරිසරයක් සපයයි.
- (2) රුධිරයේ හා පටක තරලයේ ප්‍රධාන සංඝටකය නිසා දේහය පුරා ද්‍රව්‍ය පරිවහනයට හා රුධිර පටක හා දේහ සෛල අතර, ද්‍රව්‍ය හුවමාරුවට උදවු කරයි.
- (3) ප්‍රධාන වශයෙන් වාෂ්පීභවන සිසිල් වීම මගින් දේහ උෂ්ණත්වය යාමනය කරයි.
- (4) අපද්‍රව්‍ය හා විෂද්‍රව්‍ය තහනු කිරීම සහ ඒවායේ බහිස්ක්‍රාවයට මාධ්‍යයක් සපයයි.
- (5) ආහාර තෙත් කිරීම මගින් ශිලීම් පහසු කරයි.

තත්තු

- ආහාරයේ ඇති ජීර්ණය කළ නොහැකි පොලිසැකරයිඩ මගින් ආහාරමය තත්තු (පිෂ්ටමය නොවන පොලිසැකරයිඩ) සෑදී ඇත.
- පලතුරු, එළවළුවල සහ ධාන්‍යවල මේවා සුලභ වේ.

ආහාරවල ඇති තත්තුවල කාර්යභාරය

- (1) ආහාරයේ ප්‍රමාණය වැඩි කරයි. ආහාර රුචිය සන්සිදුවයි. *හෙල්ප් ෆුල්*
- (2) මල ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සඳහා ජලය ආකර්ෂණය සහ ක්‍රමානුචිතය උත්තේජනය කිරීමෙන් මල පහ කිරීම සිදු කිරීම මගින් මල බද්ධය නැති කිරීම.
- (3) ආහාරයේ ප්‍රමාණවත්ව තත්තු අඩංගු වීම මගින්, මහාන්ත්‍රය හා ගුදමාර්ගයේ පිළිකා වැනි ආමාශ-ආන්ත්‍රික ආබාධවලට එරෙහිව ආරක්ෂාව සපයයි.

අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක

- සරල පූර්වග අණුවලින් ශරීරය තුළ නිපදවිය නොහැකි ආහාර මගින් ම ලබා ගත යුතු ද්‍රව්‍ය අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක ද්‍රව්‍යයි.
- එම අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක වන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල, අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ල, විටමින් හා බනිජ් ය.
- මේ අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක ද්‍රව්‍යවලින් දේහ සෛල තුළ ජෛව සංස්ලේෂණ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා ප්‍රධාන දායකත්වයක් ඇත.

- එම අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක ආහාරයේ නිවැරදි අනුපාතවලින් නොමැති විට දුෂ්පෝෂණයට මග පාදයි. එනිසා ඒවා නිවැරදි අනුපාතවලින් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල

සරල කාබනික පූර්වග අණුවලින් ශරීරය තුළ සංස්ලේෂණය කළ නොහැකි නිසා ආහාර මගින් ලබා ගත යුතු ම වන ඇමයිනෝ අම්ල අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල වේ.

අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ල

කාබනික පූර්වගවලින් ශරීරය තුළ සංස්ලේෂණය කළ නොහැකි නිසා ආහාර මගින් ලබා ගත යුතු වූ මේද අම්ල අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ලයි. බීජ, ධාන්‍ය හා එළවළු මගින් අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ල ප්‍රමාණවත් කරම් සපයයි.

මූලික පරිවෘත්තීය වේගය (BMR)

- > විවේකයෙන් සිටින විට,
- > පශ්චාත් අවශෝෂණ අවධියේ දී (අවම වශයෙන් පැය 12ක් නිරාහාර විට දී)
- > ආතතියක් නොමැති විට දී
- > අවම පරිවෘත්තීය වේගය මූලික පරිවෘත්තීය වේගය ලෙස අර්ථ දැක්වේ.
- > මූලික පරිවෘත්තීය වේගය (BMR) "පහසු" උෂ්ණත්ව පරාසයක් දී මනිනු ලැබේ.
- > වැඩුණු පුරුෂයෙකුගේ සාමාන්‍ය BMR අගය දිනකට 1,600 - 1,800 kCal
- > වැඩුණු ස්ත්‍රියකගේ එය දිනකට 1,300 - 1,500 kCal පමණ වේ.

ශක්ති අය-වැය

- කිසියම් සත්ත්වයෙකුගේ ශක්තිය වැය කිරීමට එරෙහිව, ශක්තිය ලබා ගැනීමේ ශේෂ පත්‍රය ශක්ති අයවැය වේ.
- ශක්ති අයවැය සඳහා මූලික ආකෘතිය පහත ආකාරයට ලබා දිය හැකි ය.

$$C = M + U + F + P$$

C = ලබා ගත් ආහාර ප්‍රභව තුළ ශක්ති අන්තර්ගත ය.

M = පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලි සඳහා ශක්තිය වැය වීම

U = මුත්‍ර පිටවීමේ දී හානිවන ශක්තිය

F = මල ද්‍රව්‍ය පිටවීමේ දී හානි වන ශක්තිය

P = නිශ්පාදනය (වර්ධනය හා ප්‍රජනනය සඳහා ප්‍රයෝජන ගත හැකි ශක්තිය

ක්ෂේත්‍රයෙන් හා විද්‍යාගාරය තුළින් ලැබෙන ශක්ති මේ මත එක් එක් සත්ත්වයාට අවශ්‍ය ශක්ති අයවැය ගණ කළ හැකි ය. වර්ධනය හා ප්‍රජනනය සඳහා ප්‍රයෝජන ගත හැකි ශක්තිය ඇස්තමේන්තු කිරීමේ දී ශක්ති අය හානි වේ.

නිරෝගී ජීවිතයක් සඳහා ආහාර

නිරෝගී ජීවිතයක් සඳහා ආහාරයේ කාබෝයනයිඩ්ට, ප්‍රෝටීන, ලිපිඩ, ජලය, තන්තු, අත්‍යවශ්‍ය ඛනිජ මූලද්‍රව්‍ය හා විවිධ නිවැරදි අනුපාතවලින් අන්තර්ගත යුතු වේ. පෝෂණ උපාය, යහපත් සෞඛ්‍යය මත සෘණ බලපෑමක් ඇති කරයි. ලබා ගත් ආහාරය, දෛනික ශක්ති අවශ්‍යතාවට වැඩි වේ නම් අක්‍රීය පුද්ගලයන් තුළ විශේෂයෙන් දියවැඩියාව, හෘදය රෝග වැනි රෝග තත්ත්ව ඇති විය හැකි ය. අන්තෘසි, රටකපු, තක්කාලි වැනි ආහාර සඳහා සමහර පුද්ගලයන් තුළ අසාත්මික ප්‍රතික්‍රියා ඇති විය හැකි ය. ඔවුන් එබඳු ආහාරවලින් වැළකිය යුතු ය. ආහාර මාර්ගයේ ආබාධ වැළැක්වීමට හා නිරෝගී ජීවිතයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ආහාරයේ අඩංගු විවිධ C සහ විවිධ E වැනි ප්‍රතිමක්ෂිකාරක වැදගත් වේ.

මිනිසාට අවශ්‍ය සියලුම ප්‍රතිමක්ෂිකාරක සංශ්ලේෂණය කළ නොහැකි බැවින් ඒවා සමහරක් ආහාරය තුළින් ලබා ගත යුතු ම ය.

දුෂ්පෝෂණය (Malnutrition)

- ආහාරය තුළ අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක එකක් හෝ කිහිපයක් අඩු වූ විට හෝ දේහයට අවශ්‍ය රසායනික ශක්තියට වඩා අඩු රසායනික ශක්ති ප්‍රමාණයක් දිගින් දිගටම ආහාරයෙන් ලැබීම හේතුවෙන් ප්‍රමාණවත් පෝෂණයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් දුෂ්පෝෂණය ඇති වේ.
- ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුව (WHO) දේහ ස්කන්ධ දර්ශකය 18.5 ට වඩා අඩු වේ නම්, එය දුෂ්පෝෂණයයි. පුද්ගලයෙකුගේ BMI පහත ආකාරයට ගණනය කළ හැකිය.
- දේහ ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) - ස්කන්ධය / උස² - (kg/m²)

ස්ප්‍රලතාව (Obesity)

- පුද්ගලයකු ලබා ගත් ශක්ති ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි කරන ශක්ති ප්‍රමාණය ඉතා අඩු වීම හේතුවෙන් ස්ප්‍රලතාව ඇති වේ.
- WHO දර්ශකවලට අනුව BMI 30.0ට වඩා වැඩි නම් එය ස්ප්‍රලතාව නම් වේ.
- මෙය ලෝකය පුරා වර්ධනය වෙමින් පවතින තත්ත්වයකි. මධුමේහය, හෘත් සනාල රෝග සහ ඇතැම් පිළිකා වැනි රෝග සඳහා ස්ප්‍රලතාව හේතුවක් විය හැකි ය.

ආහාර මාර්ගයේ සුලබ රෝගාබාධ

ගැස්ට්‍රයිටිස් -

- විවිධ හේතු ගණනාවක් නිසා ආමාශයේ ඇති වන ප්‍රදාහය නිසා ඇති වන තත්ත්වය ගැස්ට්‍රයිටිස් නම් වේ. ගැස්ට්‍රයිටිස්වල දී ආමාශ බිත්තියේ ඇති ග්‍රන්ථි උත්තේජනය වීමෙන් තක්කාලි ප්‍රමාණයක් ප්‍රාප්ත වේ.
- එමඟින් ශ්ලේෂ්මලකයට හානි සිදු වේ.
- ආමාශයේ ශ්ලේෂ්මලක ස්තරයට හානි වීම නිසා බිබිළි ඇති වේ.

- දිගු වේලාවක් තුළගින්නෙන් සිටීම හෝ මානසික ආතතිය අධික HCl ප්‍රමාණයක් ප්‍රාප්ත කිරීමට හේතු විය හැකි ය.
- ගැස්ට්‍රික් වැනි සමහර ඖෂධ වර්ග ද ගැස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය ඇති කරයි.
- Helicobacter pylori* වැනි අමල තත්ත්ව දරා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇති බැක්ටීරියා ආසාදන දිගු කාලීනව පවතින ගැස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්ව ආශ්‍රිතව සාමාන්‍යයෙන් පවතී.
- දිගු කාලීන ව තුළගින්නෙන් සිටීම ගැස්ට්‍රයිටිස් ඇති වීමට එක් හේතුවක් බැවින් මේ තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමට නිවැරදි ආහාර පුරුදු ඇති කර ගත යුතු වේ.

මල බද්ධය -

- මල ද්‍රව්‍ය සෙමෙන් ගමන් කිරීම හේතුවෙන් ජලය නැවත අවශෝෂණය දිරිමත් වීම නිසා ඒවා වඩාත් ඝන බවට පත් වීම හේතුවෙන් මල බද්ධය ඇති වේ.
- මල බැහැර කිරීම සඳහා ඇති ප්‍රතික ක්‍රියාව නිශේධනය වීම හේතුවෙන් ද මල බද්ධය ඇති වේ.
- මේ හේතුවෙන් ගුදයේ වේදනාව ඇති වීමත්, මල පහ කිරීමේ අපහසුතාවක් ද ඇති වේ.
- මල පහ කිරීම සඳහා වර්යාමය අනුගත වීමෙන් මල බද්ධය පාලනය කළ හැකි ය.
- ආහාරයෙන් ප්‍රමාණවත් තන්තු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම ද මල බද්ධය වැළැක්වීමට උදව් වේ.

සතුන්ගේ සංසරණ පද්ධතිය

සංසරණ පද්ධතියක අවශ්‍යතාව

- සත්ත්ව දේහ තුළ ද්‍රව්‍ය පරිවහනය මෙන් ම බාහිර පරිසරය සමඟ ද්‍රව්‍ය හුවමාරුව සඳහා ද සත්ත්වයන්ට සංසරණ පද්ධතියක අවශ්‍යතාව ඇති වේ.
- සරල සතුන්ගේ (උදා: නිඩාරියාවන්, පැතලි පණුවන්) පරිවහනයට හෝ ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම සඳහා විශේෂිත වූ පද්ධතියක් නොමැත.
- ඊට හේතුව වන්නේ ඔවුන්ගේ සෛල රාශියක් හෝ සියලු සෛල, ඔවුන් ජීවත් වන බාහිර පරිසරය සමඟ සෘජුව ම ගැටෙන නිසා ය.
- එම ජීවීන්ගේ දේහ පෘෂ්ඨය හරහා විසරණය මඟින් සිදු වන ද්‍රව්‍ය හුවමාරුව ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමාණවත් ය.
- එම සතුන්ගේ දේහය තුළ කෙටි දුරක් හරහා ද්‍රව්‍ය පරිවහනය විසරණය මඟින් සිදු වේ.
- ජීවියා ප්‍රමාණයෙන් හා සංකීර්ණතාවයෙන් වැඩි වත් ම, දේහය තුළට හා පිටතට ගමන් කරන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ද වැඩි වේ.
- දේහය තුළ ද්‍රව්‍ය පරිවහනය විය යුතු දුර ද වැඩි වේ.
- එමෙන් ම බොහෝ සෛල බාහිර පරිසරය හා සෘජුව ම නොගැටේ.
- එනිසා දේහය පුරා ද්‍රව්‍ය හුවමාරුව සඳහා විසරණය ප්‍රමාණවත් නොවේ.

- ඒ හේතුවෙන් එවැනි ජීවීන් තුළ ඔවුන්ගේ සෛල හා ඔවුන්ගේ ආසන්නතම වටපිටාව අතර, ද්‍රව්‍ය හුවමාරුව සඳහා පරිවහන පද්ධතියක් පරිණාමය විය.

දේහය තුළ පරිවහනය වන ද්‍රව්‍ය

- (1) ශ්වසන වායු (ඔක්සිජන්, කාබන්ඩයොක්සයිඩ්),
- (2) පෝෂක ද්‍රව්‍ය (ග්ලූකෝස්, ඇමයිනෝ අම්ල, මේද අම්ල, විටමින් ආදිය),
- (3) පරිවෘත්තීය අපද්‍රව්‍ය (යූරියා, ඇමෝනියා ආදිය),
- (4) හෝමෝන
- (5) ප්‍රතිදේහ

සත්ත්ව රාජධානිය තුළ දැකිය හැකි රුධිර සංසරණ පද්ධති

- සංසරණ පද්ධතියක් සතුව ඔලික සංරචක තුනක් සිටිති.
 - (1) එනම් පෝෂිත පොම්ප කිරීමේ අවයවය (හෘදය),
 - (2) අන්තර්සම්බන්ධිත වාහිනී (රුධිර නල),
 - (3) සංසරණ තරලය (රුධිරය / රුධිර වසා) (ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කර ගන්නා මාධ්‍යය ලෙස)
- ප්‍රධාන වශයෙන් හෘදය මගින් ඇති කරනු ලබන පීඩනය හේතුවෙන් සංසරණ තරලය වාහිනී ඔස්සේ ගලා යයි.
- දේහය පුරා තරලය පරිවහනය මගින් දේහ සෛලවල තරලමය පරිසරය, වායු හුවමාරුව සිදු වන, පෝෂක ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කරන සහ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන අවයව සමග කෘත්‍යාත්මකව සම්බන්ධ කරනු ලබන්නේ සංසරණ පද්ධතිය මගිනි.
- විවිධ මට්ටම්වල වූ සංකීර්ණ සැකැස්මෙන් යුතු සංසරණ පද්ධති සත්ත්ව රාජධානිය තුළ දැකිය හැකි ය.

සත්ත්ව රාජධානිය තුළ දැකිය හැකි ප්‍රධාන සංසරණ පද්ධති

- සතුන් තුළ දැකිය හැකි සංසරණ පද්ධති වර්ග දෙකකි.
 - (1) විවෘත සංසරණ පද්ධතිය
 - (2) සංවෘත සංසරණ පද්ධතිය.

(1) විවෘත සංසරණ පද්ධතිය (රුධිර හෝ හෙමොලිම්ෆ් නැමැත්තන්)


- පටක හා අවයව සෘජුව ම රුධිර වසා ලෙස හැඳින්වෙන තරලයෙන් නැහැවෙමින් පවතින සංසරණ පද්ධති මෙසේ හැඳින්වේ. (රුධිර වසා හරහා)
- එහි දී සංසරණ තරලය හා සෛල වටා ඇති අන්තරාල අන්තරාල අතර, වෙන් වීමක් නොපෙන්වයි.
- හෘදය මගින් දේහ පටක වටා පිහිටන අවකාශයට (අන්තර්සම්බන්ධිත කෝටරක) සංසරණ වාහිනී ඔස්සේ රුධිර වසා පොම්ප කරයි.
- දේහ සෛල හා රුධිර වසා අතර, රසායනික ද්‍රව්‍ය හුවමාරුව සෘජුව ම සිදු වේ.
- හෘදය ඉතිල්ව පවතින අතර තුර, හෘදයේ කපාට සහිත පුට හරහා රුධිර වසා ආපසු ගැලීම සිදු වේ. මේ ආකාරයට විවෘත සංසරණ පද්ධති ආත්‍යොපෝධා සහ මොලුස්කා (සමහර කෘණ්ඩ) වැනි වංශවල පරිණාමය විය.



රුධිරය ඉවත් වීමෙන්, ශිරා හා කේශනාලිකා වේ.

රුධිරය ගෙන යයි.


ශිරා, අනුශිරා තුළ හෘදය රදනු ලබන විවෘත වන



In an open circulatory system, such as that of a grasshopper, hemolymph surrounding body tissues also acts as the circulatory fluid.

(2) සංවෘත සංසරණ පද්ධතිය

- රුධිරය, වාහිනී තුළට සීමා වෙමින් අන්තරාල තරලයෙන් වෙන් වෙන් ව පිහිටන සංසරණ පද්ධති වේ. රුධිරය හෘදය/ හෘද මගින් විශාල වාහිනී තුළට පොම්ප කරයි.
- මේ විශාල රුධිර වාහිනී කුඩා වාහිනීවලට අතු බෙදී, ඒවා අවයව තුළට විනිවිද යයි.
- රසායනික හුවමාරුව රුධිරය සහ අන්තරාල තරලය අතර, ද අන්තරාල සහ දේහ සෛල අතර, ද සිදු වේ.
- සමහර විට මේ පද්ධතිවල හෘද එකක් හෝ වැඩි ගණනක් දැකිය හැකි ය.
- ඇනලිඩාවන් වැනි අපෘෂ්ඨවංශිකයන් (ඇනලිඩාවන් වැනි) හා පෘෂ්ඨවංශිකයන් තුළ මේ ආකාරයේ සංසරණ පද්ධති දැකිය හැකි ය.
- මේ පද්ධතිය විවෘත සංසරණ පද්ධතිය හා සැසඳීමේ දී, වඩාත් ක්‍රියාශීලී සතුන්ගේ හා විශාල සතුන්ගේ සෛලවලට ඔක්සිජන් හා පෝෂක ද්‍රව්‍ය පරිවහනය ඉතා කාර්යක්ෂමව සිදු කරයි.
- ඊට හේතු වන්නේ සාපේක්ෂව ඉහළ රුධිර පීඩනයයි.



In a closed circulatory system, such as that of an earthworm, interstitial fluid surrounding body tissues is distinct from blood acting as the circulatory fluid.

පෘෂ්ඨවංශික සංසරණ පද්ධතියේ සංවිධානය: කුර් 2 අවම කුර් 2 ඒක සංසරණ සහ ද්විත්ව සංසරණය

- සංවෘත සංසරණ පද්ධතියක්, පෘෂ්ඨවංශිකයන්ගේ දැකිය හැකි ය.
- එහි ප්‍රධාන රුධිර වාහිනී වර්ග තුනකි. එනම්:
 - මෙ සෑම නාල වර්ගයක ම, රුධිරය ඒකදිශාත්මකව පමණක් ගැලීම සිදු වේ.

- හෘදයේ සිට අවයව කරා රුධිරය ගෙන යන රුධිර වාහිනී ධමනි ලෙස හැඳින්වේ.
- මේ ධමනි අවයව තුළ දී කුඩා වාහිනීවලට බෙදී යයි.
- ඒවා ධමනිකා නම් වේ.
- එමඟින්, සම්පූර්ණ කුඩා ජීවීන් සහිත අන්වීක්ෂීය වාහිනී වන කේෂනාලිකාවලට රුධිරය මුදා හරින අතර, විසරණය ඔස්සේ රුධිරය හා දේහ සෛල වටා ඇති අන්තරාල තරලය අතර, ද්‍රව්‍ය හුවමාරු වන ස්ථාන ද මේවා වේ.
- කේෂනාලිකා එකට එකතු වී අනුශිරා සෑදේ.
- අනුශිරා එකතු වී රුධිරය නැවත හෘදය වෙත ගෙන යන ශිරා සෑදේ.

ඒක සංසරණය


- ඒක සංසරණය සිදු වීමේ දී මුළු දේහය පුරා ම සිදු වන පූර්ණ සංසරණයක දී, රුධිරය හෘදය තුළින් එක් වරක් පමණක් ගමන් ගනී.
- ඒක සංසරණය පෙන්වන සතුන්ගේ හෘදය කුටීර දෙකකින් සෑදී ඇත.
- එනම් කර්ණිකාව හා කෝෂිකාව වේ.
- ඒක සංසරණයක දී, දේහයේ සිට පැමිණෙන සාපේක්ෂව ඔක්සිජන් උෂ්ණ රුධිරය කර්ණිකාව වෙතට ද ඉන් පසු කෝෂිකාවට ද යැවේ.
- ඉන් පසු කෝෂිකාව සංකෝචනයෙන් රුධිරය ප්ලාස්මාලේම තුළ ඇති කේෂනාලිකා ජාලයට පොම්ප කරයි.
- එහි දී කේෂනාලිකා හා බාහිර පරිසරය අතර, වායු හුවමාරුව සිදු වේ.
- තව ද එහි දී O_2 රුධිරය තුළට විසරණය ද CO_2 විසරණය මඟින් රුධිරයෙන් ඉවත් වීම ද සිදු වේ.
- ඉන් පසු ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත වූ රුධිරය දේහය පුරා සංසරණය වෙමින්
- රුධිර කේෂනාලිකා ඔස්සේ දේහයේ සෛල වෙත ළඟා වේ.
- උදා: අස්ථි මසුන්, කාටිල්ජිය මසුන් - මඩුවා සහ මෝරා බදු

ද්විත්ව සංසරණය

- ද්විත්ව සංසරණයක දී, මුළු දේහය පුරා සිදු වන පූර්ණ සංසරණයක දී හෘදය තුළින් දෙවරක් රුධිරය ගමන් ගනී.
- එක් එක් වක්‍රය සම්පූර්ණ කළ පසු ඒවා ඔස්සේ හෘදය තුළින් ගලා යන වෙන් වෙන්ව පවතින සංස්ථානික හා පුප්පුසීය සංසරණ පරිච්ඡින්නයක් සංසරන පද්ධතියක් සමන්විත වේ.
- උදා: උභය ජීවීන්, උරගයින්, පක්ෂීන්, ක්ෂීරපායීන්.
- උභය ජීවීන් හා උරගයන් රැසකට කුටීර තුනකින් යුත් හෘදයක් දැකිය හැකි ය.
- කර්ණිකා දෙකක් සහ එක් කෝෂිකාවක් වේ.
- පක්ෂීන් සහ ක්ෂීරපායී සතුන්ට කුටීර හතරකින් යුත් හෘදයක් දැකිය හැකි අතර, එය වම් සහ දකුණු පැතිවලට සම්පූර්ණව බෙදී ඇත.

- මේ සැකැස්ම හේතුවෙන් ඔක්සිජන් උෂ්ණ හා ඔක්සිජන් පෝෂිත රුධිරය අතර, පූර්ණ වෙන් වීමක් සිදු වී ඇත.
- එනම්: මිශ්‍ර වීමක් සිදු නොවේ.
- ඔක්සිජන් උෂ්ණ රුධිරය, සංස්ථානික සංසරණය ඔස්සේ දකුණු හෘත් කර්ණිකාව වෙත ද ඉන් දකුණු කෝෂිකාවට ද යැවේ.
- ඉන් පසු දකුණු කෝෂිකාවේ සිට රුධිරය පෙණහැලි තුළට පොම්ප කරයි.
- පෙණහලුවල ඇති ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය වම් කර්ණිකාවට ළඟා වේ.
- ඉන් වම් කෝෂිකාවට යැවෙන ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය සංස්ථානික සංසරණයට එක් කරයි.
- සංස්ථානික සංසරණයේ දී හෘදය මඟින් ඇති කරනු ලබන අධික පීඩනය හේතුවෙන්, දේහයේ සියලුම දේහ සෛල හා පටක, විශේෂයෙන් පේශි, මොළය ආදී අවයවවලට රුධිරය සැපයීම ද්විත්ව සංසරණය මඟින් වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිදු කරයි.
- මෙය ඒක සංසරණය හා සංසන්දනය කිරීමේ දී , ඒක සංසරණයේ දී, වායු හුවමාරු අවයවවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ රුධිරය ගලා යයි.

ප්‍රජීවීන්ගේ හෘදය



ඡායාරූප 2

ඡායාරූප 2

මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ සහ වසා පද්ධතියේ මූලික සැලැස්ම

මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ මූලික සැලැස්ම

- මානව හෘදය කුටීර හතරකින් යුක්තයි.
- එනම් කර්ණිකා දෙකක් සහ කෝෂිකා දෙකකි.
- එහි එක වට ද්විත්ව පරිච්ඡින්න ක්‍රියාත්මක වේ.
- එනම් පුප්පුසීය සංසරණ පරිච්ඡින්නය මඟින් ඔක්සිජන් උෂ්ණ රුධිරය ශ්වසන පාෂාණය, එනම් පෙණහැලි වෙතට ගෙන ඒම සහ ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය නැවත හෘදය වෙතට ගෙන ඒම සිදු වන අතරතුර දී
- සංස්ථානික සංසරණ පරිච්ඡින්නය මඟින් ඔක්සිජන් පෝෂිත රුධිරය දේහයේ සියලු අවයව හා පටක වෙත සැපයීම හා ඔක්සිජන් උෂ්ණ රුධිරය අවයව හා පටකවල සිට ආපසු හෘදය වෙත ගෙන යාම ද සිදු වේ.
- මේ පරිදි දෙක ම, ප්‍රධාන ධමනි, ධමනි, ධමනිකා, කේෂනාලිකා ජාල, අනුශිරා, ශිරා/ ප්‍රධාන ශිරාවලින් සමන්විත වේ.
- කෝෂිකා සංකෝචනයේ දී දකුණු කෝෂිකාව මඟින්, ඔක්සිජන් උෂ්ණ රුධිරය, පුප්පුසීය ධමනි ඔස්සේ පෙණහැලි දෙක වෙත පොම්ප කරයි.

උරස් භූමි රේඛා දරන ශරීර සහ භූමි රේඛා දරන ශරීර - මාර්ගය

මහා භූමි රේඛා දරන ශරීර සහ මහා භූමි රේඛා දරන ශරීර

- ඉන්පසු පෙණහැලිවල දී විසරණය මගින් රුධිරය වෙත ඔක්සිජන් බැරවන අතර, කාබන්ඩයොක්සිඩ් බාහිර පරිසරයට ඉවත් වේ.
- මේ ක්‍රියාවලිය, වම් හා දකුණු පෙණහැලිවල කේශනාලිකා ජාලයේ සිදු වේ.
- ඉන්පසු ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය, පුළුල් සිරා යුගල් දෙක ඔස්සේ, වම් කර්ණිකාවට පරිවහනය වේ.
- කර්ණිකා සංකෝචනයේ දී, ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය වම් කෝෂිකාවට පරිවහනය වේ.
- කෝෂිකා සංකෝචනයේ දී ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය මහා ධමනිය වෙත පොම්ප කරයි.
- මහා ධමනිය මගින් එම ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය ධමනි ඔස්සේ දේහය පුරා ගෙන යයි.
- ප්‍රථමයෙන් මහා ධමනියෙන් හාත් පෙශීවලට රුධිරය සපයන කිරීටක ධමනි පැන නගී.
- ඉන් පසු මහා ධමනිය ධමනිවලට හා ධමනිකාවලට බෙදී හිසට හා අත්වලට රුධිරය සපයන කේශනාලිකා ජාලයන්, උදර අවයව හා පාදවලට රුධිරය සපයන කේශනාලිකා ජාල සාදයි.
- මෙසේ කේශනාලිකා ජාලවල දී වායු හුවමාරුව සිදු වන අතර, රුධිරයෙන් ඔක්සිජන් පටකවලට විසරණය වෙයි.
- පටකවල ඇති CO_2 රුධිර කේශනාලිකාවල රුධිරය වෙත විසරණය වේ.
- මේ රුධිර කේශනාලිකා නැවත එකතු වී අනුශිරා සාදන අතර, ඔක්සිජන් උපාන රුධිරය අනුශිරාවල සිට ශිරාවලට යොමු කරයි.
- අපර ගාත්‍රා හා දේහයේ කඳ ප්‍රදේශයේ සිට ඔක්සිජන් උපාන රුධිරය, අධර මහා ශිරාව තුළට පරිවහනය වන අතර, හිස, ගෙල සහ පූර්ව ගාත්‍රාවල සිට ඔක්සිජන් උපාන රුධිරය උත්තර මහා ශිරාව වෙත යොමු වේ.
- උත්තර හා අධර මහා ශිරා ඔස්සේ රුධිරය දකුණු කර්ණිකාවට පරිවහනය කෙරේ.
- ඉන් පසු එම රුධිරය දකුණු කෝෂිකාවට යැවේ.
- අවසානයේ ඉහත විස්තර කළ ආකාරයට මේ රුධිරය පුළුල් සිරා සංසරණ පරිසරය වෙත යවනු ලබයි.

මානව වසා පද්ධතියේ මූලික සැලැස්ම

- වසා පද්ධතිය, ව්‍යුහික ව හා කෘත්‍යාත්මක ව රුධිර වාහිනී පද්ධතිය සමඟ ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් දක්වයි.
- වසා පද්ධතිය, වසා රැගෙන යන වසා වාහිනිවලින් යුක්තය.




Figure 6.3 A lymph vessel cut open to show valves.

කුඩා විශාල
ඒකදු ජෛවීය
එකා රිද්මානුකූල ජීවීන්
සංකේත ඇත. මනව ශරීරයේ
කාන්තා ජෛවී තුළ
ගමන කරන බාහිර
කාන්තා ජෛවීන්

- වසා පද්ධතියට අයත් අනෙක් ව්‍යුහ වන්නේ
 - > වසා ගැටිති,
 - > වසා පටක (ලදා: tonsil) සහ
 - > වසා අවයව (ලදා: ප්ලිහාව සහ තයිමස්) වේ.




Figure 6.4 Section through a lymph node. Arrows indicate the direction of lymph flow.

- වසා වාහිනී විශාල හා ඉතා කුඩා වාහිනිවලින් සමන්විත ය.
- ඉතා කුඩා වසා වාහිනී, රුධිර සංසරණ පද්ධතියෙහි කේශනාලිකා ජාල සමඟ ඉතා සමීපව පිහිටයි.
- වසා ගැටිති තැනී ඇත්තේ සම්බන්ධක පටක හා සුදු රුධිර සෛලවලිනි.
- රුධිර කේශනාලිකාවලින් හානි වූ තරල සහ ප්‍රෝටීන, වසා පද්ධතිය මගින් නැවත රුධිරයට එක් කරයි.
- එසේ රුධිර කේශනාලිකාවලින් හානි වූ තරලය, වසා පද්ධතිය තුළ දී වසා ලෙස හඳුන්වයි. (වසා තරලය)
- වසාවල සංයුතිය, අන්තරාල තරලයේ සංයුතියට සමාන ය. (ඉටු තරලය)
- වසා වාහිනිවල කපාට දැකිය හැකි ය. එක් ඉන්ග්‍රාට්
- ඒවා මගින් වසා ආපසු ගැලීම වළක්වා ලයි. (වසා පද්ධතියේ)

විශාල වසා නාල දෙකක් ඔස්සේ, ගෙලෙහි පාදස්ථ ප්‍රදේශයේ ඇති ශිරා දෙකක් තුළට වසා තරලය වැස්සේ. වසා වාහිනී බිත්තිවල රිද්මානුකූල සංකෝචන හා කංකාල ජෛවී සංකෝචනය මගින්, වසා තරලය වලනය කරයි.

- වසා පද්ධතියට අයත් කෘත්‍ය ලෙස:
 - (1) පටක තරලය වැස්සීමෙන් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය තුළ රුධිර පරිමාව පවත්වා ගැනීම,
 - (2) ක්ෂුද්‍රාන්තයේ දී මේද හා මේද ද්‍රාව්‍ය විටමින් අවශෝෂණය
 - (3) ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර දැක්වීම (ඉන්ද්‍රියීය ආක්‍රමණ)
 - (4) T-කෝෂණයේ අර්ථ දැක්වීම. (ඉන්ද්‍රියීය)

වසා ගැටිති - වසා තරලය රැක්ම.
(සම්බන්ධක පටක (අනුභවය තුළ ප්‍රතිරෝධී)
හා ප්‍රතිරෝධී ජීවීන් මගින් වසා රුධිර
වලට යැවීම) වසා රුධිරය රුධිරයට යැවීම

වසා අවයව - වසා ගැටිති ස්කන්ධය.





Figure 5.12 Internal view of the heart.



- මානව හෘදය, දළ වශයෙන් කේතු හැඩ කුහරමය හා පේශිමය අවයවයකි.
- හෘත් බිත්තිය පටක ස්තර තුනකින් සමන්විත වේ.

• එනම්

> පෙරිකාඩියම

මෙය බාහිරින් ම පිහිටි ස්තරයයි.

එය මඩ දෙකකින් තැනී ඇත.

එනම්: පිටත තන්තුවම පෙරිකාඩියම හා ඇතුළු මස්තුවම පෙරිකාඩියම යනුවෙනි.

> මයෝකාඩියම

හෘත් බිත්තියේ මධ්‍ය ස්තරයයි.

එය හෘදයේ පමණක් දැකිය හැකි විශේෂණය වූ හෘත් පේශිවලින් තැනී ඇත.

හෘදයේ විද්‍යුත් සංඥා සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වැදගත් වන විශේෂිත වූ සන්නායක තන්තු සහිත ජාලයක් ද මයෝකාඩියම හරහා දිව යයි. මහා ශ්වසන රේඛාව.

> එන්ඩොකාඩියම

හෘත් බිත්තියේ අභ්‍යන්තර ස්ථරය මෙයයි.

එය හෘදයේ කුටීර හා කපාට ආස්තරණය කරයි.

එය පිනිදු පටලයක් වන අතර, පැතලි අපිච්ඡද සෛලවලින් යුක්තය.

එය රුධිර වාහිනිවල අන්තර්ගත ආස්තරණය සමඟ අඛණ්ඩව පවතී.

- හෘදයේ කුටීර 4කි.

- එනම්: උත්තරව කර්ණිකා දෙකක් සහ අධරව කෝෂිකා දෙකක් වේ.

හරල මාලිකමය ජුනිට්ස් දෙකක් හැදී ඇත
කුණිම ශ්වසන රේඛාව

- කෝෂිකාවලට මුළු දේහය වෙත ම රුධිරය පොම්ප කිරීමට සිදු වන අතර, කර්ණිකා මගින් කෝෂිකා වෙත රුධිරය පොම්ප කිරීම පමණක් සිදු කෙරේ. එහෙයින් කර්ණිකා බිත්තිවලට වඩා කෝෂිකා බිත්ති ඝනකමින් වැඩිය.
- දකුණු කෝෂිකා බිත්තියට වඩා වම් කෝෂිකා බිත්තිය ඝනකමින් වැඩිය.
- ඊට හේතුව වන්නේ දකුණු කෝෂිකාව රුධිරය පොම්ප කරනුයේ, හෘදයට ආසන්න ව ඇති පෙණහැලි වෙත පමණක් වන අතර, වම් කෝෂිකාවට මුළු දේහය පුරා රුධිරය පොම්ප කළ යුතු බැවිනි.
- එනිසා දකුණු කෝෂිකාවෙන්, පුප්පුළුසිය ධමනි වෙත ඇතුළු වන රුධිරයට වඩා බෙහෙවින් රුධිර වැඩි පීඩනයක් වම් කෝෂිකාවෙන් මහා ධමනිය වෙත ඇතුළුවන රුධිරයේ ඇත.
- ආචාරයක් මගින් වම් හා දකුණු ලෙස, හෘදය සම්පූර්ණයෙන් පැති දෙකකට බෙදී ඇත.
- එක් එක් පැත්තේ ඇති කර්ණිකාව හා කෝෂිකාව, කර්ණික-කෝෂික කපාටය (AV) මගින් බෙදී තිබේ.
- දකුණු කර්ණික කෝෂික කපාටය ත්‍රිකුණ්ඩ කපාටය ලෙස හැඳින්වෙන, තැලි තුනකින් යුත් කපාටයකින් ද,
- වම් කර්ණික කෝෂික කපාටය, ද්විකුණ්ඩ කපාටය ලෙස හැඳින්වෙන, තැලි 2කින් යුත් කපාටයකින් ද සෑදී ඇත.
- කේතු ආකාර පිටිකා පේශි කෝෂිකාවල අභ්‍යන්තර බිත්තියේ තෙරුම් ලෙස පිහිටයි.
- කර්ණික-කෝෂික කපාට, එම පිටිකා පේශි සමඟ හෘද රජ්ජු නමින් හැඳින්වෙන තන්තුවමය රැහැන් මගින්, සම්බන්ධ වී ඇත.
- ඒවා ඉතා ශක්තිමත් තන්තු වේ.
- එමගින් කපාට නොපිට පෙරළීම වළක්වාලයි.
- පිළිවෙලින් දකුණු හා වම් කෝෂිකාවලින් පැනනගින පුප්පුළුසිය ධමනියෙහි හා මහා ධමනියෙහි ආම්භක ස්ථානවල අඩ සඳ කපාට පිහිටයි.
- මේවා මගින් රුධිරය කෝෂිකා තුළට නැවත ගැලීම වළක්වාලයි.
- දකුණු කෝෂිකාවේ ඉහළ ප්‍රදේශයෙන්, ඔක්සිජන් උෂ්ණ රුධිරය සහිත පුප්පුළුසිය ධමනි හෘදයෙන් පිටතට පැමිණේ.
- මෙම පුප්පුළුසිය ධමනිය, දකුණු සහ වම් පුප්පුළුසිය ධමනි ලෙස බෙදී පෙනහලු වෙතට, ඔක්සිජන් උෂ්ණ රුධිරය ගෙන යයි.
- එමෙන් ම ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය රැගෙන පෙණහැලිවල සිට වම් කර්ණිකාව වෙත එක් එක් පෙනහැල්ලෙන් පුප්පුළුසිය ශිරා ද්‍රදකක් බැගින් නැවත පැමිණේ.
- වම් කෝෂිකාවේ ඉහළ ප්‍රදේශයෙන් ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය රැගෙන මහා ධමනිය පිට වේ.
- උත්තර හා අධර මහා ශිරා දකුණු කර්ණිකාවට විවෘත වන අතර, ඒවායේ අන්තර්ගතය දකුණු කර්ණිකාවට මුදා හරී.
- මහා ධමනියෙහි පිහිටි මහා ධමනි කපාටයට වහා ම පසුව වම් හා දකුණු ලෙස බෙදුණු කිරීමක ධමනි යුගලක් මගින් හෘදය වෙත ධමනි රුධිරය සපයනු ලැබේ.

හෘදයේ සන්නායක පද්ධතිය




Figure 5.18 The conducting system of the heart.

- හෘදය තමා විසින් ම විද්‍යුත් ආවේග ජනනය කර ගන්නා අතර, ස්නායුක හෝ හෝමෝනමය පාලනයකින් ස්වායත්තව ස්පන්දනය වේ.
- කෙසේ නමුත් නිසල හාත් ස්පන්දන වේගය පිළිවෙලින් වැඩි කිරීම සඳහා අනුවේගී හා
- අඩු කිරීම සඳහා ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු තන්තු සැපයුමක් පවතී.
- ඊට අමතරව, ඇඩ්‍රිනලින් හා තයිරොක්සින් වැනි රුධිරයේ සංසරණය වන හෝමෝන කිහිපයක් සඳහා ද හෘදය ප්‍රතිචාර දක්වයි.
- මයෝකාඩියමේ ඇති විශේෂිත ස්නායු පේෂි සෛල සහිත කුඩා කාණ්ඩ ආවේග ආරම්භ කිරීම හා සන්නායනයට දායක වේ.
- පහත දැක්වෙන විශේෂණය වූ පද්ධතියකින් හාත් සන්නායක පද්ධතිය සමන්විතයි.

චිකිත්සා ශාස්ත්‍රයේ මූලික මූලධර්මයන්
විද්‍යාත්මක මූලධර්මයන්
විද්‍යාත්මක මූලධර්මයන්

විද්‍යාත්මක මූලධර්මයන්

SA ගැටය (සයිනො හාත් කර්ණික ගැටය)

- * SA ගැටය යනු විශේෂණය වූ කුඩා සෛල ස්කන්ධයකි.
- * එය, දකුණු කර්ණිකාවේ මයෝකාඩියම තුළ උත්තර මහ ශිරාව දකුණු කර්ණිකාවට විවෘත වන ස්ථානයට ආසන්න ව පිහිටා ඇත.
- * හෘදයේ සංකෝචනය සඳහා උත්තේජ ජනනය වන්නේ SA ගැටය මගිනි.
- * හාත් ස්පන්දනය ආරම්භ කිරීම හා එහි රිද්මයානුකූල ස්පන්දනය සැකසීම ඇති කරන්නේ SA ගැටය වන බැවින් එය හාත් ගතිකරය ලෙස ද හඳුන්වනු ලබයි.
- * එහෙත් හාත් ස්පන්දන වේගය, ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය මගින් ඇති කරන උත්තේජන ඇඩ්‍රිනලින්, තයිරොක්සින් වැනි හෝමෝන සහ උෂ්ණත්වය ආදිය මගින් වෙනස් විය හැකි ය.

pacemaker

AV ගැටය (කර්ණික - කෝෂික ගැටය)


- * මෙය ද විශේෂණය වූ කුඩා සෛල ස්කන්ධයකි.

- * මෙය පිහිටන්නේ දකුණු සහ වම් කර්ණිකා අතර පිහිටන කර්ණික ආවාර බිත්තියේ ය.
- * AV ගැටය මගින් කර්ණිකාවල සිට කෝෂිකා වෙත විද්‍යුත් සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

කර්ණික-කෝෂික ගොනුව (His කදම්භය) ගොනුවෙන් බෙදුණු ශාඛා හා පර්කින්ස් තන්තු

- * AV ගොනුව, තන්තු ස්කන්ධයකි.
- * ඒවා, AV ගැටයෙන් පැන නගී.
- * කෝෂිකාන්තර ආවාරයේ ඉහළ අන්තයේ පිහිටි කෝෂිකා හා කර්ණිකා වෙන් කරන තන්තුවේ මුදු ව හරහා AV ගොනුව පැමිණ, වම් හා දකුණු ලෙස ශාඛනය වේ.
- * ඉන් පසු කෝෂිකා මයෝකාඩියම තුළ දී එම ශාඛා සියුම් තන්තුවලට වෙන් වේ.
- * ඒවා පර්කින්ස් තන්තු නම් වේ.
- * AV ගොනුවේ ශාඛා සහ පර්කින්ස් තන්තු මගින් AV ගැටයේ සිට මයෝකාඩියමේ අග්‍රය දක්වා විද්‍යුත් ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
- * එම විද්‍යුත් ආවේගවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කෝෂිකා සංකෝචනය ඇරඹේ.
- * එම සංකෝචනය ඉහළට හා පිටත ප්‍රදේශවලට විහිදී ගොස්, පුළුල්ව පැතිරී යාමට හා මහා ධමනිය තුළට එකවර රුධිරය පොම්ප කරයි.

හාත් චක්‍රය



- පූර්ණ හාත් ස්පන්දනයක දී සිදු වන සිද්ධීන් අනුපිළිවෙළ, හාත් චක්‍රය ලෙස හැඳින්වේ.
- මේ ක්‍රියාවලිය අතරතුරේ දී රුධිරය පොම්ප කිරීමේ හා හෘදය රුධිරයෙන් පිරීමේ එක් සම්පූර්ණ චක්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වේ.
- එක් පූර්ණ හාත් චක්‍රයක් සඳහා කක්පර 0.8ක කාලයක් ගත වේ.
- එය සිදු වන්නේ පහත ආකාරයට ය;


ක්‍රියාකාරී ආකූලය වලට වෙනස් වීම් ඇති වේ.

කර්ණික ආකූලය - කර්ණික සංකෝචනය වේ

- * කර්ණිකා තුළට රුධිරය පැමිණි විට SA ගැටය උත්තේජනය වේ.
- * ඉන් පසු SA ගැටය තුළ ජනනය වන විද්‍යුත් අවේග මගින් සංකෝචක තරංග අරඹනු ලබයි.
- * ඒවා කර්ණිකා දෙකෙහි ම මයෝකාර්ඩියම ඔස්සේ පැතිර යයි.
- * එහෙයින් කර්ණිකාවල ඉතිරි ව ඇති රුධිරය ද කෝෂිකා වෙත ගලා ඒමෙන් කර්ණිකා හිස් වේ.
- * මේ සඳහා තත්පර 0.1ක් ගත වේ.

කෝෂිකා ආකූලය - කෝෂිකා සංකෝචනය වේ..

- * කර්ණික පේෂි ඔස්සේ විද්‍යුත් ආවේග AV ගැටය වෙත පැමිණේ.
- * එනමුත්, AV ගැටයේ දී, එම ආවේග කර්ණිකාවලින් කෝෂිකාවලට සම්ප්‍රේෂණය (තත්පරයකින් ඉතා සුළු කොටසක් පමණ ප්‍රමාද වේ)
- * මෙමගින් කෝෂිකා සංකෝචනය වීම ආරම්භ වීමට පෙර, කර්ණිකාවල ඇති රුධිරය කෝෂිකාවලට සම්පූර්ණයෙන් මුදා හැරීමට ඉඩ ලබා දේ.
- * මෙම ප්‍රමාදයෙන් පසුව AV ගැටය තම විද්‍යුත් ආවේග ක්‍රියාරම්භකර, AV ගොනුව, ගොනුවේ බාධා හා පර්තික්ෂිප් තත්ත්ව හරහා කෝෂිකා පේෂි වෙත ඉක්මනින් පැතිරීමට සලස්වයි.
- * ඉන් පසු කෝෂිකා ඩික්කි හරහා හෘත් අග්‍රයේ සිට ඉහළට, සංකෝචක තරංග පැතිර යයි.
- * එහි ප්‍රතිඵලය ලෙස කෝෂිකා දෙක ම සංකෝචනය වේ.
- * දකුණු කෝෂිකාව තුළ පීඩනය, පුළුල්පීය ධමනි තුළ පවතින පීඩනයට වඩා වැඩි අතර,
- * වම් කෝෂිකාව තුළ පීඩනය, මහා ධමනිය තුළ පවතින පීඩනයට වඩා වැඩි වේ.
- * එනිසා පුළුල්පීය හා මහා ධමනි කපාට විවෘත වී, පිළිවෙළින් පුළුල්පීය ධමනිය හා මහා ධමනිය තුළට රුධිරය ගලා යයි.



- * කෝෂිකා සංකෝචනයේ දී ජනනය වන අධික පීඩනය මගින් කර්ණික-කෝෂික කපාට වැසී ගොස්, රුධිරය ආපසු කර්ණිකා තුළට ගැලීම වළකාලයි.
- * කෝෂිකා ආකූලය සඳහා තත්පර 0.3ක කාලයක් ගත වේ.
- * කෝෂිකා ඉහිල් වූ පසු, ඒවා තුළ පීඩනය පහළ බසී.

- * එවිට පුළුල්පීය හා මහා ධමනි කපාට වැසේ. පුළුල්පීය ධමනිය හා මහා ධමනිය තුළ පීඩනය කෝෂිකා තුළ පීඩනයට වඩා වැඩි ය.
- * හෘදයේ කුටීර තුළ ඇති පීඩනයට අනුකූලව, හෘදයේ හා ව්‍යාල වාහිනීවල කපාට විවෘත වීම හා වැසීම සිදු වේ.
- * කපාටවල විවෘත වීමේ හා වැසීමේ අනුපිළිවෙළ එක් දිශාවකට පමණක් රුධිරය ගලා යාම තහවුරු කරයි.

පූර්ණ හෘත් විස්තරය - කර්ණිකා හා කෝෂිකා ඉහිල් වේ.

- * මෙය තත්පර 0.4ක කාලයක් තුළ දී සිදු වේ.
- * කර්ණිකා හා කෝෂිකා ඉහිල් වී හෘදය වෙත රුධිරය නැවත පැමිණේ.
- * උත්තර හා අධර මහා ශිරා මගින් දකුණු කර්ණිකාව වෙත ඔක්සිජන් උෂ්ණ රුධිරය පරිවහනය වේ.
- * එවිට ම, ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය, පුළුල්පීය ශිරා හතර මගින් වම් කර්ණිකාව වෙත ගෙන එයි.
- * එවිට කර්ණිකා තුළ පීඩනය, කෝෂිකා තුළ පීඩනයට වඩා වැඩි ය.
- * එනිසා : කර්ණික-කෝෂික කපාට විවෘත වී රුධිරයෙන් කොටසක් අක්‍රීයව කෝෂිකා තුළට ගලා යයි.
- නිරෝගී වැඩිහිටියකු විවේකී ව සිටින විට, හෘද ස්පන්දනය වේගය සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තුවට ස්පන්දන 60-80ක් පමණ වේ.
- එක් හෘත් ස්පන්දනයක දී හෘදය සංකෝචනය වී (ආංකුලය) ඉන් පසු ඉහිල් (විස්තාරය) වේ.
- එක් සංකෝචනයක දී, කෝෂිකා මගින් පොම්ප කරනු ලබන රුධිර පරිමාව, ආසාදන පරිමාව ලෙස (stroke volume) ලෙස හැඳින්වේ.

විද්‍යුත් ඛන්දක රේඛනය (ECG)

- දේහ පටක හා තරල ඉතා හොඳින් විද්‍යුත් සන්නයනය සිදු කරන හෙයින්, පසුව මත හෝ ගාත්‍රා වල සම මතුපිට ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් තැබීමෙන් හෘදයේ විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනා ගත හැකි ය.
- එවැනි වාර්තාවක් ලබා ගැනීම විද්‍යුත් ඛන්දක රේඛනයකි. (ECG).
- SA ගැටය මගින් ජනනය කරන විද්‍යුත් සංඥා හෘදය පුරා ගමන් කිරීමේ දී සිදු වන එම විද්‍යුත් සංඥාවල පැතිරීම ECG සටහනෙන් දැක්වේ.

කොරෝනරි රුධිරාලයය මගින් වර්ධනය වන ප්‍රතිරෝධීය බවට පත් වීම
 හේතු වන අතර, එය CVD හි ප්‍රධාන හේතුවක් වේ.

නිරෝගී පුද්ගලයකුගේ සාමාන්‍ය ECG සටහනෙහි තරංග පහක් ඇති අතර, ඒවා P, Q, R, S හා T ලෙස නම් කර ඇත.




Figure 5.20 Electrocardiogram of one cardiac cycle. A, B and C correspond to the phases of the cardiac cycle shown in Figure 5.19.

P තරංගය

- මෙමගින්, SA ගැටය මගින් ඇති කරන ආවේගය එහි සිට කර්ණිකා මගින් පැතිර යාම නිරූපණය කරයි (කර්ණිකා විද්‍යාව).

QRS තරංග සංකීර්ණය

- AV ගැටයේ සිට කෝෂිකා මස්සේ ආවේගයේ වේගවත් පැතිරීම සහ කෝෂිකා පේෂිවල විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරීත්වය නිරූපණය කරයි (කෝෂිකා විද්‍යාව).

T තරංගය

- කෝෂිකා ප්‍රතිදිව්‍යනය සහ කෝෂිකා පේෂිවල ඉතිල් වීම ද නිරූපණය කරයි.
- QRS තරංග සංකීර්ණයේ විශාලත්වය හේතුවෙන්, කෝෂිකා සංකෝචනය අතර, තුරු දී ඇති වන කර්ණික ප්‍රතිදිව්‍යනය නොපෙන්වයි.
- පුද්ගලයකුගේ හෘත් ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තොරතුරු (මයෝකාඩියමේ තත්ත්වය සහ හෘත් සන්නායක පද්ධතිය).
- තරංගවල හැඩය, චක්‍ර අතර කාලාන්තර හා වක්‍රයේ කොටස් අතර, කාලාන්තර ආදිය නිරීක්ෂණයෙන් ලබා ගත හැකි ය.

රුධිර පීඩනය

- රුධිරය වාහිනී තුළ ගමන් කිරීමේ දී රුධිරය මගින් එම වාහිනී බිත්ති මත ඇති කරන බලය, රුධිර පීඩනය ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.
- සංස්ථානික සංසරණය ධමනිවල ඇති රුධිර පීඩනය මගින්, දේහයේ අවයව තුළට හා පිටතට සිදු වන අත්‍යවශ්‍ය රුධිර ගැලීම පවත්වා ගනී.
- රුධිර පීඩනය සාමාන්‍ය සීමාව තුළ තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.
- අධික රුධිර පීඩනය මගින් රුධිර වාහිනීවලට හානි කරයි.
- රුධිර කැටි ගැසීම හෝ හානි වූ ස්ථානයෙන් රුධිර වහනයන් ඉන් ප්‍රතිඵල විය හැකි ය.

- එමෙන් ම රුධිර පීඩනය ඉතා අඩු මට්ටමක් දක්වා පහළ ගිය විට දී, පටක කේශනාලිකා ජාල හරහා රුධිර ගලා යාම ප්‍රමාණවත් නොවන මට්ටමට අඩු වී යයි.
- එයින් ඉතා වැදගත් අවයව වන මොළය, හෘදය හා වක්‍රගවුල සාමාන්‍ය ක්‍ෂණයට හානිකර බලපෑමක් සිදු විය හැකි ය.
- පුද්ගලයකු තුළ පවතින රුධිර පීඩනය දවසේ කාලය, ඉරියව්, ස්ත්‍රී - පුරුෂ භාවය, වයස, ක්‍රියාකාරීත්වය, ව්‍යායාම හා ආතතිය (විත්තවේගී ආතති) ආදියට අනුව වෙනස් විය හැකිය.
- විවේකී ව සිටින විට හෝ නින්දේ දී රුධිර පීඩනය පහළ බසී.
- එහෙත්, නොසන්සුන් බව, හය හෝ කාංසාව ඇති අවස්ථාවල දී රුධිර පීඩනය ඉහළ යයි.

ආකූල හා විස්තාර පීඩනය

ආකූල පීඩනය

- විම කෝෂිකාඩ සංකෝචනය වී මහා ධමනිය වෙත රුධිරය තල්ලු කර හැරීමේ දී ධමනි පද්ධතිය තුළ නිපදවෙන පීඩනයයි.
- විවේකී විට සාමාන්‍ය නිරෝගී වැඩිහිටියකු ආකූල පීඩනය 120 mmHg පමණ වේ.

විස්තාර පීඩනය

- පුරුෂ හෘත් විස්තාරයක දී රුධිරය පිට වීම සමග ධමනි තුළ පවතින රුධිර පීඩනය මෙසේ හැඳින්වේ (හෘදය විවේකී අවස්ථාවේ).
- සාමාන්‍ය නිරෝගී වැඩිහිටියෙකුගේ විස්තාර පීඩනය 80 mmHg පමණ වේ.
- ධමනි රුධිර පීඩනය මනිනු ලබන්නේ ස්පින්මොමැනෝ මීටරය මගිනි.
- රුධිර පීඩනය සටහන් කිරීමේ දී (120/80) mmHg ලෙස ලිවිය යුතු ය.

$$\text{ආකූල ශීතල (mmHg)} = \frac{120}{80} \text{ mmHg}$$

අධ්‍යාතනීය හා මන්දාතනීය

අධ්‍යාතනීය

- සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා ඉහළ රුධිර පීඩනයක්
- කාලයක් තිස්සේ පැවතීම අධ්‍යාතනීයයි.
- අධ්‍යාතනීයේ බලපෑම ලෙස වක්‍රගවුලට හානි වීම, අධ්‍යාතනීය සංකූලතා, හෘදයාබාධ (වැඩි වන හෘත් වේගය හා හෘත් සංකෝචනය හේතුවෙන්), ඇසාන (මස්තිෂ්ක රුධිර වහනය හේතුවෙන්), මෙන්ම රුධිර වාහිනීවලට හානි වීම මගින් මරණයට ද හේතු වේ.

අධ්‍යාත්මික ඇති වීමට හේතු වන සාධක

- (1) ස්පර්ශකාල
- (2) මධ්‍යමය
- (3) පවුල් ඉතිහාසය
- (4) දුම්බීම
- (5) ක්‍රියාශීලීත්වයෙන් අඩු ජීවන පැවැත්ම
- (6) අධික ප්‍රමුඛ පරිභෝජනය
- (7) අධික මධ්‍යසාර පරිභෝජනය
- (8) ආතතිය
- (9) ධමනි බිත්ති මත අඩු සනත්ව ලිපෝප්‍රෝටීන (LDL) තැන්පත් වීම

මත්ස්‍යතාවය

- සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා පහළ රුධිර පීඩනයක් කාලයක් තිස්සේ පැවතීම, මත්ස්‍යතාවය ලෙස හැඳින්වේ.
- නොයෙකුත් ආකාරයේ සංකූලතා මේ සඳහා බලපායි.
- එනම් කම්පනය, වෙනම රක්තපාත උණ, ඉදිගෙන හෝ වැසිර සිට එකවර නැගිටීම, අධික රුධිර වහනය/ රක්තපාත තත්ත්ව, නිරාහාරය සිටීම, අඩු පෝෂණය ආදිය වේ.
- මේ මගින් මොළයට සැපයෙන රුධිර ප්‍රමාණය අඩු වී යයි.
- මේ හේතුවෙන්, කෙටි කාලීන සිහි නැතිවීම (ක්ලාන්තය) මෙන්ම දිගුකාලීන ව ක්ලාන්තය පැවතීමෙන් මරණය ද සිදු විය හැකිය.

කිරීටක සංසරණය




Figure 5.17 The coronary arteries.


- මහා ධමනි කපාටයට වහා ම විදුරව මහා ධමනියෙන් පැන නගින ශාඛා දෙක, වම් හා දකුණු කිරීටක ධමනි ලෙස හැඳින්වෙන අතර, ඒවා මගින් හෘදයට ධමනි රුධිරය සපයයි.
- කිරීටක ධමනි හාත් බිත්තියෙහි ගමන් කොට, අවසානයේ විශාල කේශනාලිකා ජාලයක් බවට පත් වේ.
- ශිරා රුධිරයෙන් විශාල කොටසක් හාත් ශිරා ගණනාවක් එක් වී නැගෙන කිරීටක කෝටරක මගින් දකුණු කර්ණිකාවට ද ඉතිරි රුධිරය කුඩා ශිරා නාලිකා ඔස්සේ කෙළින් ම හාත් කුටීරවලට ද යොමු වේ.

ධමනි බිත්ති මත අඩු සනත්ව ලිපෝප්‍රෝටීන (LDL) තැන්පත් වීම

අක්ෂරයන් වලට පාත්‍ර වීම

අක්ෂරයන් වලට පාත්‍ර වීම

- ධමනිවල ඇතුළු ආස්තරණ සහ වීම හෝ රළු වීමෙන් ධමනි බිත්ති සහ වීම (Atherosclerosis) තත්ත්වය ඇති විය හැකිය. (අක්ෂරයන් වලට පාත්‍ර වීම) $LDL \rightarrow BP$
- මීට හේතුව වන්නේ විශේෂයෙන් කොලෙස්ටරෝල් අංශු වැනි මේද තැන්පත් වීමයි.
- මෙමගින් අවයව හා පටක වෙත සාමාන්‍ය රුධිර සැපයුමට බලපෑම් ඇති කරයි.
- මේ හේතුවෙන්, කිරීටක ධමනි ශාඛා එකක් හෝ වැඩි ගණනක් අවහිරතා ඇති කරයි. (මගේ අක්ෂරයන් වලට පාත්‍ර වීම)
- එම ස්ථානයේ ඇති වන රුධිර කැටි නිසා තවත් සංකූලතා ඇති විය හැකිය.
- කිරීටක ධමනියේ අවහිරතාව ඇති වූ ස්ථානය/ ස්ථාන හා අවහිරතාවේ ප්‍රමාණය මත හාත් පේශියේ අදාළ කොටස්වලට ඔක්සිජන් හා පෝෂක සැපයීමේ අඩු වීමක් සිදු වේ.
- ධමනි පටු වීම පපුවේ වේදනාව (Angina) ඇති කරයි. (අක්ෂරයන් වලට පාත්‍ර වීම)
- කිරීටක ධමනියක් හෝ කිහිපයක් සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වීම මගින් හෘදයාබාධ (myocardial infarction) හට ගනී. (MI)
- එසේ වන්නේ හාත් පේශිවලට සැපයෙන ඔක්සිජන් හා පෝෂක අවම හෙයින් හාත් පේශි පටක හානිවීම හෝ මිය යාමෙනි.
- එමගින් හාත් ස්පන්දන විද්‍රව්‍ය ද අසාමාන්‍ය වේ.
- හෘදයට එලදායි පොම්පයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව ද නැවතී යයි.
- එමෙන්ම මොළය වැනි අනෙකුත් වැදගත් අවයවවලට ද ඔක්සිජන්වලින් පෝෂිත රුධිරය ප්‍රමාණවත් සැපයුම වැළැක්වී යයි.
- නියමිත වේලාවට ප්‍රතිකාර නොකළ හොත් හෘදයාබාධ මාරාන්තික විය හැකිය.



ආසාදනය

- ධමනිවල බිත්ති සුනු වීම හේතුවෙන් ඇති වන ඇතරෝස්ක්ලෙරොසිස් තත්ත්වය මෙන් ම, මොළයට රුධිරය සපයන ධමනි පුපුරා යාම, ස්නායු පටක මිය යාමට හේතු වේ.
- එසේ වන්නේ ඔක්සිජන් හා පෝෂණය අඩු වන හෙයිනි.
- මේ තත්ත්වය ආසාදනය ලෙස හැඳින්විය හැකිය.

$Hb + CO_2 \rightleftharpoons HbO_8 + 4CO_2$ $Hb + 4CO_2 \rightleftharpoons HbO_8 + 4CO_2$ $HbO_8 + 4CO_2$

ශ්වසන වර්ණක

- ශ්වසන වර්ණක කාබනික සංයෝග වන අතර, ඒවාට ඔක්සිජන් ආංශික පීඩනය වැඩි වීම ඔක්සිජන් සමග එක් වීමත්
- ඔක්සිජන් ආංශික පීඩනය අඩු වීම ඔක්සිජන් නිදහස් කිරීමත් සිදු කළ හැකි ය.
- රුධිරය ඇතුළු ජලීය මාධ්‍යවල දී, ඔක්සිජන් ද්‍රාව්‍යතාව අඩු හෙයින් සංකීර්ණ සතුන්ගේ ශ්වසන පාෂාණයේ සිට පටක අවයව වෙත ඔක්සිජන් පරිවහනය ගැටලුවක් විය.
- එම ගැටලුව ජය ගැනීම සඳහා සතුන්ට ශ්වසන වර්ණක පරිණාමය වී ඇත.


සත්ත්ව රාජධානිය තුළ දැකිය හැකි විවිධාකාර ශ්වසන වර්ණක

- (1) හිමොග්ලොබින්
මිනිස් රුධිරයේ, අනෙකුත් පෘෂ්ඨවංශිකයන් හා අනෙලිඩාවන් දැකිය හැකිය.
- (2) හිමොසයනීන්
ආත්‍රොපෝඩා රුධිර වසාවල සහ මොලුස්කාවන්ගේ දැකිය හැකිය.
- (3) ක්ලෝරොක්රොමොරීන්
බොහොමයක් ඇනෙලිඩාවන්ගේ රුධිරයේ ඇත.
- (4) හිමොඑරික්‍රීන්
සාගර අපෘෂ්ඨවංශිකයන්ගේ දැකිය හැකිය.
(සමහර ඇනෙලිඩාවන්)
- (5) මයොග්ලොබින්
පෘෂ්ඨවංශික ජෛවල දැකිය හැකිය.

- මයොග්ලොබින් හැර අනෙක් සියලු ශ්වසන වර්ණක ශ්වසන පාෂාණවල සිට පටක හා අවයව කරා ඔක්සිජන් පරිවහනය ද, පටක හා අවයවවල සිට ශ්වසන පාෂාණ කරා CO_2 පරිවහනය කොට බැහැර කිරීම ද සිදු කරයි.
- මයොග්ලොබින් ජෛව පටකවල දැකිය හැකි අතර, ඔක්සිජන් ගබඩා කර තබා ගනී.

මානව රුධිරයේ ශ්වසන වායු පරිවහනය
ඔක්සිජන් පරිවහනය

- දේහය පුරා O_2 පරිවහනය සඳහා ඉවහල් වන්නේ රක්තාණු තුළ ඇති හිමොග්ලොබින් අණු ය. (Hb)
- හිමොග්ලොබින් තැනී ඇත්තේ උපර්කක හතරකිනි.
- සෑම උපර්කකයක් ම තැනී ඇත්තේ ග්ලොබින් ප්‍රෝටීනයෙන් සහ හිමි කාණ්ඩයකිනි.
- රුධිරයේ ඇති ආවේණික රතු පැහැය සඳහා හේතු වන්නේ හිමි කාණ්ඩ වේ. එක් ලෝරස් (අයන්) පරමාණුවක් සෑම හිමි කාණ්ඩයක ම ඇති අතර, ඒවා එක් O_2 අණුවක් සමග ප්‍රත්‍යාවර්තව බැඳේ.
- එනිසා එක් හිමොග්ලොබින් අණුවක් මගින් O_2 අණු 4ක් රැගෙන යා හැකි ය.



කාබනික Hb } ඉතිරි කර
 HbO_8 } අංශික කර

CO_2 පරිවහනය

රුධිරය තුළ CO_2 පරිවහනය විවිධ ආකාරයට සිදු කරයි.


- (1) ජලාස්මාව මගින්, HCO_3^- ලෙස ((70% පමණ):
 CO_2 රක්තාණු තුළට විසරණය වූ විට කාබොනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් එන්සයිමය මගින් CO_2 , ජලය සමග සම්බන්ධ වී බයිකාබනේට් HCO_3^- හා H^+ අයන සෑදීම උත්ප්‍රේරණය කරයි. බයිකාබනේට් අයන රක්තාණුවලින් පිටතට පැමිණ ජලාස්මාව වෙතට චලනය වේ.
- (2) කාබැමයිනෝහිමොග්ලොබින් ලෙස (23% පමණ):
හිමොග්ලොබින්වල ප්‍රෝටීන කාණ්ඩය හා CO_2 එක් වී කාබැමයිනෝහිමොග්ලොබින් සෑදේ. එනිසා හිමොග්ලොබින්වල ඇති O_2 බැඳෙන ස්ථානය සඳහා CO_2 තරග නොකරයි.
- (3) ජලාස්මාවේ දිය වී ඇති (7%ක් පමණ) නිදහස් වායු ලෙස. (CO_2 ලෙස ම)

මානව රුධිරයේ සංයුතිය හා ප්‍රධාන කෘත්‍ය

- රුධිරය යනු සෛල සහ ජලාස්මාවෙන් තැනුණු සම්බන්ධක පටකයකි.
- රුධිරයේ සෛලීය සංරචක වර්ග තුනකි; එනම්;
- රක්තාණු, ශ්වේතාණු/ සුදු රුධිරාණු සහ පට්ටිකා වේ.
- පර්ශු, කශේරුකා, උරෝස්ථිය, ශ්‍රෝණිය ආදී අස්ථිවල ඇට මිදුළුවලින් රක්තාණු, ශ්වේතාණු හා පට්ටිකා විකසනය වේ.
- රක්තාණු ජනනය උත්තේජනය වන්නේ එරිත්‍රොපොයිටින් හෝමෝනය (වෘක්කවලින් නිපදවේ) මගිනි.

රතු රුධිරාණු (රක්තාණු)

- මේවා කුඩා, ද්වි අවකල, මධ්‍යාකාර සෛල වේ.
- පරිණත රක්තාණුවල න්‍යෂ්ටි නැත.
- මේ ලක්ෂණය සෛල තුළ වැඩි හිමොග්ලොබින් අණු සංඛ්‍යාවක් ගෙන යාම සඳහා උදවු වේ.
- ඒවායේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ද දැකිය නොහැකි ය.
- ඒ නිසා නිර්වායු ශ්වසනය මගින් (ATP) නිපදවයි.
- මේවා ස්වායු ශ්වසනය මගින් ATP නිපද වුවහොත් O_2
- පරිවහනය කාර්යක්ෂමතාව අඩු වී යයි.
- රක්තාණුවල ජීවිත කාලය දින 120 ක් පමණ වේ.
(මාස 4ක් ලෙස සැළකුවහොත් ලකුණු නැත)
- සාමාන්‍යයෙන් රුධිරය මයික්‍රො ලීටරයක රක්තාණු මිලියන 4-6ක් පමණ අඩංගු වේ.




- සෞඛ්‍ය තත්ත්ව හා ස්ත්‍රී/ පුරුෂ භාවය අනුව මේ සංඛ්‍යා වෙනස් විය හැකි ය.
- රක්තාණුල ප්‍රධාන කෘත්‍යය වන්නේ, O_2 අණු පරිවහනයයි.
- මේවා CO_2 අණු ද පරිවහනය කරයි.

සුදු රුධිරාණු (ශ්‍වේතාණු)

- ශ්වේතාණු වර්ග 5කි. එනම්,

- (1) නියුට්‍රොෆිල
- (2) ඉයොසිනොෆිල
- (3) බේසොෆිල
- (4) වසා සෛල
- (5) මොනොසයිට



- ශ්වේතාණුල ප්‍රධාන කෘත්‍යය වන්නේ,

- (1) දේහ ආරක්ෂණය කර ගැනීම
- (2) හක්ෂෙපෙලික පරිග්‍රහණය
- (3) ක්ෂුද්‍රජීවීන් ජීර්ණයයි.
- (4) වසා සෛල, T සෛල හා B සෛල බවට විකසනය වේ. මේ සෛල ආගන්තුක ද්‍රව්‍යවලට එරෙහිව ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර වැඩි කර දෙයි.

පට්ටිකා

- මේවා ඇටමිදුළු සෛලවලින් බිහි වේ.
- මේවාට ද න්‍යෂ්ටි නැත.
- මේවා රුධිරය කැටි ගැසීමෙහි ලා ප්‍රධාන කාර්භාරයක් සිදු කරයි.

රුධිර ප්ලාස්මාව

- රුධිර ප්ලාස්මාවෙහි අඩංගු දෑ ලෙස ජලය ද්‍රාව්‍ය ආකාරයෙන් පවතින අකාබනික අයන, ඇල්බියුමින්, වැනි ප්ලාස්ම ප්‍රෝටීන ප්‍රතිදේහ සහ ගයිබ්‍රිනෝජන්, පෝෂක, පරිවෘත්තීය අපද්‍රව්‍ය, ශ්වසන වායු සහ හෝමෝන දැක්විය හැකි ය.
- මානව රුධිරයේ pH අගය 7.4 පමණ වේ.
- ප්ලාස්මාවේ ප්‍රෝටීන සාන්ද්‍රණය අන්තරාල තරලයට වඩා වැඩි ය.
- ප්ලාස්මාවේ දිය වී ඇති අයන ස්ථායීත්වය මෙන් ම රුධිරයේ ආක්‍රාති කුළුනාව පවත්වාගෙන යයි.
- ප්ලාස්මාවේ ඇති ඇල්බියුමින් ද රුධිරය ස්ථායීත්වය කරන අතර,
- ප්‍රතිදේහ මගින් සිරුරට ආරක්ෂාව සපයයි.
- ප්ලාස්මාවේ ඇති ගයිබ්‍රිනෝජන් රුධිර කැටි ගැසීම දායක වේ.
- ප්ලාස්මාවෙන් කැටිකාරක සාධක ඉවත් කළ විට, එය මස්තු ලෙස හැඳින්වේ.

රුධිරයේ ප්‍රධාන කෘත්‍ය

- (1) අවයව කරා O_2 පරිවහනය හා පටක/ අවයව වලින් CO_2 ඉවත් කිරීම
- (2) බහිස්ප්‍රාචීය අවයව වෙත ද්‍රාව්‍ය බහිස්ප්‍රාචී ද්‍රව්‍ය පරිවහනය
- (3) පෝෂක පරිවහනය
- (4) නිපදවන ස්ථාන වන ග්‍රන්ථිවල සිට ඉලක්ක අවයව කරා හෝමෝන පරිවහනය
- (5) දේහයේ ආගන්තුක ආක්‍රමණවලට එරෙහි ආරක්ෂණ ක්‍රියාව
- (6) ආක්‍රාති විධානයට උදවු වීම

රුධිරය කැටි ගැසීම

- පටකයක් හානි වූ විට එයින් රුධිරය ගලා, කැටි ගැසී රුධිර කැටියක් සෑදේ.
- මෙමගින් තවදුරටත් රුධිරය හානි වීම මෙන් ම ව්‍යාධිජනක ක්ෂුද්‍රජීවීන් ප්‍රවේශය ද වළකී.
- සාමාන්‍යයෙන් හානියට පත් නොවූ වාහිනී කුළු රුධිරය කැටි නොගැසේ.
- රුධිර කැටි ගැසීමේ දී අතිශය සංකීර්ණ ප්‍රතික්‍රියා ශ්‍රේණියක් සිදු වේ.
- රුධිර වාහිනියක් හානි වූ විට එහි බිත්තියේ ඇති සම්බන්ධක පටක නිරාවරණය වේ.
- සම්බන්ධක පටකවල ඇති කොලාජන් තන්තුවලට රුධිරයේ ඇති පට්ටිකා පැමිණ තදින් ඇලී යයි.
- එසේම පට්ටිකාවලින් නිදහස් වන ද්‍රව්‍ය නිසා, පට්ටිකාවලට ඇලෙන බවක් ගෙන දී එකිනෙක ලං කරයි.
- මෙසේ සෑදෙන පට්ටිකා පිණ්ඩය මගින් රුධිර වහනයට විරුද්ධ ව ක්ෂණික ආරක්ෂාවක් සපයයි.
- ඉන්පසු පට්ටිකා කැටි කාරක සාධක මුදා හරියි.
- ඒවා ක්‍රොම්බින් සෑදීම ක්‍රියාත්මක කරයි.
- ඉන්පසු ක්‍රොම්බින් මගින් ගයිබ්‍රිනෝජන්, ගයිබ්‍රින් බවට පත් කරයි.
- ඉන්පසු මේ ගයිබ්‍රින් කෙඳි සමූහනය වී රුධිර කැටියේ ජාලය සෑදේ.
- සක්‍රීය වූ ක්‍රොම්බින් මගින් තව තවත් ක්‍රොම්බින් සෑදීමෙන් රුධිර-කැටිය සෑදීම සම්පූර්ණ කරයි.
- හානි නොවූ රුධිර නාලවල රුධිර කැටි ගැසීමක් සිදු නොවේ.
- එසේ වන්නේ එම නාලවල ආස්තරණය ඉතා සිහින් වීම සහ, සෛල පුපුරා යෑමක් හෝ පට්ටිකා සමූහනය සඳහා අවස්ථාවක් සලසා නොදීම නිසා ය.
- හෙපාරින් වැනි සමහර ද්‍රව්‍ය රුධිර කැටි ගැසීම වළක්වාලයි.
- ප්‍රොක්‍රොම්බින්, ක්‍රොම්බින් බවට පරිවර්තනය වීම හෙපාරින් මගින් වළක්වන අතර,
- ගයිබ්‍රිනෝජන්, ගයිබ්‍රින් බවට පරිවර්තනය ද වළක්වයි.

- හෙයින් ප්‍රතිකැටිකාරකයක් ලෙස සායනික කටයුතුවල දී බහුලව භාවිතා වේ.

රුධිරය කාණ්ඩ කිරීම

නිලිකා භාණ්ඩ
ඉන්ද්‍රිය ජිවිත
වේ.

ප්‍රති-ආ - ඉන්ද්‍රිය
ඉන්-ප්‍රති - ඉන්ද්‍රිය

Blood group	Antigen + antibody(s) present
A ⁺ A ⁻	Antigen A Makes anti-B
B ⁺ B ⁻	Antigen B Makes anti-A
AB ⁺ AB ⁻	Antigens A and B Makes neither anti-A nor anti-B
O ⁺ O ⁻	Neither A nor B antigen Makes both anti-A and anti-B

(ඉන්ද්‍රිය)

- ඇග්ලුටිනෝජන් (ප්‍රතිදේහ ජනක A හා B) නම් ප්‍රතිදේහජනක රක්තාණුවල මතුපිට පිහිටයි.
- මීට අමතරව පුද්ගලයන්ගේ ප්ලාස්මාවේ ප්‍රතිදේහ පවතී (ප්‍රති - A සහ ප්‍රති - B) (ඇග්ලුටිනින)
- ABO රුධිර වර්ග කිරීමේ දී ප්‍රධාන රුධිර කාණ්ඩ 4ක් දැක්විය හැකිය.
- එනම්, A, B, AB හා O වේ.
- පුද්ගලයකුගේ රක්තාණු තුළ ඇති විශේෂිත ප්‍රතිදේහ ජනකයට අදාළ වූ ප්‍රතිදේහය ප්ලාස්මාවේ නොපිහිටයි.
- උදා: යම් කෙනෙකුගේ ප්‍රතිදේහ ජනක A රතු රුධිරාණු සෛල පටලය මත පිහිටයි නම්, ප්ලාස්මාවේ ප්‍රති - A ප්‍රතිදේහ දැකිය නොහැකි ය.
- (1) රක්තාණුවේ ප්‍රතිදේහ ජනකය A සහ ප්ලාස්මාවේ ප්‍රතිදේහය b (ප්‍රති - B) ඇති විට, එම පුද්ගලයාගේ රුධිර ගණය A වේ.
- (2) රක්තාණුවේ ප්‍රතිදේහ ජනකය B සහ ප්ලාස්මාවේ ප්‍රතිදේහය a (ප්‍රති - A) ඇති විට, එම පුද්ගලයාගේ රුධිර ගණය B වේ.
- (3) රක්තාණුවේ ප්‍රතිදේහ ජනක වර්ග දෙක ම එනම් A හා B ඇත්නම් සහ, ප්ලාස්මාවේ ප්‍රති A හෝ ප්‍රති B ප්‍රතිදේහ නැති විට, එම පුද්ගලයාගේ රුධිර ගණය AB වේ.
- (4) රක්තාණුවේ ප්‍රතිදේහ ජනක A හා B නැති විට සහ ප්ලාස්මාවේ ප්‍රතිදේහ දෙවර්ගය ම (ප්‍රති A හා ප්‍රති B) ඇති විට, එම පුද්ගලයාගේ රුධිර ගණය O වේ.
- පුද්ගලයකුට රුධිරය පාරවිලයනයේ දී, ඔවුන්ට ගැළපෙන රුධිරය පාරවිලයනය කිරීමට වග බලා ගත යුතු ය.

- එය නොගැළපෙන විට ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර වර්ගයක් ඇති වේ.
- එසේ වන්නේ දායකයාගේ රතු රුධිරාණු සෛල පටලයේ ග්ලයිකොප්‍රෝටීන් පිහිටන අතර, ඒවා ප්‍රතිදේහ ජනක ලෙස ක්‍රියා කර ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ ප්ලාස්මයේ ඇති ප්‍රතිදේහ (ඇග්ලුටිනින) සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන බැවිනි.
- එහි ප්‍රතිඵලය ලෙස දායකයාගේ සෛල ශල්‍යෙණයට ලක් වේ.
- ඒ නිසා පාරවිලයනය සිදු කරන විට දායකයාගේ සහ ප්‍රතිග්‍රාහකයාගේ රුධිර ගණ දැන ගැනීම වැදගත් වේ.
- AB රුධිර ගණය ඇති පුද්ගලයකු ප්‍රති A හෝ ප්‍රති B ප්‍රතිදේහ වර්ග දෙක ම නිපදවන්නේ නැත.
- එම පුද්ගලයන්ට A, B හා AB රුධිරය ආරක්ෂිතව පාරවිලයනය කළ හැක්කේ, ඔවුන් තුළ ඒවා සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට ප්‍රතිදේහ නොමැති බැවිනි
- මේ හෙයින් AB රුධිර ගණය ඇති පුද්ගලයෝ සර්ව ප්‍රතිග්‍රාහකයන් ලෙස හැඳින්වෙති.
- O රුධිර ගණය ඇති පුද්ගලයන්ගේ රක්තාණුවල ප්ලාස්මා පටලය මත ප්‍රතිදේහජනක A හා B යන දෙවර්ගයෙන් එකක් හෝ නොමැත.
- එහෙත් ඔවුන්ගේ ප්ලාස්මාවේ ප්‍රති A හා ප්‍රති B යන ප්‍රතිදේහ දෙවර්ගයම ඇත.
- එනිසා මේ රුධිර ගණය (O) සහිත පුද්ගලයන්ට ඕනෑම රුධිර ගණයක් සහිත පුද්ගලයන්ට රුධිරය ප්‍රදානය කළ හැකි ය.
- මේ හෙයින් O රුධිර ගණය සහිත පුද්ගලයෝ සර්වදායකයන් ලෙස හැඳින්වෙති.
- එනිසා රුධිර පාරවිලයනයකට ප්‍රථම දායක රුධිරය හා ප්‍රතිග්‍රාහක රුධිරය අතර, ප්‍රතික්‍රියා නැති බවට, සනාථ කළ යුතු අතර, රුධිර ගණ හරස් ගැළපීම (cross matching) සිදු කළ යුතුයි.

රීසස් පද්ධතිය

- සමහර පුද්ගලයන්ගේ රක්තාණුවල ප්ලාස්මා පටලය මත රීසස් සාධකය නම් ප්‍රතිදේහ ජනක දැකිය හැකි ය.
- මෙසේ රක්තාණු ප්ලාස්මා පටලය මත රීසස් සාධකය නිබන්ධ පුද්ගලයන් Rh⁺ ලෙස ද එසේ රීසස් සාධකය නොමැති පුද්ගලයන් Rh⁻ ලෙස ද හැඳින්වේ.
- Rh⁺ පුද්ගලයන්ගේ ප්ලාස්මාවේ ප්‍රති-රීසස් ප්‍රතිදේහ නොමැත.
- එහෙත් සමහර තත්ත්වවල දී Rh⁻ පුද්ගලයන්ගේ ප්ලාස්මාවේ ප්‍රති-රීසස් ප්‍රතිදේහ නිපදවීමට හැකියාව ඇත.
- කෙසේ නමුත් Rh⁺ රුධිරය, Rh⁻ රුධිරය සහිත පුද්ගලයෙකුට ඇතුල් වූ විට ප්‍රතිග්‍රාහකයා තම රුධිර ප්ලාස්මයේ Rh ප්‍රතිදේහ නිපදවමින් ඊට ප්‍රතිචාර දක්වයි.
- Rh⁻ මවක්, Rh⁺ දරුවකුගේ කලලයක් දරන විට, එම දරුවා ප්‍රසූතියේ දී දරුවාගේ Rh⁺ රක්තාණු ස්වල්පයක් මාතෘ රුධිර සංසරණයට ඇතුළු විය හැකි ය.

- එමගින්, මානව රුධිර ප්ලාස්මයේ Rh ප්‍රතිදේහ නිපදවේ.
- Rh⁺ කලලයක්, දෙවන ගැබ් ගැනීමේ දී මවට පිහිටියහොත් මවගේ රුධිර ප්ලාස්මයේ පළමු දරුවාගේ රක්තාණුවලට ප්‍රතිචාර ලෙස විකසනය වූ Rh ප්‍රතිදේහ, කලල බන්ධය හරහා මුත්‍රාශයට ගමන් කොට, මුත්‍රාශයෙන් ඉවත් කරයි.
- ඉන් පසු ඇති වන Rh⁺ දරු කලලවලද රක්තාණු විනාශ විය හැකි ය.

සතුන්ගේ වායු හුවමාරුව

සතුන්ගේ ශ්වසන ව්‍යුහවල අවශ්‍යතාව හා විවිධ සතුන්ගේ ශ්වසන ව්‍යුහයන්ගේ සංකීර්ණතාව පරිණාමය

- සතුන්ගේ ශ්වසන වායු හුවමාරුව, සිදු වන්නේ (එනම් දේහයට O₂ ලබා ගැනීම හා බාහිර පරිසරයට CO₂ මුදා හැරීම), සරල විසරණයෙනි.
- නිඩාරියාවන්, පැතලි පණුවන් වැනි සරල සතුන්ගේ හැම දේහ සෛලයක් ම බාහිර පරිසරය සමඟ ප්‍රමාණවත් තරම් සම්පය.
- මේ නිසා සියලු දේහ සෛල හා පරිසරය අතර, සෘජුව ම වායු හුවමාරුව සිදු කර ගත හැකි ය.
- ඔවුන්ගේ සරල දේහ ස්වරූපය හා ශක්ති අවශ්‍යතා අඩු වීම මගින්, සරල විසරණය මගින් දේහ පෘෂ්ඨය හරහා සිදු කරනා වායු හුවමාරුව ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් ය.
- එහෙත් විශාල දේහ දරන සතුන්ගේ දේහ සංකීර්ණතාව හා ශක්ති අවශ්‍යතා අධික ය.
- ඔවුන්ගේ දේහ සෛලවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් බාහිර පරිසරය සමඟ සෘජුව නොගැටෙයි.
- මේ නිසා ඔවුන්ගේ ශක්ති අවශ්‍යතා, සපුරා ගැනීමට දේහ පෘෂ්ඨය හරහා සිදු වන වායු හුවමාරුව ප්‍රමාණවත් නොවෙයි.
- මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වායු හුවමාරුව සිදු කර ගත හැකි විශේෂණය වූ ශ්වසන පෘෂ්ඨ පරිණාමය වී ඇත.
- සතුන්ගේ දේහ තරම හා සංකීර්ණත්වය වැඩි වත් ම පෘෂ්ඨ/පරිමා අනුපාතය එනම් (A/V) අඩු වෙයි.
- මේ නිසා කාර්යක්ෂම වායු හුවමාරුවක් සඳහා විශාල පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලයක් අවශ්‍ය වෙයි. මේ නිසා විශාල පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලයක් ලබා දීමට හැකි වන පරිදි නාඕම හා ශාඛනය වීම් සහිතව විවිධ ශ්වසන පෘෂ්ඨ පරිණාමය වී ඇත.
- උදාහරණ ලෙස පලක්ලෝම, ශ්වාසනාල, පෙණහැලි ආදිය සඳහන් කළ හැකි ය.
- පලජ සතුන්ගේ, කාර්යක්ෂමව පලයෙන් O₂ ලබා ගැනීම සඳහා දේහ පෘෂ්ඨයෙන් බාහිර තෙර්ම් ආකාරයට පලක්ලෝම පරිණාමය වී ඇත.
- එමෙන් ම භෞමික සතුන්ගේ, වායුගෝලයෙන් කාර්යක්ෂම ලෙස O₂ ලබා ගැනීම සඳහා දේහ පෘෂ්ඨය අවකලනය වීමෙන් ශ්වාසනාල හා පෙණහැලි වැනි ශ්වසන පෘෂ්ඨ පරිණාමය වී ඇත.

$\left(\frac{A}{V}\right) \uparrow$ කරල විකර්ෂණ ශක්‍යය

ශ්වසන පෘෂ්ඨවල ලාක්ෂණික ලක්ෂණ

ලාංඡන භාවිතයෙන් ඔබ ස්ථානය

- එලෙස ශ්වසන පෘෂ්ඨයක් සතුව පහත සඳහන් ලක්ෂණ කිහිපයක් යුතු ය.
- (1) කෙස්ව හා වායුවලට පාරගම්‍යව පැවැතිය යුතු ය. එවිට වායුවලට ද්‍රාව්‍යතාව වීමෙන් එය හරහා ගමන් කළ හැකි ය.
- (2) ඉතා කුඩා පෘෂ්ඨයක් විය යුතු ය. කාර්යක්ෂම ලෙස විසරණය සිදු වන්නේ කෙටි දුරක් පමණි.
- (3) විශාල පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලයක් කිහිපයක් යුතු ය. ජීවියාගේ අවශ්‍යතාවන්ට ප්‍රමාණවත් වායු පරිමාවක් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා. (A) ↑ කරල විකර්ෂණ ශක්‍යය
- (4) හොඳ රුධිර සැපයුමක් කිහිපයක් යුතු ය. (එමගින් නිවු විසරණ අනුක්‍රමණයක් පවත්වා ගත හැකි ය.)

සතුන්ගේ විවිධ ශ්වසන ව්‍යුහ

ශ්වසන ව්‍යුහය	සත්ත්ව කාණ්ඩය
දේහ පෘෂ්ඨය	නිඩාරියාවෝ, (පැතලි පණුවෝ) $\left(\frac{A}{V}\right) \uparrow$
බාහිර පලක්ලෝම	කර්මය ඇතැම්වැන්නෝ (වැරකැටි හතුරු)
අභ්‍යන්තර පලක්ලෝම (කර්මය)	ඉස්සෝ, මත්ස්‍යයෝ, කුනිස්සෝ
ශ්වාසනාල පද්ධතිය (කර්මය මගින් සෑදීම)	කෘමීහු
පෙණහැලි	කෘමීරපායීහු, (මිනිසා), උරගයෝ, පක්ෂීහු
සම	උභය ජීවීහු
පත් පෙණහැලි	ගෝනුස්සෝ, මකුළුවෝ

මානව ශ්වසන පද්ධතිය

මානව ශ්වසන පද්ධතියේ දළ ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය

- මානව ශ්වසන පද්ධතිය පහත සඳහන් ප්‍රධාන කොටස්වලින් සමන්විත ය.
- නාස් විවර, නාස් කුහරය, ග්‍රසනිකාව, ස්වරාලය, ශ්වාසනාලය හා එයින් ඇරඹෙන ශාඛනය වූ ප්‍රනාල, ශ්වාසනාලයෙන් පැන නගින ශ්වාසනාලිකා දෙක එක් එක් පෙණහැල්ල තුළට ඇතුළු වී කුඩා අනුශ්වාසනාලිකා බවට පත් වී, අවසානයේ ගර්ත නැමැති වන කෝෂවලින් කෙළවර වෙයි.
- අනුශ්වාසනාලිකා හා ගර්ත පෙණහැලි තුළ පිහිටා ඇත.
- පෙණහැලි උරස් කුහරය තුළ පිහිටන කේතු හැඩැති ව්‍යුහ යුගලකි.
- පෙණහැලි දෙක හැඩයෙන් හා තරමින් සුළු වශයෙන් වෙනස් ය.
- වම් පෙණහැල්ල, දකුණු පෙණහැල්ලට වඩා මදක් කුඩා ය. (කොදෙවල් වලදී ම නිසා)

$\left(\frac{A}{V}\right) \downarrow$ කරල විකර්ෂණ ශක්‍යය අවමය

- ඊට හේතුව හෘදය අග්‍රය, මධ්‍ය තලයෙන් මදක් වමට බර ව පිහිටීමයි.
- එමෙන් ම වම් පෙණහැල්ල බන්ධන දෙකකින් ද, දකුණු පෙණහැල්ල බන්ධන තුනකින් සමන්විත ය.
- එක් එක් පෙණහැල්ලක් පටල දෙකකින් වට වී පවතියි.
- අන්තර්ගත ප්ලූරාලි ලෙස හඳුන්වන ඇතුළු පටලය පෙණහැල්ලට පිටත පෘෂ්ඨයට ඇලී ඇත.
- එමෙන් ම පාර්ශ්වික ප්ලූරාලි නැමති පිටත පටලය උරස් කුහරයේ බිත්තිවලට ඇලී ඇත.
- මේ පටල දෙක අතර, ඉතා කුඩා, තරලය පිරී ඇති කාශයක් පවතියි.




Figure 10.15 The relationship of the pleura to the lungs.

- ශ්වසනය සිදු වන විට නාස් විවර තුළින් ශ්වසන පද්ධතියට වාතය ඇතුළු වෙයි.
- නාස් කුටීරය තුළ ඇති අවකාශය තුළින් වාතය ගමන් කරන විට, රෝම මගින් වාතය පෙරීමට ලක් වන අතර ම වාතය උණුසුම් වීම හා තෙත් කිරීම සිදු වෙයි.
- නාස් කුටීරය ග්‍රසනිකාවට විවෘත වෙයි.
- ග්‍රසනිකාව වාතයට හා ආහාරවලට පොදු ගමන් මාර්ගයක් සලසයි.
- එනම් වාතයේ ගමන් මාර්ගයක් ආහාරවල ගමන් මාර්ගයක් එකිනෙක හරහා වැටී තිබේ.
- ආහාර ගිලින විට, ස්වරාලය ඉහළට චලනය වී අපිප්ච්ඡිකාව මගින් ස්වාසනාල ද්වාරය වැසීම සිදු වෙයි.
- එමගින් ආහාරවලට අන්තඃප්‍රේෂණය හරහා ආමාශයට ගමන් කිරීමට මාර්ගය සලස්වයි.
- අනෙක් අවස්ථාවල දී ශ්වාසනාල ද්වාරය විවෘත බැවින් වාතයට ග්‍රසනිකාවේ සිට ස්වරාලය හරහා ශ්වාසනාලයට ඇතුළු විය හැකි ය.
- ස්වරාලය තුළ වැඩි වශයෙන් ම ප්‍රත්‍යස්ථ පේශී පට්ටලින් සැදුණු ස්වරතන්ත්‍ර පිහිටා ඇත.
- ප්‍රශ්වාස වාතය ඇදීමට ලක් වූ හෝ ආතතියට ලක් වූ ස්වරතන්ත්‍ර හරහා ඉක්මනින් ඉහළට යන විට ස්වරතන්ත්‍ර කම්පනය වීමෙන් හඬ නිපදවීමට ආධාර වෙයි.

- ස්වරාලයේ හා ශ්වාසනාලයේ බිත්ති කාටිලේජ මගින් ගස්වීමක් වී පවතින නිසා වාතය ගමන් කරන මාර්ග විවෘත වී පවත්වා ගැනීමට හැකි ය.
- ශ්වාසනාලයේ සිට ශ්වාසනාලිකා දෙක හරහා එක් එක් පෙණහැලි තුළට වාතය ගමන් කරයි.
- පෙණහැලි තුළ දී අනුශ්වාසනාලිකා ලෙස හඳුන්වන ශ්වාසනාලිකාවල කුඩා ශාඛා ජාලයට වාතය ඇතුළු වෙයි.
- ශ්වසන මාර්ගයේ ප්‍රධාන ශාඛාවල ඇතුළු බිත්තිය ආස්තරණය කරන අපිච්ඡදයේ පක්ෂම හා කුඩා ශ්ලේෂ්මල පටලයක් ඇත.




Figure 10.17 The lower respiratory tract.

- ආශ්වාස වාතය සමඟ පැමිණෙන දූවිලි හා අංශුමය දූෂක රඳවා ගැනීමට ශ්ලේෂ්මල ආධාර වෙයි.
- පක්ෂම සැලීම මගින් එම ශ්ලේෂ්මල ග්‍රසනිකාව වෙත ඉහළට චලනය කරවා ගිලීම මගින් අන්තඃප්‍රේෂණයට ඇතුළු කරවයි.
- ශ්වසන පද්ධතිය පවිත්‍ර කරන මේ ක්‍රියාවලිය 'ශ්ලේෂ්මල ඉහළ නැංවීම' (mucus escalator) ලෙස හඳුන්වයි.
- ඉතා කුඩා අනුශ්වාසනාලිකා අග්‍රස්ථවල කුඩා වාත කෝෂ සමූහයක් එකට පොකුරු ගැසී ඇත.
- ගර්ත (alveoli) ලෙස හඳුන්වන මේ වාත කෝෂ තුළට වාතය පැමිණි පසු වායු හුවමාරු ක්‍රියාවලිය සිදු වෙයි.
- පක්ෂම රහිත, පැහැලි, තනි අපිච්ඡද සෛල ස්තරයකින් ගර්ත බිත්ති සෑදී ඇත.
- ගර්තවල ඇතුළත ආස්තරණය ඉතා කුඩා තරල පටලයකින් ආවරණය වී පවතියි.




Figure 10.11 The relationship of the trachea to the esophagus.


සෛලයේ ATP මූලාශ්‍රය

- පෙණහැලි තුළ ගර්භ මිලියන ගණනක් පවතින අතර, එමඟින් වායු හුවමාරුව සඳහා විශාල පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලයක් ලබා දෙයි.
 - එමෙන් ම සෑම ගර්භයක් ම රුධිර කේශනාලිකා ජාලයකින් ද වට වී පවතියි.
 - ආශ්වාස වාතය සමග ගර්භ තුළට ඇතුළුවන වාතයේ ඇති ඔක්සිජන්, තෙත කරලමය පටලයේ දිය වී ශීඝ්‍රයෙන් විසරණය වී තුනී අපිච්ඡදය හරහා කේශනාලිකා තුළට ඇතුළු වෙයි.
 - ඒ අතරතුරම කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායුව කේශනාලිකා තුළ සිට ගර්භ තුළට විසරණය වෙයි.
 - ගර්භ තුළ පක්ෂම නොපිහිටන නිසා ගර්භ තුළට ඇතුළු විය හැකි ආගන්තුක ද්‍රව්‍ය හක්කේශය කළ හැකි සුදු රුධිරාණු සෛල ගර්භවල පවතියි. (මෙම දෘෂ්ටිකෝණය 06/07)
 - එමෙන් ම ගර්භ ආවරණය කරමින් පවතින පෘෂ්ඨාකති ගම්කය (Surfactant) මගින් පෘෂ්ඨික ආතතිය අඩු කරමින්, ඉහළ පෘෂ්ඨික ආතතියක දී ගර්භ බිඳ වැටීම වළක්වයි.
- සෛලය 6 හෝ 8 ක් දෘශ්‍යයෙන් දැක්වේ.

පෙණහැලි වාතනය වීමේ යන්ත්‍රණය (ආශ්වාසන, ශ්වසන)

- වායු හුවමාරු පෘෂ්ඨය හෝ ගර්භ තුළ ඉහළ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයක් සහ අඩු කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා පෙණහැලි වාතනය වීම අත්‍යවශ්‍ය වෙයි.
- මාරුවෙන් මාරුවට සිදු වන පෙණහැලි තුළට වාතය ඇතුළු කරගන්නා ආශ්වාසය හා පෙණහැලිවලින් වාතය පිට කරන ප්‍රශ්වාසය මඟින් වාතන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙයි.
- මිනිසාගේ ශ්වසන සෘණ පීඩන ශ්වසනයක් ලෙස හැඳින්වෙන අතර, එහි පෙණහළු තුළට වාතය තල්ලු කිරීමට වඩා ඇද ගැනීමක් සිදු වේ.
- ආශ්වාසය සක්‍රීය ක්‍රියාවලියකි. පරිශ්‍ර පේශී හෝ අන්තර් පරිශ්‍ර පේශී හා උරස් කුහරයේ පත්ල සාදන කංකාල පේෂිමය ඵලකයක් වන මහා ප්‍රාචීරය සංකෝචනය වීමෙන් උරස් කුහරය ප්‍රසාරණය වීමෙන් එහි පරිමාව ඉහළ නැගියි.
- එමෙන් ම පෙණහැලි වට කරමින් පිහිටන අන්තර්ග ප්‍රදුරුව හා පාර්ශ්වික ප්‍රදුරුව යන පටල දෙක අතර, පිහිටන ඉතා තුනී තරලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය නිසා පටල දෙක තදින් එකිනෙක ඇලී බැඳී පවතියි.
- මේ නිසා එම පටල දෙකට එකිනෙක මත සුමට ලෙස ලිස්සා යාමට හැකියාව ලැබෙයි.
- එබැවින් උරස් කුහරයේ පරිමාව වැඩි වන විට, පෙණහැලි තුළ ද පරිමාව වැඩි වෙයි.
- මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පෙණහැලි තුළ වාතයේ පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා අඩු වෙයි.
- මෙමඟින් පෙණහැලි සහ වායුගෝලය අතර, පීඩන අනුක්‍රමණයක් හට ගනියි.
- එනිසා පීඩනය වැඩි වායුගෝලයේ සිට පීඩනය අඩු පෙණහැලි දක්වා වාතය ගලා යයි. මෙය ආශ්වාසය යි.
- ප්‍රශ්වාසය සාමාන්‍යයෙන් අක්‍රීය ක්‍රියාවලියකි.

- මෙවිට අන්තර් පරිශ්‍ර පේශී හා ප්‍රාචීර පේශී ඉහළ වෙයි.
- ඒ සමග ම උරස් කුහරය තුළ පරිමාව අඩු වෙයි. (06/07)
- එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පෙණහැලි තුළ පීඩනය බාහිර වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා ඉහළ යයි.
- මේ පීඩනය මඟින් ශ්වසන මාර්ගයට අයත් නාල ඔස්සේ පෙණහැලි තුළ සිට වායුගෝලයට වාතය තල්ලු කිරීමක් සිදු වෙයි.
- මිනිසකු විවේකීව සිටින විට, අන්තර් පරිශ්‍ර පේශී හා ප්‍රාචීර පේශීවල සංකෝචනය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලියට ප්‍රමාණවත්ය.
- එහෙත් මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරී මට්ටම අනුව, ගැඹුරු ශ්වසනය සඳහා අතිරේක පේශී වර්ගවල සංකෝචනයක් ද දායක කර ගනියි.
- එනම් ගෙල, පිට ප්‍රදේශය හා පපු ප්‍රදේශයේ මාංසපේශී සංකෝචනයක් ද දායක වෙයි.
- ගැඹුරු ආශ්වාසයේ දී එම පේශී වර්ග මඟින් පරිශ්‍ර කුඩු ව ඉහළට ඔසවමින් උරස් කුහරය තුළ පරිමාව තවදුරටත් වැඩි කරයි. උදා: ව්‍යායාමවල නිරතවන විට.



පෙණහැලි කාර්යක්ෂම ශ්වසන පෘෂ්ඨයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට හේතු

- එයට හේතු වන්නේ ගර්භ මඟින් වායු හුවමාරුවට ඉහළ පෘෂ්ඨ ක්ෂේත්‍රඵලයක් සැපයීමයි.
- ගර්භ බිත්ති හා කේශනාලිකා බිත්ති යන දෙවර්ගය ම සරල ශල්කමය අපිච්ඡදයෙන් ආස්තරණය වී ඇති නිසා විසරණය මඟින් වාතය ගමන් කළ යුතු දුර අඩු වෙයි.
- ගර්භ පෘෂ්ඨය තෙත් බැවින් විසරණය සඳහා වායු වර්ග දිය වෙයි.
- ගර්භ අධික ලෙස වාහිනීමත් නිසා ශ්වසන වායු විසරණය සඳහා කිවු විසරණ අනුක්‍රමණයක් පවත්වා ගත හැකි ය.


රුධිරය හා වාතය අතර, රුධිරය හා පටක අතර වායු හුවමාරුව (ශ්වසන)

- ගර්භවලදීත්, පටකවලදීත් වායු හුවමාරුව සිදු වීම අවශ්‍යව ක්‍රියාවලියකි.
- මේ පෙණහැලිවල සිට රුධිරය කරා O_2 පරිවහනය වීමත්, රුධිරයේ සිට පෙණහැලි වෙත CO_2 පරිවහනය වීමත් (මෙය බාහිර ශ්වසනය ලෙස ද හඳුන්වයි),


මෙමගින් ම වැඩි වාතය ලබා දෙන අතර (පුපුරුණ ශ්වසනය)

එදා අනුරු නරකව කිරීම → නැරඹීම → පුපුරුණ ශ්වසනය ආශ්වාස පුපුරුණ ශ්වසනය හරහා ඇති කර ගැනීම

- රුධිරයේ සිට පවක කරා ඔක්සිජන් පරිවහනය වීම හා පවකවල සිට රුධිරයට CO₂ පරිවහනය වීමත්
- (මෙය අභ්‍යන්තර ඝවේෂනය ලෙස ද හඳුන්වයි) අවශ්‍ය වෙයි.



- O_2 හා CO_2 වායුවල විසරණය සඳහා පෙණහැලි තුළ ගර්භික වාතය හා රුධිරය අතරත් (බාහිර ශ්වසනයේ දී) රුධිරය හා පටක අතරත්, (අභ්‍යන්තර ශ්වසනයේ දී) ආශීඛ පිඩන අනුක්‍රමණයක් පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය වෙයි.
- ආශ්වාසයේ දී, පෙණහැලි තුළට ඇතුළු කර ගන්නා පිරිසිදු වාතය, පෙණහැලි තුළ රැඳී පවතින ස්ථාවර වාතය සමඟ මිශ්‍ර වීමක් සිදු වෙයි.
- පෙණහැලි තුළ ඇති වන මේ වායු මිශ්‍රණයේ O_2 ආශීඛ පිඩනය (PO_2) වැඩි අගයක් වන අතර, CO_2 හි ආශීඛ පිඩනය (PCO_2) ගර්භික කේශනාලිකා තුළ පවතින රුධිරයේ ආශීඛ පිඩනයට වඩා අඩු අගයක් ගනියි.
- මේ ආශීඛ පිඩන වෙනස මඟින් වායු වර්ග දෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවන්ට විසරණය සිදු විය හැකි පරිදි සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයක් හට ගත්වා ඇත.
- මේ නිසා O_2 හි ඉද්ධ විසරණය ගර්භ තුළ සිට ගර්භ කේශනාලිකා තුළ ඇති රුධිරයටත්, CO_2 හි ඉද්ධ විසරණය රුධිරයේ සිට ගර්භ තුළටත් සිදු වෙයි.
- රුධිර කේශනාලිකා තුළට විරණයෙන් පැමිණෙන O_2 අණු රක්තාණු තුළ ඇති හිමොග්ලොබින් සමඟ සම්බන්ධ වෙයි.
- මෙහි දී O_2 අණු 4ක් ප්‍රත්‍යාවර්ත ලෙස හිමොග්ලොබින් අණුවක් සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් ඔක්සි හිමොග්ලොබින් හට ගනියි.



- ගර්භිකා කේශනාලිකාවලින් රුධිරය ඉවත් වන විට එහි ඇති O_2 හා CO_2 වල ආශීන පීඩනයක් ගර්භිකා වාතයේ ඇති එම වායුන්ගේ ආශීන පීඩන සමඟ සමතුලිතතාවක පවතී.
- ඉන් පසු එම රුධිරය පුප්පුසීය ශිරා ඔස්සේ හෘදයට ගමන් කර, සංස්ථානික පරිපථයට පොම්ප කෙරේ.
- සංස්ථානික කේශනාලිකා ඔස්සේ රුධිරය පුප්පුසීය ශිරා ඔස්සේ පටක කරා පැමිණි පසු එම රුධිරයේ, පටකවලට සාපේක්ෂ ව වැඩි O_2 ආශීන පීඩන අගයක් හා අඩු CO_2 ආශීන පීඩනයකින් යුතු ය.
- මේ ආශීන පීඩන අනුක්‍රමණය නිසා රුධිර ධාරාවෙන් පටක වෙත CO_2 හි ශුද්ධ විසරණයක්, පටකවල සිට රුධිර ධාරාවට O_2 හි ශුද්ධ විසරණයක් අන්තරාල තරලය/ බහිෂ්සෙළිය තරලය හරහා සිදු වෙයි.
- මෙය O_2 හර කිරීම හා O_2 බැර කිරීම ලෙස හැඳින්වේ. ඉන් පසු එම රුධිරය නැවත හෘදයට පැමිණි පසු, පෙණහැලි වෙතට පොම්ප කිරීම සිදු වෙයි.

අධ්‍යක්ෂ ආශ්වාස-ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලියේ සමස්තීය යාමනය

- දර්ශීයව ආශ්වාස-ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලිය යාමනය වන්නේ අනිවාර්‍යව යන්ත්‍රණයකිනි.
- මෙම අනිවාර්‍යව යන්ත්‍රණය, රුධිර සංසරණය සමඟ වායු හුවමාරු වීම දේහ පරිවෘත්තිය ඉල්ලුම හා සමායෝජනයට උදවු වේ. (෮.෧.෧.෧)
- ශ්වසන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධානතම යාමන මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ, මොළයේ පාදස්ථයේ පිහිටින සුක්‍රමිනා ශීර්ෂකයේ ය. ශ්වසන ක්‍රියාවලියේ පාලන මධ්‍යස්ථාන සුහලයක් සුක්‍රමිනා ශීර්ෂකයේ තිබෙන අතර, එමඟින් ශ්වසන ක්‍රියාවලියේ රිද්මය යාමනය කරනු ලබයි.
- එමෙන් ම මේ ක්‍රියාවලියේ යාමනය සඳහා, සෑහි ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණයක් ඉවහල් වෙයි.
- පෙණහැලි පටක ඇදී පවතින විට එය හඳුනා ගැනීමට හැකි සංවේදක ද පෙණහැලි තුළ ම පිහිටයි. (ප්‍ර. 6)
- ආශ්වාසයේ දී එම සංවේදකවල සිට සුක්‍රමිනා ශීර්ෂකය තුළ පාලන පරිපථ ලෙස ක්‍රියාකරන නියුරෝනවලට ස්නායු ආවේග යවයි.
- මෙමඟින් වැඩිදුරටත් ආශ්වාසය නිශේධනය කරමින්, පෙණහැලි ප්‍රමාණයට වඩා ප්‍රසාරණය වීම වළක්වයි.
- ශ්වසනය යාමනය සඳහා සුක්‍රමිනා ශීර්ෂකය පටක තරලයේ pH වෙනස මත රඳා පවතී. මේ පටක තරලයේ pH අගය, රුධිරයේ CO_2 සාන්ද්‍රණයේ දර්ශකයකි.
- උදාහරණයක් ලෙස: දේහයේ පරිවෘත්තිය ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ ගිය අවස්ථාවක දී රුධිරයේ CO_2 සාන්ද්‍රණය ද ඉහළ යයි.
- එවිට CO_2 විසරණය මඟින් මස්තිෂ්ක සුක්‍රමිනා තරලයට ද ගමන් කරයි.
- එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මස්තිෂ්ක සුක්‍රමිනා තරලයේ CO_2 සාන්ද්‍රණය ද ඉහළ යයි.
- එහි දී මේ CO_2 ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ විට කාබොනික් අම්ලය (H_2CO_3) සාදා, එය විඝටනය වීමෙන් HCO_3^- හා H^+ ලබා දෙයි.

ശബ്ദം $\rightarrow$ **വാക്യ**
 പ്രസ്തുതം : അത് ഏതെങ്കിലും
 കൃത്യമായി ഉറപ്പായ ആശയം.
 (മർദ്ദം ഉറപ്പ്)

ସ୍ୱୟଂଚର୍ଯ
 ଗ୍ରହଣେ ଶବ୍ଦ
 ଉତ୍ପତ୍ତି ୦୨ ଲୋକିତ
 CO₂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି

ଗଢ଼ିବିଶୁଦ୍ଧି = 7.3

H₂O



- මේ නිසා ඉහළ CO₂ සාන්ද්‍රණයක දී, H⁺ සාන්ද්‍රණය වැඩි බැවින් pH අගය පහළ බසීයි.
- සුළුමනා ශීර්ෂකයේ ඇති සංවේදක මගින් සහ ප්‍රධාන රුධිර වාහිනී වන මහා ධමනියේ හා ශීර්ෂපෝෂී ධමනි තුළ ඇති සංවේදක මගින් මේ pH වෙනස් වීම හඳුනාගනියි.
- සුළුමනා ශීර්ෂකයේ සහ ප්‍රධාන රුධිරවාහිනී තුළ ඇති සංවේදක මගින් මේ pH අඩු වීම අනාවරණය කර ගනී. මීට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස සුළුමනා ශීර්ෂකයේ පාලක පරිපථ ක්‍රියාකාරී වෙමින් ශ්වසනයේ ගැඹුර හා වේගය වැඩි කරමින් වැඩිපුර ඇති CO₂ ප්‍රශ්වාස වාතය මගින් බැහැර කරමින් රුධිරයේ සාමාන්‍ය pH අගය වන 7.4 තෙක් ළඟා කර ගනියි.
- ශ්වසන පාලක මධ්‍යස්ථානය වෙත O₂ මට්ටම මගින් ඇති වන්නේ ඉතා සුළු බලපෑමකි.
- එහෙත් O₂ සාන්ද්‍රණය ඉතා පහළ ගිය විට මහා ධමනියේත්, ශීර්ෂපෝෂී ධමනිවලත් පිහිටන O₂ සංවේදක මගින් සුළුමනා ශීර්ෂකයට ආවේග ලබා දී ශ්වසන ශීඝ්‍රතාව ඉහළ නංවයි.
- එමෙන් ම ශ්වසන යාමනය නිසි ලෙස හැසිරවීමට අදාළ අතිරේක ස්නායු පරිපථ මස්තිෂ්ක ව්‍යාප්තයට අයත් වන
- සුළුමනා ශීර්ෂකයට ඉහළින් පිහිටන වැරෝලී සේතුවේ ද පිහිටයි.

ශ්වසන පද්ධතියේ ආබාධ

ශ්වසන පද්ධතියේ මනා ක්‍රියාකාරීත්වයට සිගරට් දුම් පානයෙන් ඇති වන බලපෑම්

- ශ්වසන පද්ධතිය ආක්‍රමව, දේහයේ සියලු අවයව කෙරේ සිගරට් දුම් හානිකර බලපෑම් ඇති කරයි.
- විවිධ රෝග හා දුබලතා හට ගැනීමට ඇති ප්‍රවණතාව ඉහළ නංවමින් මරණයට පත් වීමට ඇති අවදානම වැඩි කරයි.
- දුම් පානය කරන්නන්, දුම්කොළ දහනය නිසා හට ගන්නා රසායන ද්‍රව්‍ය විශාල ගණනක් ආශ්වාස කරයි. රසායනිකව සක්‍රීය වන මේ ඇතැම් රසායන ද්‍රව්‍ය මගින් දේහයට නොයෙකුත් හානි ක්‍රියාත්මක කරයි.
- සිගරට් දුමෙහි ආශ්වාස වන සංයෝග ද්‍රව්‍ය අතුරින් නිකොටින් ඇබ්බැහි වන රසායනිකයකි.
- එය තාවකාලිකව හෘදය ස්පන්දන වේගය ඉහළ නංවන අතර, පර්යන්ත රුධිර වාහිනී සංකුචනය කරවයි.
- එමගින් තාවකාලිකව රුධිර පීඩනය ඉහළ නංවයි.
- සිගරට් දුම් මගින් කලස් සෛලවලින් (goblet cells) ශ්ලේෂ්මල ස්‍රාවය උත්තේජනය කරන අතර, ශ්වසන මාර්ගයේ පක්ෂම ක්‍රියාකාරීත්වය ද නිෂේධනය කරයි.
- මේ ශ්ලේෂ්මල අනුශ්වාසනාලිකාවල එකතු වීමෙන් ඒවා අවහිර වීම සිදු වේ.

- එමගින් ශ්වාසනාලිකා ප්‍රදාහය හෝ බ්‍රොන්කයිටිස් (Bronchitis) ඇති වේ.
- මේ හේතුවෙන් ශ්වසනය අපහසු වේ.
- සිගරට් දුමේ අඩංගු වන හයිඩ්‍රජන් සයනයිඩ් වැනි රසායනික ද්‍රව්‍ය ද පක්ෂම නිසිලෙස ක්‍රියාව නතර කරවයි.
- එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දුවිලි හා වෙනත් අංශුමය ද්‍රව්‍යවලට පෙණහැලිවල එක්රැස් වීමට ඉඩ සැලසෙන බැවින්, පෙණහැලි පටකවල ඇති හක්ෂක සෛල ප්‍රමාණය වැඩි කරවයි.
- එම සෛල මගින් ජාරක එන්සයිම විශාල ප්‍රමාණයක් නිදහස් කිරීම නිසා ගර්හික පටක විනාශ වීමෙන් වායු හුවමාරුව සඳහා සඵල-පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය අඩුවෙයි.
- සිගරට් දුමේ අඩංගු වන කාබන් මොනොක්සයිඩ් (CO) රුධිරයට අවශෝෂණය වී හිමොග්ලොබින් සමඟ ඔක්සිජන්වලට වඩා වැඩි බන්ධනාවකින් අප්‍රතිවර්තන ලෙස සම්බන්ධ වෙයි.
- එවිට නිපදවෙන ඔක්සිහිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය අඩු වෙයි.
- එනිසා රුධිරයේ ඔක්සිජන් පරිවහනය අඩු වෙයි.
- සිගරට් දුමේ පිළිකාවලට හේතු වන ද්‍රව්‍ය (පිළිකාකාරක) විශාල සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වේ.
- පෙණහැලි පිළිකා අතුරින් 90% කට පමණ හේතුව වන්නේ සිගරට් දුමයි.
- සිගරට් දුමේ අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍යවලට දීර්ඝ කාලයක් නිරාවරණය වීමෙන් ශ්වාසනාලිකා අපිච්ඡදයේ සෛල ගුණනය වේගවත් කරයි.
- එමගින් අසාමාන්‍ය සෛල ස්කන්ධයක් ඇති වේ.
- එහි ඇති වන මේ අසාමාන්‍ය සෛල අතුරින් ඇතැම් ඒවා පිළිකා සෛල බවට පත් වෙයි.
- එවැනි සෛල බිඳ වැටී පෙණහැලිවල වෙනත් කොටස් හෝ වෙනත් අවයව කරා ද පිළිකාව ව්‍යාප්ත විය හැකිය.
- අක්‍රියව සිගරට් දුම් පානය කරන පුද්ගලයෝ ද ඉහත දැක්වූ සියලු අයහපත් තත්ත්වවලට මුහුණ දෙති.

සිලිකොසිස්

- සිලිකා සංයෝග අඩංගු දුවිල්ලට දීර්ඝකාලීනව නිරාවරණය වීමෙන් මේ තත්ත්වය හට ගනී.
- මේ තත්ත්වය සඳහා වැඩි අවදානමක් සහිත කර්මාන්ත වන්නේ,
 - > ග්‍රැනයිට්, කළුගල් සහ වැලිගල් පතල් කැණීම
 - > ගල් අඟුරු, රන්, වීන් හා කම් ආකර
 - > වැලි හා පෙදරේරු කර්මාන්තය
 - > විදුරු හා මැටි කර්මාන්තය
- සිලිකා අංශු ආශ්වාස කළ විට ඒවා ගර්හ තුළ ඒකරාශී වේ.
- මේ අංශු මහා හක්ෂණ මගින් අධිග්‍රහණය කරයි.
- ඇතැම් සිලිකා අංශු ගර්හ තුළ ම 100 කිවිය හැකිය.

- ඒවා ග්‍රහණය වීමට පැමිණ ප්‍රධාන ආසන්නයේ ඇති අනුශ්වාසනාලිකා හා රුධිර වාහිනී අවට පවතින සම්බන්ධක පටක තුළට ගමන් කරයි.
- එම අංශු වටා ක්‍රමයෙන් තන්තුමය පටක වර්ධනය උත්තේජනය වීම නිසා අවසානයේ ශ්වසන අනුශ්වාසනාලිකා හා රුධිර වාහිනී විනාශයට පත් වෙයි.
- දීර්ඝ කාලීනව පෙණහැලි පටක ක්‍රමයෙන් විනාශ වීමෙන් අවසානයේ පුපුරුණු අධ්‍යාතනිය හා හෘදය අක්ෂරණය වීමට මග පාදයි.

ඇස්බැස්ටෝස් ආශ්‍රිත රෝග/ ඇස්බැස්ටෝසිස්
ඇස්බැස්ටෝස් නාශ පිරිමි, 6 වන 6 වන

- ඇස්බැස්ටෝස් අඩංගු නිෂ්පාදන සෑදීමේ හෝ භාවිතයේ නිරත වන්නෝ මේ අවදානමට මුහුණ දෙති.
- ඇස්බැස්ටෝස් කෙදිනි දුටු අංශු සමඟ ආශ්වාස කිරීමෙන් මේ ආබාධ හට ගත හැකි ය.
- මේ කෙදිනි විශාලත්වයෙන් වැඩි වුව ද ඒවාට ශ්වසන අනුශ්වාසනාලිකා හෝ ග්‍රහණ දක්වා විනිවිද යාමට හැකි ය.
- මහා හක්ෂාණු ග්‍රහණ තුළ එක්රැස් වී ඇත.
- එම මහා හක්ෂාණු මගින් කෙටි ඇස්බැස්ටෝස් කෙදිනි අධිග්‍රහණය කරයි.
- එහෙත් විශාල කෙදිනි මහා හක්ෂාණු, ප්‍රෝටීනමය ද්‍රව්‍ය හා යකඩ තැන්පතු මගින් වට කරනු ලබයි.
- එමෙන් ම තන්තු පරිග්‍රහණය කළ මහා හක්ෂාණු ද ග්‍රහණය වීමට පැමිණ ශ්වසන අනුශ්වාසනාලිකා හා රුධිරවාහිනී වටා ඒකරාශී වෙමින් තන්තුමය පටක සෑදීම උත්තේජනය කරවයි.
- මේ තත්ත්වයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වන්නේ ක්‍රමයෙන් පෙණහැලි පටක විනාශ වෙමින් පුපුරුණු අධ්‍යාතනිය හටගැනීමයි.

පෙණහැලි පිළිකා

- පෙණහැලි පිළිකා තත්ත්වයන්ගෙන් 90% ක් පමණ හට ගන්නේ සිගරට් දුම් පානය නිසා ය.
- දුම්පානයක් නොවිණි නම් ශ්වසන මාර්ගයේ නාස්රෝම, ශ්ලේෂ්මල සහ පක්ෂම මගින් රසායනික සහ ප්‍රෝජෙස්ට් උද්දීපක කෙරෙන් ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් ලැබී තිබුණු අතර, දුම්පානය කරන අයකුගේ ඒවා ක්‍රමයෙන් යටපත් වෙමින් අවසානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නවති.
- එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උද්දීපක විවිධ මුක්තබන්ධ, පිළිකාකාරක ද්‍රව්‍ය, ව්‍යාධිපනනයන් යනාදිය පෙණහැලි තුළ ඒකරාශී වෙයි.
- මේ ද්‍රව්‍යයන් හේතුවෙන් අවසානයේ දී පිළිකා වර්ධනය වීම සිදු වෙයි.

ක්ෂය රෝගය (Tuberculosis/TB)

- *Mycobacterium tuberculosis* නමැති බැක්ටීරියාව ආසාදනය වීම නිසා හට ගන්නා ආසාදන රෝගයයි.
- ආසාදිත රෝගියෙකුගේ කැස්ස මගින් බැහැරව නිදහස් වන බැක්ටීරියාව අඩංගු වාතය ආශ්වාස කිරීමෙන් ආසාදනය නොවූ පුද්ගලයකුට රෝගය ආසාදනය වීම සිදු විය හැකි ය.


- සුලභතම ක්ෂයරෝග ආකාරය පෙණහැලි ආසාදනයට ලක් වීමෙන් හට ගන්නා පුපුරුණු ක්ෂය රෝගයයි.
- අනෙකුත් දේහ අවයවවලට ද බලපෑම් ඇති විය හැකි ය.
- මේ බැක්ටීරියාව පෙණහැලි තුළට ආශ්වාස කිරීමෙන් පුපුරුණු ක්ෂයරෝගය සම්ප්‍රේෂණය වේ.
- වාතයේත්, නිවාස ආශ්‍රිතව ඇති ගෘහාශ්‍රිත දූවිලි තුළ ද දීර්ඝ කාලයක් මේ බැක්ටීරියාව නොනැසී පැවතිය හැකි ය.
- වෙනත් ආසාදනවලට නිතර ලක් වීම හා දුෂ්පෝෂණය නිසා ප්‍රතිශක්තිය හීන වීම මේ රෝගය ආසාදනයට බලපායි.
- මෙහි රෝග ලක්ෂණ වන්නේ, ආහාර අරුචිය, බර අඩු වීම, අධික දහඩිය, උණ, පිඩාකාරී කැස්ස සහ බෙටිය සමඟ රුධිරය බැහැර වීම

ඇශ්ම (Asthma)

- මේ රෝගයේ ප්‍රධානතම ලක්ෂණය හතිය හා පපුව හිර වීම නිසා හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අපහසු වීමයි.
- මෙයට හේතු වන්නේ අනුශ්වාසනාලිකා ජාලයේ, බිත්තිවල පවතින සිනිදුපේශි ක්ෂණික ව සංකෝචනයට ලක් වීමෙන් ඒවායේ කුහර පටු වීම හෝ වැසී යාමයි.
- මේ කාල සීමාව තුළ දී ආශ්වාස -ප්‍රශ්වාසයේ දී ශබ්ද නගා හුස්ම ගැනීමෙන් සිව්රාගන් බාන ශබ්දයක් (whistling) හට ගනියි.
- ඇශ්ම හට ගැනීමට ප්‍රධාන වශයෙන් ම බලපාන්නේ ආශ්වාස වාතය සමඟ පැමිණෙන පරාග, දූවිලි, මයිටාවන්, බීජාණුවර්ග, සමහර ආහාර වර්ග, සිනල වාතය, අධික ව්‍යායාම හා දුම් වර්ග ආශ්‍රාණය නිසා ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියේ සිදු වන අධි ක්‍රියාකාරීත්වයයි.
- ප්‍රති-ප්‍රදාහ (Anti-inflammatory) ඖෂධ වර්ග මගින් මේ තත්ත්වය පාලනය කරනු ලබයි.

(β_2 agonist - විෂබීජනාශකීය) ↓ වි:

ශ්වසන චක්‍රය, පෙණහැලි පරිමා හා ධාරිතා



- එක් ශ්වසනයක දී සිදු වන ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය ශ්වසන චක්‍රය ලෙස හඳුන්වයි.

කංකානාය -  විෂබීජනාශකීය ↓ විම, constriction

සංකෝචනය -  දිගු වීම, contraction, (විෂබීජනාශකීය)

- ආශ්වාසයේ හා ප්‍රශ්වාසයේ විවිධ තත්ත්ව මත පෙණහලු තුළට ඇතුළු වන හා පිට වන වාත ප්‍රමාණය රඳා පවතියි.
- මේ යටතේ ශ්වසන - පරිමා හතරක් පිළිබඳ විස්තර කෙරේ.

පෙණහැලි පරිමා

(1) උදම් පරිමාව (Tidal volume / TV)

- සාමාන්‍ය ශ්වසනයේ, එක් ශ්වසනයකදී අපහැරී හරහා හුවමාරු වන වාත පරිමාව උදම් පරිමාව ලෙස හැඳින් වේ.
- විවේකීව සිටින වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකු සඳහා (එක් සාමාන්‍ය ආශ්වාසයක් සඳහා) **500ml** පමණ වේ.

(2) ආශ්වාස අතිරේක පරිමාව (Inspiratory reserve volume/ IRV)

- බලපෑමක් මඟින් සාමාන්‍ය උදම් පරිමාවට වඩා වැඩිපුර ආශ්වාස කළ හැකි අතිරේක වාත පරිමාවයි.

(3) ප්‍රශ්වාසය අතිරේක ප්‍රශ්වාස පරිමාව (Expiratory reserve/ ERV)

- සාමාන්‍ය ප්‍රාශ්වාසයකින් පසු පෙනහළුවලින් ආයාසයකින් යුක්තව තවදුරටත් බැහැර කළ හැකි අතිරේක වාත පරිමාවයි.

(4) ශේෂ පරිමාව (Residual volume/RV)

- ප්‍රබල ගැඹුරු ප්‍රශ්වාසයකට පසුත්, පෙණහැලි තුළ බැහැර නොවී ඉතිරි වන වාත පරිමාවයි. මෙහි සාමාන්‍ය අගය **1200ml** පමණ වෙයි.

පෙණහැලි ධාරිතා

- පෙණහැලි තුළ වාත පරිමාවන්ගේ විශේෂිත සංකලනයක් ශ්වසන ධාරිතා (පෙණහැලි ධාරිතා) නම් වේ. (Lung Capacities).
- මේ නිසා පෙණහැලි ධාරිතා සෑම විට ම පෙණහැලි පරිමා දෙකක හෝ කිහිපයක සංකලනයන්ගෙන් සමන්විත ය.
- පුද්ගලයකුගේ ශ්වසන ස්වභාවය තීරණය කිරීමට මේ පෙණහැලි ධාරිතා වැදගත් ය.

(1) ආශ්වාස ධාරිතාව (Inspiratory Capacity/ IC)

උපරිම ආයාසයකින්, ආශ්වාසයෙන් ඇතුළු කර ගන්නා සම්පූර්ණ වාත පරිමාවයි. එනම්,

$$IC = TV + IRV$$

(2) කෘත්‍යානුගත ශේෂ ධාරිතාව (Functional Residual Capacity/ FRC)

- සාමාන්‍ය ප්‍රශ්වාසයකට පසු පෙණහැලි තුළ ඉතිරිව පවතින වාත පරිමාවයි.

$$FRC = RV + ERV$$

- මේ වායු පරිමාව ගර්භ තුළ දී අඛණ්ඩ වායු හුවමාරු ක්‍රියාවලියක් සඳහා වැදගත් වෙයි. මේ නිසා ප්‍රශ්වාසයකට පසු ගර්භ ඇතිළීමෙන් වළක්වයි.

(3) ජෛව ධාරිතාව (Vital capacity/ TLC)

- පුද්ගලයකුට ආශ්වාස හා ප්‍රශ්වාස කළ හැකි උපරිම වාත පරිමාව ය.
- සාමාන්‍යයෙන් ස්ත්‍රීන්ගේ මෙය **3100ml**ක් පමණ වන අතර, පුරුෂයන්ගේ **4800ml**ක් පමණ වෙයි.

$$VC = TV + IRV + ERV$$

(4) මුළු පෙණහලු ධාරිතාව (Total lung capacity/ TLC)

- පෙණහලුවලට දරාගත හැකි උපරිම වායු පරිමාව හෝ සියලුම පෙණහලු පරිමාවල එකතුවයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් **6000ml**ක් පමණ වේ.

රෙනා හැඳි ජලම, ඡ ශල්ලව ඡකතු ව.

- ශාඛනය වූ සන්නායක නාල පද්ධතිය තුළ (ශ්වාසනාලය, ශ්වාසනාලිකා, අනුශ්වාසනාලිකා) ආශ්වාස වාතය පිරී ඇතිමුත් ඒවා ගර්භ තුළ වායු හුවමාරුවට කිසිවිටෙක දායක නොවේ. මේ වාත පරිමාව ව්‍යුහාත්මක මළ අවකාශය ලෙස හැඳින්වෙන අතර, එය දර්ශියව **150ml** වෙයි

- (ලදාංශ්වික මාර්ගයේ ආස්තරණය, මුත්‍ර මාර්ගයේ ආස්තරණය, ආහාර මාර්ගයේ ආස්තරණය, ප්‍රජනක මාර්ගයේ ආස්තරණය)
- ශ්ලේෂ්මල පටලය නිපදවන ශ්ලේෂ්මල මඟින් ක්ෂුද්‍රජීවීන් හා වෙනත් අංශු රඳවා ගනු ලබයි.
 - ශ්වසන මාර්ගයේ දී, පක්ෂමධර අපිච්ඡදයේ ඇති පක්ෂම මඟින් ශ්ලේෂ්මලය හා ඕනෑම හසුකරගත් ද්‍රව්‍යයක් ඉහළට තල්ලු කරනු ලබයි.
 - කැස්ස හා කිවිසුම් මඟින් ශ්ලේෂ්මල වලනය හා රඳවා ගත් ව්‍යාධිජනකයන් දෙහයෙන් පිටතට යැවීම වේගවත් කරනු ලබයි.
 - මෙමඟින් එම ද්‍රව්‍ය පෙණහැලී වෙනට ඇතුළුවීම වළක්වයි. (අඩංගු) කොටුවේ (Sebum) ස්පර්ශයක් ඇතිවීමට හේතු වේ.
- (3) ස්නායු
- විවිධ දේහ අවයව මඟින් ස්නායු කරන ස්නායු (කහුළු, බෙටය, ශ්ලේෂ්මල) රසායනික හා භෞතික බාධක ලෙස ක්‍රියා කරමින් සමේ සහ ශ්ලේෂ්මල පටලවල මතුපිට අපිච්ඡද පෘෂ්ඨය ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට උදවු කරයි.
 - කහුළු මඟින් ඇසට ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගෙන් හා උද්දීපකවලින් ආරක්ෂාව සපයයි.
 - එමෙන් ම නිරන්තරයෙන් ඇස සේදීමට ලක් කරමින්, ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තනුක කිරීමත්, ඇසේ මතුපිට තැන්පත් වීමත් වළක්වමින් ඇස ආරක්ෂා කරයි.
 - බෙටය මුඛයේ පෘෂ්ඨයේ සිටින ක්ෂුද්‍රජීවීන් සේදීමට ලක් කරමින් මුඛය තුළ ක්ෂුද්‍රජීවීන් සන්නාමාසීකරණය අඩු කරවයි.
 - ශ්ලේෂ්මල ස්නායුයන් මඟින් නිරාවරණය වන විට විවිධ අපිච්ඡද නැහැවීමට ලක් කරමින්, අඛණ්ඩ සේදීම් ක්‍රියාවලිය මඟින් බැක්ටීරියා සහ දිලීර වැනි ක්ෂුද්‍රජීවී ගහන තනුක කිරීමත්, සන්නාමාසීකරණය නිෂේධනය කරයි.
 - කහුළු, බෙටය, ස්වේද ස්නායු සහ ශ්ලේෂ්මල වැනි ස්නායුයන්හි අඩංගු වන ලයිසෝසයිම් නමැති එන්සයිමය මඟින් ඇතැම් බැක්ටීරියාවන්ගේ පෙප්ල බිත්ති විනාශ කරයි.
 - ආමාශයික යුෂයේ ඇති අම්ලය මඟින් ආමාශය තුළ ආම්ලික පරිසරයක් ඇති කරමින් බොහෝ බැක්ටීරියාවන් හා ආහාර ද්‍රව්‍ය සමඟ අධිග්‍රහණය වූ බැක්ටීරියා බුලක විනාශ කරනු ලබයි.
 - සමේ ස්වේද හා ස්නේහ ස්නායු ග්‍රන්ථිවල ස්නායුයන් මඟින් සමට ආම්ලික බවක් ලබා දෙමින් බැක්ටීරියා වර්ධනය වීම වළක්වයි.

- ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය අයත් විශිෂ්ට සෛල මත ඇති ප්‍රතිග්‍රාහක අණු මඟින් කමාගේ නොවන සෛල හඳුනා ගැනීම සිදු කරයි.
- එනම් ව්‍යාධිජනකයන් වැනි ආගන්තුක කාරක හඳුනා ගත්තේ ඒවායේ පවතින අණු සමග එම ප්‍රතිග්‍රාහක අණු විශිෂ්ට ලෙස බැඳීම මඟින් අණුක මට්ටමේ හඳුනා ගැනීමත් සිදු කිරීමෙනි.
- සහජ ප්‍රතිශක්තියේ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණය හක්පෙස සෛල, ස්වාභාවික නාශක සෛල, (natural killer cells), ප්‍රතික්ෂුද්‍රීව ප්‍රෝටීන, හා ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරවලින් සමන්විත ය.

అడ్రెస్ (1) బహుళము -

- දීර්ඝ ජීවිත, ආගන්තුක අංශු හා සෛල සුන්වුන්
අධිග්‍රහණයටත් ඒවයේ අන්ත:සෛදිය ජීර්ණය හා
විනාශ කිරීමටත් හැඩගැසුණු විශේෂිත සෛල
හක්ෂක සෛලයි.
- ආගන්තුක කාරකවල සංඝටක හා අංශු හදුනා
ගැනීමට හක්ෂක සෛල සතු ප්‍රතිග්‍රාහක අණු
යොදා ගනියි.
 - මිනිසාගේ ඇති ප්‍රධානතම හක්ෂ සෛල වර්ග
දෙකකි. ඒවා නියුට්‍රෝෆිල හා මහාහක්ෂාණු නම්
වේ.
- ආසාදනයට ලක් වූ පටක මගින් නිදහස් කරන
සංඥා මගින් ආසාදිත ස්ථානය වෙතට සංසරණය
වන රුධිරයේ ඇති නියුට්‍රෝෆිල පළමුවෙන්
ආකර්ෂණය වෙයි.
- ඉන්පසු නියුට්‍රෝෆිල මගින් ආසාදිත
ව්‍යාධිජනකයන් අධිග්‍රහණය කර විනාශ කරනු
ලබයි. ලක්ෂණයන් වන්නේ වර්ණය නිශචල වීම,
මහා හක්ෂාණු වඩාත් විශාල සහ ප්‍රභල හක්ෂක
සෛල වර්ගයකි.
- ප්‍රතිශක්ති බල නිශ්පාදනය වේ.

(2) ස්වභාවික නාශක සෛල / (Natural killer cells)

- මේවා වසා සෙල වර්ගයක් වේ.
- විශිෂ්ට නොවන ආරක්ෂණ යන්ත්‍රණයට දායක වේ.
- මෙම වසා සෙල රුධිරයේත්, ප්ලීහාව, වසා ගැටිත් වැනි ඇතැම් පටක හෝ අවයවවලත් පවතියි.
- ඒවාට සෙල මතුපිට ඇති අසාමාන්‍ය අණු වර්ග හඳුනා ගෙන මිරා දැමිය හැකි ය.
- (උදා: වයිරස ආසාදිත දෙහ සෙල හා සමහර පිළිකා සෙල).
- ස්වභාවික නාශක සෙල මේ අසාමාන්‍ය සෙල පරිශ්‍රහණය නොකරන අතර, අසාමාන්‍ය සෙලවල මතුපිටට සම්බන්ධ වන විට ඒවා විනාශ කළ හැකි රසායනික ද්‍රව්‍ය මුදා හැර, ඒවා විනාශයට ලක් කරමින් වයිරස හා පිළිකාව නව දුරටත් පැතිර යාම වළක්වයි.

(3) ප්‍රතික්ෂුද්‍රී වි ප්‍රෝතින (Antimicrobial proteins)

- රුධිරයේ හා අන්තරාල තරලයේ අඩංගු ඇතැම් ප්‍රෝටීන සහජ ආරක්ෂණ ඇති කිරීම සඳහා

ක්ෂුද්‍රජීවීන්ට සෘජුව පහරදීම හෝ ඔවුන්ගේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියට බාධා සිදු කරයි.

- ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ වර්ධනය අඩාල කරවන එවැනි ප්‍රතික්ෂුද්‍රජීවී ප්‍රෝටීන වර්ග දෙකකට උදාහරණ ලෙස
 - ඉන්ටර්ෆරෝන් (Interferons) හා
 - අනුපූරක ප්‍රෝටීන (Complement Protein) දැක්විය හැකිය.
- ඉන්ටර්ෆරෝන් (Interferons) -
 - වයිරස මඟින් ආසාදනයට ලක් වූ දේහ සෛලවලින් ස්‍රාවය වන මේ ප්‍රෝටීන මඟින් ආසාදනයට ලක් නොවූ ධාරක සෛලවල ආරක්ෂාව සඳහා වයිරසවල ප්‍රතිවලිනයට බාධා ඇති කරයි.
 - මේ සඳහා වයිරස ආසාදිත සෛලය ස්‍රාවය කරන ඉන්ටර්ෆරෝන්, ආසාදනය නොවූ යාබද සෛල වෙත විසරණය වී, එම සෛලවලින් ප්‍රතිවයිරස ප්‍රෝටීන ස්‍රාවය වීම උත්තේජනය කරවයි.
 - එවිට එම යාබද සෛල තුළ වයිරසවල ප්‍රතිවලිනය නිශේධනය වෙයි.
 - එමෙන් ම ඇතැම් ඉන්ටර්ෆරෝන් මඟින් මහා භක්ෂාණු සක්‍රීය කරවා භක්ෂක ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරවයි.
- අනුපූරක ප්‍රෝටීන
 - අනුපූරක ප්‍රෝටීන යනු රුධිර ප්ලාස්මාවේ හා ප්ලාස්ම පටලවල පවතින සාමාන්‍යයෙන් අක්‍රීය ප්‍රෝටීන කාණ්ඩයකි.
 - ක්ෂුද්‍රජීවී සෛල මතුවීම පවතින විවිධ ද්‍රව්‍ය හමුවේ මේවා සක්‍රීය වීමෙන්, ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මාලාවක් ඔස්සේ ආක්‍රමණික සෛල බිඳ දැමීම සිදු කරයි.
 - එමෙන් ම ඒවා මඟින් භක්ෂ සෛලකාව හා ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය ද ඉහළ නංවයි.

(4) ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය (Inflammatory response)




Figure 43.8 Major events in a local inflammatory response.

- ක්ෂුද්‍රජීවී ආසාදනයක් හෝ
- පටක තුවාල වීමක් මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන
- පටක හානියකට දේහය තුළ ඇති වන
- සහජ ප්‍රතිචාරයක් ආරක්ෂක ප්‍රතිචාරයයි.

- හානි වූ පටක මඟින් නිදහස් කරන ද්‍රව්‍යයන් රුධිරවාහිනී විස්තාරණය හා
- ඒවායේ පාරගම්‍යතාව වැඩි වීම සිදු කරයි.
- එවිට රුධිරනාල හරහා සංක්‍රමණය වන මහා භක්ෂාණු මඟින් ආක්‍රමණික ව්‍යාධිජනකයන් විනාශ කර, පටක අලුත්වැඩියා කිරීමේ හැකියාවට උදවු කරයි.
- හානියට ලක් වූ ස්ථානයේ ක්ෂුද්‍රජීවීන් විනාශ කර, වෙනත් පටක කරා පැතිරී යාම වළක්වාලීම සහ
- පටක අලුත්වැඩියාව වීර්‍ය ගැන්වීම ප්‍රදාහය මඟින් සිදු වේ.
- ආසාදනය හෝ තුවාලය හේතුවෙන් ඇති වන විවිධ සංඥා අණුවර්ග ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය හට ගන්වයි.
- හානි වූ ස්ථානයේ සම්බන්ධක පටක තුළ ඇති ක්‍රම සෛල මඟින් ප්‍රධාන වශයෙන් නිදහස් කෙරෙන හිස්ටාමින් ප්‍රදාහක සංඥා අණු අතරින් එකකි.
- හිස්ටාමින් මඟින් තුවාල වූ පටකය අසල ඇති රුධිරවාහිනීවල (රුධිර කේෂනාලිකාව) පාරගම්‍යතාව වැඩි කිරීම සහ විස්තාරණය සිදු කරයි.
- රුධිරවාහිනී විස්තාරනය මඟින් හානි වූ ප්‍රදේශය තුළින් වැඩි රුධිර ප්‍රමාණයක් ගලා යාමට සලසා ගිය සෛල ඉවත් කිරීම පහසු කරවයි.
- රුධිරවාහිනීවල පාරගම්‍යතාව වැඩි කිරීම මඟින් රුධිරයේ සිට හානි වූ ප්‍රදේශයට සුදු රුධිර සෛල, ප්‍රතික්ෂුද්‍රජීවී ප්‍රෝටීන, රුධිර කැටි ගැසීමේ මූලිකාංග ඇතුළු වීම සඳහා ඇතුළු කාන්දු වීම වැඩි කරයි.
- එමඟින් ආක්‍රමණික ව්‍යාධිජනකයන් විනාශ කිරීම සහ පටක අලුත්වැඩියාවට උදවු වේ.
- රුධිරයේ සිට පටක හානිය සිදු වූණු ස්ථානයට පැමිණි සක්‍රීය වූ භක්ෂක සෛල ලෙස ක්‍රියාකරන
- මහා භක්ෂාණු හා
- නියුට්‍රොෆිල මඟින්
- සයිටොකයින් (cytokines) වැනි සංඥා අණු වර්ග ද නිදහස් කරවයි.
- එවිට ආසාදිත හෝ හානි වූ පටක වෙත රුධිරය ගලා ඒම වැඩි කරවයි.
- එමෙන් ම ප්‍රදාහයක දී සක්‍රීය වන අනුපූරක ප්‍රෝටීන තවදුරටත් හිස්ටාමින් නිදහස් කිරීමට හේතු වේ. එමඟින් භක්ෂක සෛල වැඩිපුර ආකර්ෂණය කරමින් තුවාල වූ පටකයට ඇතුළු කරයි.
- එමඟින් අතිරේක භක්ෂක සෛලතාවයක් සිදු වේ. හානි වූ පටකයේ ඇති ක්ෂුද්‍රජීවීන් හා සෛල පුන්බුන් ද ජීර්ණයට ලක් කරයි.
- ප්‍රදාහයේ සලකුණු හා රෝග ලක්ෂණ වනුයේ
 - රතු වීම
 - රුධිරවාහිනී විස්තාරණය නිසා
 - රත් වීම
 - එම ප්‍රදේශය තුළ අධික පරිවෘත්තීය නිසා තාපය නිශ්පාදනය වීම නිසා

> ඉදිම

රුධිරවාහිනිවල පාරගම්‍යතාව වැඩි වීමෙන්, පටක තරලය අසල වූ පටක තුළට කාන්දු වීම නිසා

> වේදනාවයි

නිපුරෝන හානි වීම නිසා හා ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ විෂ ද්‍රව්‍ය නිසා (බැක්ටීරියා බලකු මගින් වේදනා ජනන නිසාවේදී දැනගන්න)

- බොහෝ ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරවල ප්‍රතිඵලය ලෙස සැරව එකතු වෙයි.
- සැරව යනු මියගිය හක්ෂක සෛල, මියගිය ව්‍යාධිජනකයන් හා හානියට ලක් වූ පටකයේ සෛලීය අවශේෂවලින් පිරුණු තරලයකි.
- පූර් තුඩුලයක් හෝ ආසාදනයක් හෝ ස්ථානීය ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාර හට ගැනීමට හේතු වේ.
- එහෙත් තුඩුලය හෝ ආසාදනය හෝ දරුණු නම් සංස්ථානික ප්‍රතිචාර (දේහයේ පුරා) ලෙස උණ හට ගනී.
- යම් සීමාවක් තුළ දේහ උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිය විට හක්ෂ සෛලකර්මය (phagocytosis) වැඩිවන අතර,
- රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ද වේගවත් කරමින් කරමින් පටක අලුත්වැඩියාව ඉක්මන් කරයි.


(2) පරිචිත ප්‍රතිශක්තිය/ අනුවර්තී ප්‍රතිශක්තිය (Acquired immunity/ Adaptive immunity)

- පරිචිත ප්‍රතිශක්තිය යනු
 - > දේහයේ ඇති විවිධ T වසා සෛල හා B වසා සෛල මැදිහත් වී
 - > විශිෂ්ට ආරක්ෂණ ප්‍රතිචාර යොදා ගනිමින්,
 - > ආක්‍රමණික කාරකවලින් (ව්‍යාධිජනක වැනි) දේහය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඇති හැකියාව පරිචිත ප්‍රතිශක්තියයි.
- පරිචිත ප්‍රතිශක්තිය සතු ප්‍රධාන ලක්ෂණ කිහිපයකි
 - (1) විවිධ ආගන්තුක අණුවලට විශිෂ්ටතාව
 - (2) සත්ත්වයකුට තමාගේම අණුවලින්, තමාගේම නොවන අණු වර්ග වෙන් කර හඳුනා ගැනීම
 - (3) කලින් ව්‍යාධික දී මුණ ගැසුණු බොහෝ ව්‍යාධිජනකයන් පසුව සිදු වන මුණගැසීමක දී ප්‍රබල සහ වඩා වේගවත් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට දැක්වීමට හැකි මතකය
- එනම් ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාත්මක මතකය සැපයීම
- සත්ත්ව රාජධානියේ පරිචිත ප්‍රතිශක්ති හැකියාව ඇත්තේ පෘෂ්ඨවංශීන්ට පමණි.
- ආගන්තුක කාරකවලට එරෙහිව සක්‍රීය වූ විට පරිචිත ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකියාව ඇති සෛල වන්නේ T වසා සෛල හා B වසා සෛලයි.


- මිනිසාගේ මේ වසා සෛල දෙවර්ගය ම ඇවමිදුර තුළ පවතින මූලික සෛලවලින් (stem cells) සම්භවය ලබයි.
- ඇතැම් වසා සෛල මූලික සෛලවලින් සම්භවය වී පරිණතීය සඳහා තයිමසට සංක්‍රමණය වන අතර, ඒවා 'T වසා සෛල' (T වසා සෛල) ලෙස හඳුන්වයි. ඇවමිදුර තුළම dT සිටිමින් විකසනය සම්පූර්ණ කර ගන්නා වසා සෛල 'B වසා සෛල' (B වසා සෛල) ලෙස නම් කරයි.
- මේ වසා සෛල ද්විතීයික වසා පටක වෙත ළඟා වීමට පෙර ඒවායේ ජලාස්ම පටලයේ විශිෂ්ට ආගන්තුක ආක්‍රමණ හඳුනා ගත හැකි විවිධ වූ විශිෂ්ට ප්‍රෝටීනමය ප්‍රතිග්‍රාහක අණු සකස් කර ගනියි. මේවා ප්‍රතිදේහජනක ප්‍රතිග්‍රාහක නම් වේ. සාමාන්‍යයෙන් එක් තනි B වසා සෛලයක හෝ T වසා සෛලයක පෘෂ්ඨය මත මෙවැනි විශේෂිත ප්‍රතිදේහජනක ප්‍රතිග්‍රාහක අණු 100000කට වඩා පැවතිය හැකි ය. ප්‍රතිදේහ ජනකයන් යනු T වසා සෛල හා B වසා සෛල හරහා ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරයක් උත්තේජනය කිරීමේ හැකියාව ඇති සහ උත්තේජක ප්‍රතිචාරයේ ප්‍රතිඵලය ලෙස සෑදෙන විශිෂ්ට සෛල හෝ ප්‍රතිදේහ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ හැකි ද්‍රව්‍ය වේ. ප්‍රතිදේහජනක ලෙස
 - > සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ ප්‍රෝටීන සහ පොලිසැකරයිඩ වැනි විශාල ආගන්තුක අණු වර්ගයි.
 - > වයිරසවල ප්‍රෝටීන,
 - > බැක්ටීරියාවන්ගේ ධූලක,
 - > බැක්ටීරියා සෛල ඩික්ති හා කයිකා වැනි ව්‍යුහවල ඇති රසායනික සංඝටක
 - > නොගැළපෙන රුධිර සෛල,
 - > බද්ධ කරන ලද පටකවල ව්‍යුහ සංඝටක යනාදිය ද ප්‍රතිදේහ ජනක ලෙස ක්‍රියාත්මක විය හැකි ය.
- සාමාන්‍යයෙන් පරිචිත ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර හට ගැන්වීමට හේතු වන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිදේහ ජනකය ම නොව, විශාල ප්‍රතිදේහ ජනක අණුවල ඇතැම් කොටස් ය.
- ඒවා පරිචිත ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ක්‍රියාත්මකය සඳහා ප්‍රේරක ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- ප්‍රතිදේහ ජනකයේ ඇති කුඩා ළඟා විය හැකි ප්‍රදේශයක්, T වසා සෛල හෝ B වසා සෛල සතුව ඇති විශිෂ්ට ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහකයට සම්බන්ධ වන අතර, එම කුඩා ප්‍රදේශය එපිටෝපය (epitope) ලෙස හඳුන්වයි (උදා - විශාල ප්‍රෝටීනයක ඇති ඇමයිනෝ අම්ල කාණ්ඩය).
- සාමාන්‍යයෙන් තනි ප්‍රතිදේහ ජනකයක් සතුව එපිටෝප කිහිපයක් පවතියි. තනි T හෝ B වසා සෛලයක ඇති විශිෂ්ට ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහකයක් සමඟ එම එක් එක් එපිටෝපයකට සම්බන්ධ විය හැකි ය.

- පරිවිත පද්ධතියේ දී T වසා සෛල හා B වසා සෛල මගින් සිදු කෙරෙන ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ආකාර දෙකකි. ඒවා නම්,

- (1) දේහ කරල මාධ්‍ය වන (මැදිහත්ව සිදුවන)/ හිසුමෝරල් ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර (B මගින් රක්‍ෂණය) (Humoral immune response)
- (2) සෛල මාධ්‍ය (මැදිහත්ව සිදුවන) ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර (cell mediated immune response) (T මගින් රක්‍ෂණය)



- (1) දේහ කරල මාධ්‍යවන (මැදිහත්ව සිදු වන) ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර (Humoral immune response)




- දේහ කරල මාධ්‍ය වන හිසුමෝරල් ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර/ප්‍රතිදේහ මැදිහත් වන ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ලෙස ද හැඳින්වේ.
- දේහකරල මාධ්‍යවන ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරයේ දී විශිෂ්ටව සංවේදී කළ B වසා සෛල විශේෂ ප්‍රතිදේහ ජනකයට සම්බන්ධ වී ප්‍රගුණනයට ලක්වී ද්‍රව්‍යාංශ සෛල සෑදීම සිදුවේ (ක්ෂ ලෝහිතය ක්).
- අනතුරුව සෑදෙන ද්‍රව්‍යාංශ සෛල 'ප්ලාස්මා සෛල' (Plasma cells) බවට විභේදනය වේ.
- ඉන්පසු එම ප්ලාස්මා සෛල මගින් සංසරණය වන ප්‍රතිදේහ ස්‍රාවය කරන අතර එම ප්‍රතිදේහ, රුධිරය හා වසා සෛල තුළ ඇති විශිෂ්ට ධූලක හා ව්‍යාධිජනකයන් උදාසීන කිරීම හා අක්‍රිය කිරීම සිදු කරයි.
- මීට අමතරව 'මතක B සෛල' (memory B-cells) සෑදෙන අතර, ප්‍රතිදේහ ජනකය නැවත වතාවක් දී ආක්‍රමණය කිරීමට තැත් කළහොත් ඒවා මගින් ප්‍රබලව හා වේගවත්ව ප්‍රතිචාර දක්වයි.

- මේ ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ
 - > දේහ කරලවල සිටින ප්‍රතිදේහ ජනකයන්
 - > දේහ කරල තුළ ගුණනය වන බහිෂ්සෛලීය ව්‍යාධිජනකයන්ට (ප්‍රධාන වශයෙන් බැක්ටීරියා) එරෙහිව ය.

ප්‍රතිදේහ (Antibodies)

- ප්‍රතිදේහ, ඉම්යුනෝග්ලොබියුලින් ලෙස ද හැඳින්වේ. ප්‍රතිදේහ යනු විභේදනය වූ B වසා සෛල වන 'ප්ලාස්මා සෛල' (Plasma cells) මගින් විශිෂ්ට ප්‍රතිදේහ ජනකයට එරෙහි ස්‍රාවය කරන ප්‍රෝටීන වේ.
- එබැවින් ප්‍රතිදේහ වලට B වසා සෛලවල පවතින ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහකවලට මෙන් Y හැඩ සමාන ව්‍යුහයක් ඇති නමුත් ඒවා පටලයට බැඳී තිබෙනවාට වඩා ස්‍රාවී වේ.
- මේවා ප්‍රතිදේහජනකයට සම්බන්ධ වී එය උදාසීන කිරීම, විනාශ කිරීම හෝ නිෂේධනය කිරීම සිදු කරයි.
- මේ හරහා ප්‍රතිදේහ මගින් දේහ කරලවල සිටින ව්‍යාධිජනකයන් හෝ ඔවුන්ගේ විශේෂිත ධූලක උදාසීන කිරීම හෝ අක්‍රිය කිරීම සිදු කරයි.
- ප්‍රතිදේහ, සෘජුව ම ව්‍යාධිජනකයන් නොමරන නමුත් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා කිරීම හෝ අක්‍රිය කරමින් ඔවුන් විනාශ කිරීමට සලකුණු කිරීම සිදු කරයි.
- ප්‍රතිදේහ-ප්‍රතිදේහජනක සංකීර්ණවලට, ව්‍යාධිජනකයන් විනාශ කිරීම සඳහා, අනුපූරක පද්ධති සහ හක්සෙලිකතාවය සක්‍රිය කිරීමට හැකියාව ඇත.

- (2) සෛල මාධ්‍ය (මැදිහත්ව සිදු වන) ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර (Cell mediated immune response):



- සෛල මාධ්‍ය ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරයේ දී විශිෂ්ටව සංවේදී වූ T වසා සෛල, ප්‍රතිදේහ ජනකයට සම්බන්ධ වී ප්‍රගුණනයට ලක් වී ද්‍රව්‍යාංශ සෛල සෑදීම සිදුවේ (ක්ෂ ලෝහිතය ක්).
- අවසානයේ එම ද්‍රව්‍යාංශ සෛල 'සෛල විෂ T සෛල' (cytotoxic T-cells) බවට විභේදනය වී ආක්‍රමණික ප්‍රතිදේහ ජනක සහිත සෛල සෘජුව ම මරා දමයි.
- මීට අමතරව එම ප්‍රතිදේහ ජනකය ම නැවත වරක් දේහය ආක්‍රමණය කළ හොත් ප්‍රබලව හා වඩා

ක්ෂ රක්‍ෂණයෙන් → ස්වල්ප වශයෙන්
 → T සෛල
 → අක්‍රමණීය
 → රක්‍ෂණය



මේවා ස්වල්ප වශයෙන්
 ආක්‍රමණීය කරයි.



වේගවත්ව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකි වන පරිදි 'මතක T සෛල' (memory T-cell) ද සෑදේ.

- මෙවැනි ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ
 - > ආසාදිත සෛල (ධාරක සෛල තුළ අඩංගු දිලීර, වයිරස හා පරපෝෂිතයන්)
 - > ඇතැම් පිළිකා සෛල
 - > බද්ධ කළ ආගන්තුක සෛලවලට එරෙහිවය.
- සෛල මාධ්‍ය ප්‍රතිශක්තිය මගින් සැමවිටම, සෛලවලින් සෛලවලට පහර දේ.
- ඉහත ප්‍රතිචාර ආකාර දෙක ම ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රතිදේහ ජනකවල බලපෑමෙනි.
- මනුෂ්‍ය ම ප්‍රතිදේහ ජනකයකට, එම ප්‍රතිචාර ආකාර දෙක ම හට ගැන්වීමේ හැකියාව පැවතිය හැකිය.

පරිචිත ප්‍රතිශක්තියේ දී T වසා සෛල හා B වසා සෛලවල කාර්යභාරය

- ප්‍රධාන කාර්යභාරයන් 4කි. එනම්
 - (1) ප්‍රතිදේහ ජනකය හඳුනා ගැනීම, එය සමඟ සම්බන්ධ වීම හා සංවේදී වීම
 - (2) කාරක සෛල බවට ගුණනය හා විභේදනය
 - (3) ආක්‍රමණිකයන් ඉවත් කිරීම
 - (4) ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාත්මක මතකය සැපයීම

- (1) ප්‍රතිදේහ ජනකය හඳුනා ගැනීම, එය සමඟ සම්බන්ධ වීම හා සංවේදී වීම



- පරිචිත ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර සිදු වීම සඳහා දේහය තුළ පවතින ආගන්තුක ප්‍රතිදේහ ජනක,
- ඇතැම් T වසා සෛල හෝ B වසා සෛල මගින් ප්‍රථමයෙන් ම හඳුනා ගැනීම සිදු විය යුතුම ය.
- විවිධ T වසා සෛල හා B වසා සෛල මතුවීම එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රතිදේහජනක ප්‍රතිග්‍රාහක විශාල ගණනක් පැවතුණත්,
- ඒවායින් ඉතා කුඩා සංඛ්‍යාවක් පමණක් ප්‍රතිදේහ ජනකයේ අදාළ එපිටෝපයට විශිෂ්ට වේ.
- මේ නිසා ප්‍රතිදේහජනකය, T සෛල හෝ B සෛල මතුවීම ගැලපෙන ස්ථානය ලැබෙන තෙක් රැඳී පැවතිය යුතු වේ.
- මේ අතරතුර T වසා සෛල හා B වසා සෛල සුළු සංඛ්‍යාවක ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහකය සහ ප්‍රතිදේහ ජනකයේ එපිටෝපය අතර, සාර්ථක ගැළපීමක් ඔස්සේ ප්‍රතිදේහ ජනකය හඳුනා ගනී.
- තනි T සෛලයක හෝ B සෛලයක ඇති විශිෂ්ට ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහක සර්වසම විය හැකි බැවින් ඒවාට එක ම වර්ගයේ එපිටෝප සමඟ බැඳිය හැකි ය.
- එනිසා එක ම එපිටෝපය සහිත අණු අඩංගු ඕනෑම ව්‍යාධිජනකයකට T හා B සෛල දෙවර්ගය ම ප්‍රතිචාර දක්වයි.
- එහෙත් T හා B සෛල ප්‍රතිදේහ ජනකවලට එරෙහිව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ එකිනෙකට වෙනස් ආකාරයකින්ය.

B වසා සෛල ප්‍රතිදේහජනකයකට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය

- B වසා සෛල මගින් හඳුනා ගැනීමට හා සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ඇත්තේ රුධිර ප්ලාස්මාවේ, වසා සහ අන්තරාල තරයේ අඩංගු ප්‍රතිදේහ ජනකවලට පමණි.

T වසා සෛල ප්‍රතිදේහජනකයකට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය

- T වසා සෛල මගින් හඳුනා ගත හැක්කේ විශේෂ සෛල වන 'ප්‍රතිදේහ ජනක ඉදිරිපත් කරන සෛල' (antigen presenting cells) එනම් (APC)
 - > මහා භක්ෂාණු,
 - > ඩෙන්ඩ්‍රයිටික් සෛල,
 - > B සෛල) මගින්,

T සෛලවලට ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිදේහ ජනකීය ප්‍රෝටීන කුඩා කැබලි පමණි.

- ප්‍රතිදේහ ජනකය, T වසා සෛල හෝ B වසා සෛලවල පවතින විශිෂ්ට ප්‍රතිදේහ - ජනක ප්‍රතිග්‍රාහක සමඟ බැඳුණ විට එම වසා සෛල සංවේදීකරණය (සක්‍රිය වීම) වීම සිදුවේ
- අනතුරුව පහත ආකාරයට සෛල මාධ්‍ය ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර හෝ තරල මාධ්‍ය ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ආරම්භ කරවයි.

(2) කාරක සෛල බවට ගුණනය හා විභේදනය

- T වසා සෛල හෝ B වසා සෛල සක්‍රීය වූ විට සෛල විභාජන ගුණනාවකට (ප්‍රගුණනයට) ලක් වීමෙන් මුල් වසා සෛලයට සර්වසම ද්‍රව්‍යාංශ සෛල ගහනයක් හෙවත් ක්ලෝනයක් හට ගනියි.
- මෙම ක්ලෝනයේ පවතින ඇතැම් සෛල, කෙටි ආයු කාලයකින් යුක්ත කාරක සෛල බවට පත් වී, ප්‍රාථමික ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ක්ෂණිකව හට ගත්වයි.

(2) ආක්‍රමණිකයන් ඉවත් කිරීම


- T වසා සෛලවල කාරක ආකාර වන්නේ
 - ආධාරක T සෛල (Helper T-cells).
 - සයිටොටොක්සික් T සෛල/ සයිටොඩුලක් T සෛල (Cytotoxic T-cells)

- ආධාරක T සෛලවලින් ලැබෙන සංඥා මගින් ආසාදිත සෛල විනාශ කිරීම සඳහා සයිටොටොක්සික් T සෛල සක්‍රීය කරයි.
- එසේම ආධාරක T සෛලවල සංඥා මගින් B වසා සෛලවලින් ප්‍රතිදේහ නිපදවීම ආරම්භ කිරීම ද සක්‍රීය කරවයි.
- සයිටොටොක්සික් T සෛල මගින් ධූලක ප්‍රෝටීන භාවිතා කරමින් ව්‍යාධිජනකයින් මගින් ආසාදිත සෛල මරා දමයි.
- B සෛලවල කාරක ආකාරය ජලාස්ම සෛලයි.
- සක්‍රීය වූණු තනි B සෛලයකින් එයට සර්වසම වූ ජලාස්ම සෛල දහස් ගණනක් ඇති වේ.
- ජලාස්ම සෛල මගින් ප්‍රතිදේහ නිපදවා ප්‍රාග්‍ය කිරීම ආරම්භ කරමින් ඒවා විශාල ප්‍රමාණවලින් රුධිරයට හා වසාලට නිදහස් කරයි.
- මෙම ප්‍රතිදේහ වනුයේ ද්‍රාව්‍ය ස්වරූපයේ පවතින B වසා සෛල ප්‍රතිදේහ ජනක ප්‍රතිග්‍රාහකයයි.
- මේ සංසරණය වන ප්‍රතිදේහ මගින් දේහ තරලවල සිටින ව්‍යාධිජනකයන් හා විශිෂ්ට ධූලක උදාසීන කිරීම හා අක්‍රීය කිරීම සිදු කරයි.

(3) ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාත්මක මතකය සැපයීම

- T වසා සෛල ක්ලෝනවල පවතින සෛල, කාරක T සෛල (එනම් සයිටොටොක්සික් T සෛල හා ආධාරක T සෛල) ලෙස විභේදනය වූ පසුව ඉතිරි ඒවා 'මතක T සෛල' ලෙස දීර්ඝ කාලයක් පවතී.
- මෙම මතක සෛල එක ම ප්‍රතිදේහ ජනකය ජීවිතයේ පසු කලක හමු වූ විට කාරක T සෛල බවට පත් වෙයි.
- එසේම B වසා සෛල ක්ලෝනවල පවතින ඉතිරි B වසා සෛල 'මතක B සෛල' ලෙස දිගු කාලයක් පවතී.
- මෙම මතක සෛල එකම ප්‍රතිදේහජනකය ජීවිතයේ පසු කලක හමු වූ විට ජලාස්ම සෛල බවට පත් වීමේ හැකියාව දරයි.

- මේ 'මතක T සෛල' හා 'මතක B සෛල' එක ම ව්‍යාධිජනකයා දේහය තුළ නැවත මුණගැසුණු විටක දී ප්‍රබලව හා වඩා වේගවත්ව ප්‍රතිචාර දක්වයි.
- මේ ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාත්මක මතකය ද්විතීයික ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරය ලෙස හඳුන්වයි.



ජීවියෙකු තුළ ප්‍රතිශක්තිය හට ගැන්වෙන ආකාරය අනුව ප්‍රධාන ආකාර 2කි

- (1) සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය (active immunity)
- (2) අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය (passive immunity)

(1) සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය

- සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය යනු, ව්‍යාධිජනකයකුට එරෙහිව දේහය තුළ ක්‍රියා කරන B වසා සෛල හා T වසා සෛලන් එහි ප්‍රතිඵලය වන යම් ව්‍යාධිජනකයකුට විශිෂ්ට B හා T මතක සෛලන් මගින් හට ගත්වන දීර්ඝ කාලීනව පවත්නා ප්‍රතිශක්තියයි.
- ස්වභාවිකව සිදු වන ව්‍යාධිජනක ආසාදනයකදීත්
- කෘත්‍රීම ප්‍රතිශක්තිකරණයේදීත් සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය විකසනය වෙයි.
- සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තියේ ආකාර 2කි

(1) ස්වභාවික පරිචිත සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය (Naturally acquired active immunity)

- ස්වභාවික පරිචිත සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය යනු
 - ව්‍යාධිජනකයන්ගේ ස්වභාවික ආසාදනවලට ප්‍රතිචාර ලෙස
 - විවිධ රෝගවලට එරෙහිව දේහය තුළ විකසනය වන
 - දිගුකල් පවත්නා ප්‍රතිශක්තියයි
- ප්‍රථම වරට ස්වභාවිකව දේහයට ඇතුළු වන යම් රෝගකාරකයකුට ප්‍රතිචාර ලෙස (උදා: පැපොල වයිරසය),
- දේහය තුළ ඇති සමහර T වසා සෛල හා B වසා සෛල සක්‍රීය වී අවසානයේ
- එම ව්‍යාධිජනකයා විනාශ කිරීමට විශිෂ්ට වූ සයිටොටොක්සික් T සෛල හා ප්‍රතිදේහ නිපදවයි.
- මේ ක්‍රියාවලියේ දී සෑදෙන B හා T මතක සෛල දිගු කාලයක් ජීවත්වන අතර ජීවිතයේ පසු කලක එම ප්‍රතිදේහ ජනකයම (උදා: පැපොල වයිරසය) යළි දේහයට ඇතුළු වූ විට එම විශේෂ ප්‍රතිදේහජනකය

විනාශ කිරීම සඳහා ප්‍රබල හා ශීඝ්‍ර ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර සපයයි.

- මේ ආකාරයට එක ම ප්‍රතිදේහජනකය මගින් පසු කාලයක නැවත සිදු විය හැකි ආසාදනවලට දේහය ප්‍රතිරෝධී වේ.

(2) කෘත්‍රිම පරිචිත සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය (Artificially acquired active immunity)

- කෘත්‍රිම පරිචිත සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය යනු
 - බෙලහීන කළ (ප්‍රවණ්ඩතාව අඩු කළ) ව්‍යාධිජනකයන් එන්නත් කිරීම (ප්‍රතිශක්තිකරණය) මගින්
 - විවිධ ආසාදන රෝගවලට එරෙහිව
 - දේහය තුළ කෘත්‍රිමව ප්‍රේරණය කළ
 - දිගුකල් පවත්නා ප්‍රතිශක්තියයි.
- නසන ලද හෝ දුර්වල කළ ව්‍යාධිජනකයන්,
- අක්‍රීය කරන ලද බැක්ටීරියා සෛල,
- ක්ෂුද්‍රජීවී ප්‍රෝටීනවලට කේත සපයන ජාන වැනි බොහෝ ප්‍රභවවලින් සාදා ගත් ප්‍රතිදේහජනක (එන්නත්) මගින් ප්‍රතිශක්තිකරණය සිදු කළ හැකි ය.
- මේ එන්නත් ප්‍රතිදේහ ජනක ලෙස ක්‍රියාකර සෛල මාධ්‍ය හා ප්‍රතිදේහ මාධ්‍ය ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර උත්තේජනය කර ප්‍රතිදේහ ජනකය විනාශ කිරීමට දිගු කාලයක් ජීවත් වන B හා T මතක සෛල නිපදවීමට මග පාදයි.
- ප්‍රතිදේහ ජනකය ලබා ගත් ව්‍යාධිජනකයා, ජීවිතයේ පසු කාලයක දී යළි ස්වාභාවිකව හමු වුවහොත්, එම ව්‍යාධිජනකයා විනාශ කිරීම සඳහා වඩා ප්‍රභල හා ශීඝ්‍ර ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර දිගු ජීවිත කාල සහිත මතක සෛල මගින් ලබා දෙයි.
- සාමාන්‍යයෙන් එන්නත් තුළ භාවිතා වන ප්‍රතිදේහ ජනක, **ප්‍රතිශක්ති ජනක වන නමුත් ව්‍යාධිජනක නොවීමට** පෙර සැකසීම කර ඇත.
 - උදා: මිනිස් ක්ෂය රෝගයට එරෙහිව භාවිතා BCG එන්නත, බෙලහීන කළ ක්ෂය රෝග බැක්ටීරියා මාදිලියකින් සකසා ඇත.
 - පෝලියෝ එන්නත බෙලහීන කළ ජීවී පෝලියෝ වයිරස මාදිලියකින් සමන්විත ය. පෝලියෝ එන්නත රුධිරය තුළ දී පෝලියෝ වයිරසයට එරෙහිව ප්‍රතිදේහ නිපදවන අතර, ආසාදනයක් සිදු වූ අවස්ථාවක ස්නායු පද්ධතියට පෝලියෝ වයිරසය පැතිරීම වළක්වාලමින් පුද්ගලයා ආරක්ෂා කරයි.

(2) අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය

- **වෙනත් ජීවියෙකු විසින් නිපදවන ලද ප්‍රතිදේහ** කුඩා ජීවියෙකුගේ දේහයට ලැබීමෙන් දේහය තුළ විකසනය වන **කෙටිකාලීන** ප්‍රතිශක්තිය අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තියයි.
- මෙහි දී අදාළ ව්‍යාධිජනකයන්ගෙන් ක්ෂණිකව ආරක්ෂාව සැලසෙන නමුත්, ප්‍රතිශ්‍රාහකයාගේ T සෛල හෝ B සෛල සහභාගී නොවන බැවින් දේහයේ මතකය විකසනය නොවේ.

- එමෙන්ම බාහිරින් ලැබුණු ප්‍රතිදේහ දේහය තුළ පවතින කාක්ෂික අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය පවතියි (සති කීපයක් හෝ මාස කිහිපයක් තෙක්).
- මේ නිසා පසුකාලීනව ව්‍යාධිජනකයා දේහයට ආක්‍රමණය වුවහොත් ඒ සඳහා සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය හෝ එන්නත් ලබා ගෙන නොමැති නම් රෝගය හට ගැනීමේ අවදානමක් පවතියි.
- ප්‍රතිදේහ ස්වාභාවිකව හෝ කෘතිමව ප්‍රතිශ්‍රාහකයාට ලබාදීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කළ හැකිය.
- අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තියේ ආකාර 2කි

(1) ස්වාභාවික පරිචිත අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය (Naturally acquired passive immunity)

- කිරි බි වැඩෙන ළදරුවකු තුළ හෝ හූණයක් තුළ යම් ආසාදිත රෝගී තත්ත්ව වලට එරෙහිව මවගේ දේහය තුළ නිපදවෙන ප්‍රතිදේහ ස්වාභාවිකවම ළදරුවාගේ දේහය හෝ හූණය තුළට ඇතුළු වී කෙටි කාලීන තරල මාධ්‍ය ප්‍රතිශක්තියක් ලබා දෙයි.
- මවගේ රුධිරයෙන් හූණ රුධිරයට කළල බන්ධන හරහා ප්‍රතිදේහ ඇතුළු වීම නිසා මෙම ප්‍රතිශක්තිය හූණයට ලැබේ.
- මව් කිරි හා කොලෙස්ට්‍රෝම මගින් කිරි බි වැඩෙන ළදරුවාගේ දේහයට ප්‍රතිදේහ ඇතුළු වේ.
- මෙමගින් දරුවා කෙටිකාලීනව ආසාදිත රෝගී තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිරෝධී වේ.
- ළදරුවාගේ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාකාරී වන තුරු මෙම ප්‍රතිශක්තිය මගින් ළදරුවාට රෝගවලින් ආරක්ෂාවක් ලබා දේ.
- මෙය ස්වාභාවිකව පරිචිත අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය ලෙස හැඳින්වේ.

(2) කෘත්‍රිම පරිචිත අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය (artificially acquired passive immunity)

- වෙනත් ප්‍රභවයකින් ලබාගත් ප්‍රතිදේහ ප්‍රතිශ්‍රාහකයාගේ රුධිරයට කෘත්‍රිමව ලබා දීමෙන් ප්‍රතිශ්‍රාහකයා තුළ ප්‍රේරණය වන කාලිකාලීන ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණය කෘත්‍රිම පරිචිත අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය නම් වේ.
- මෙම නිම් ප්‍රතිදේහ සකස්කොට දෙන ආකාර නම්,
 - මිනිස් හෝ සත්ත්ව රුධිර ප්ලාස්මාව හෝ මස්තු මගින්,
 - ප්‍රතිශක්තිකරණය කරන ලද දායකයන්ගෙන්
 - ක්ලෝනීකරණය (monoclonal) කරන ලද ප්‍රතිදේහ මගින්
- හෝ ලබාගත් මානව ඉම්යුනෝග්ලොබියුලින් එන්නත් ලෙස ය.
- ආසාදකාකාරක අහඹි ලෙස දේහයට ඇතුළු වී ඇතැයි සැක කරන අවස්ථාවල දී එම ආසාදිත රෝගවලින් වැළකී සිටීමට අක්‍රීයව ප්‍රතිදේහ ලබාදීම සිදු කරයි

- හෙපටයිටිස් A වයිරසයට නිම් මානව මස්තු ප්‍රතිදේහ ලබාදීම
- නිවු (acute) ආසාදන රෝග කිහිපයක් සඳහා ප්‍රතිකාර ලෙස ද අක්‍රියව ප්‍රතිදේහ ලබාදේ
 - පිටහැස්ම රෝගය නිවු වූ අවස්ථාවලදී නිම් මානව ප්‍රතිවෛරසක් ඉම්යුනෝග්ලොබියුලින් ලබාදීම
 - විෂ සර්පයෙක් දෂට කළ අවස්ථාවලදී එම විෂවලට ප්‍රතිකාරයක් ලෙස ප්‍රති විෂ (antivenin) එනම් සර්ප විෂවලට එරෙහිව ප්‍රතිශක්තිකරණය කරන ලද අශ්වයන්ගෙන් ලබාගත් මස්තු සැකසුම්
- කෘත්‍රීම පරිවිත අක්‍රිය ප්‍රතිශක්තිය මගින් ව්‍යුත්පන්න වන ප්‍රතිශක්තිය සහිත කිහිපයක සිට මාස 4ක කාලයක් දක්වා පවතී.

අසාත්මිකතා (Allergies)

- අසාත්මිකතාවය යනු
 - බොහෝ දෙනෙකුට හානිකර නොවන දරාගත හැකි ද්‍රව්‍ය කෙරෙහි
 - සමහර පුද්ගලයන්ගේ දේහය අධික වූ ප්‍රතිචාර දැක්වීමයි
- මෙවැනි පුද්ගලයන් තුළ අධිසංවේදී ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රේරණය කරන ප්‍රතිදේහජනක ආසාත්මික කාරක ලෙස හඳුන්වයි.
- පුලබ අසාත්මික කාරක වන්නේ
 - පරාග,
 - දූවිලි,
 - ඇතැම් ආහාර ද්‍රව්‍ය (දැල්ලන්, ඉස්සන් වැනි),
 - ඇතැම් ප්‍රතිජීවක (උදා: පෙනිසිලින්),
 - මීමැස්සන් හා බමරුන්ගේ විෂ යනාදියයි.
- අසාත්මික ප්‍රතික්‍රියා සිදු වූ විට පටක හානියක් ද සිදු වෙයි.
- ~~අධිසංවේදී රෝග (Diabetic Type 1) හට ගැනීමට උත්තේජනය කරවා ප්‍රතිදේහ ජනනයට එරෙහිව විශිෂ්ට වූ ප්‍රතිදේහ සාවය කරවයි.~~ **Multiple Sclerosis**
- එවිට එක ම ආසාත්මිකකාරකය පසු කාලීනව දේහයට ඇතුළු වූ අවස්ථාවක එය අසාත්මිකකාරකයට එරෙහි විශිෂ්ට ප්‍රතිදේහ සමඟ සම්බන්ධ වී
- කුඩා සෛල ප්‍රේරණය කරවා හිස්ටාමින් හා වෙනත් ප්‍රදාහක රසායන ද්‍රව්‍ය සාවය කරවයි.
- මේ සංඥා ද්‍රව්‍ය විවිධ සෛල මත ක්‍රියා කර දර්ශීය අසාත්මික ලක්ෂණ වන
 - කිවිසුම් යෑම,
 - නාසයෙන් දියර ගැලීම,
 - ඇස්වලින් කදුළු ගැලීම,
 - පෙණහැලි දක්වා වාතය ගෙන යන නාලවල සිතිදු පේශි සංකෝචනය කිරීමෙන් හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා යනාදිය සිදු කරවයි.
- එමෙන් ම ඇතැම් අසාත්මික කාරකවලට තුන්පර කිහිපයක් නිරාවරණය වූණ විට දී හටගන්නා සිවු අසාත්මිකතා තත්ත්ව නිසා හුස්ම ගැනීම අපහසු වීමෙන්

හා රුධිර පීඩනය පහළ යෑමෙන් මරණය ද සිදු විය හැකි ය. **(රිස්ට් මාණ්ඩ් විකාර්සාය)**

ස්වයං ප්‍රතිශක්ති රෝග (Autoimmune diseases)

- සමහර පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය තම දේහයේ විශේෂ ස්වයං අණුවලට එරෙහිව සක්‍රිය වී, තමාගේම පටක ආක්‍රමණය ඇරඹීම ස්වයං ප්‍රතිශක්ති රෝගවලට මග පාදයි.
- එම රෝගය සඳහා හේතු විය හැක්කේ ප්‍රවේණික සාධක, ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය සහ හඳුනා නොගත් පාරිසරික ක්‍රියාකාරීතා දැ විය හැකි ය.
- බොහෝ ස්වයං ප්‍රතිශක්ති රෝග පුරුෂයන්ට වඩා ස්ත්‍රීන්ට බලපායි.
- විවිධ වූ යන්ත්‍රණ මගින් වෙනස් ස්වයං ප්‍රතිශක්ති රෝග නිපදවයි.
- ඇතැම් දේහ අණුවල සාමාන්‍ය කාර්යයන්ට බලපෑම් කරන ස්වයං ප්‍රතිදේහ නිෂ්පාදනයට සමහර යන්ත්‍රණ සහභාගී වේ.
- සමහර යන්ත්‍රණ මගින් සසිටොටොක්සික T සෛල සක්‍රියකරණය නිසා ඇතැම් දේහ සෛල විනාශ කරයි.
- ස්වයං ප්‍රතිශක්තිකරණය රෝගවලට උදාහරණ ලෙස

මවුමේහය-1

T සෛල මගින් ඉන්සියුලින් නිපදවන අග්නාසායක බීටා සෛල ආක්‍රමණය කරයි.

රුමැටිස් ආකරයිටිස්

ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය වැරදි ලෙස සත්ව ආස්තරණයට ප්‍රතිදේහ යවයි. එවා මගින් සත්ව ආස්තරණය ආක්‍රමණයට ලක් වීමෙන් කාටිලේජවල හා අස්ථිවල වේදනාකාරී ප්‍රදාහ ඇති වේ.

බහු ජාරධ්‍ය

T සෛල, නියුරෝන වටා ඇති මයලින් කොපුට ආක්‍රමණය කරයි.

ප්‍රතිශක්ති උෘතතා රෝග

- ප්‍රතිශක්ති උෘතතා රෝග යනු
 - ප්‍රතිදේහ ජනකවලට එරෙහිව
 - ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම හෝ
 - ප්‍රතිචාර අඩාල වීම නිසා හට ගන්නා ආබාධ-වේ
- නිතර නිතර ආසාදනවලට ලක් වීමට සහ ඇතැම් පිළිකා තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වීම වැඩි වීමට ප්‍රතිශක්තික හීන වීම මගපාදයි
- සහජ ප්‍රතිශක්ති උෘතතාවය ඇතිවන්නේ ප්‍රවේණිකව හෝ විකසන දෝෂ නිසා
- ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියේ සෛල නිෂ්පාදනයේ හෝ
- ප්‍රතිදේහ වැනි විශේෂිත ප්‍රෝටීන හෝ
- අනුපූරක පද්ධතියේ ප්‍රෝටීන විකසනයේ දුර්වලතා හේතුවෙනි.

- පරිවිත ප්‍රතිශක්ති හිත වීම ජීවියෙකුගේ පසුකාලීනව හට ගන්නා තත්ත්වයක් වන අතර,
- ඇතැම් රසායනික ද්‍රව්‍යවලට හෝ ජෛවීය විද්‍යාත්මක කාරකවලට නිරාවරණය වීම නිසා සිදු විය හැකි ය.
- ස්වයං ප්‍රතිශක්ති රෝගවලට එරෙහිව හෝ බද්ධ කරන ලද අවයව ප්‍රතික්ෂේප වීම වැළැක්වීමට භාවිත කරන ඖෂධ නිසා ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය යටපත් වී ප්‍රතිශක්ති උෞෂ්‍ය තත්ත්වය හට ගත හැකි ය.
- පරිවිත ප්‍රතිශක්ති උෞෂ්‍ය සහලක්ෂණ (AIDS) නැමැති රෝගය ඇති කරනු ලබන ව්‍යාධිජනකයා වන්නේ මානව ප්‍රතිශක්ති උෞෂ්‍ය වසිරසය (HIV) වන අතර එය මානව ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය මගහැර, එම පද්ධතිය ආක්‍රමණය කරයි. (T මහ රෙණුක මරණි මිම)
- HIV මගින් මිනිසාගේ ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ක්‍රමයෙන් අඩාල කරවන නිසා එම පුද්ගලයා නිතර ආසාදනවලට ලක් වීමෙන් හා ඇතැම් පිළිකා හට ගැනීමට ඇති ඉඩ ප්‍රස්තාව වැඩි වීමෙන් මරණයට පත් වෙයි.

ආස්‍රැති විධානය හා බහිස්සාවය

- ආස්‍රැති විධානය යනු
 - > ජීවියෙකුගේ දේහය තුළ ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණය හා
 - > ජල තුළ තාවකාලිකව පවතින ක්‍රියාවලියයි
- Amoeba, Paramecium වැනි සරල ජීවීන්ගේ ජීවිත ආස්‍රැති විධානය සඳහා සංකෝචක රික්තක භාවිතා කරති.
- එහෙත් සතුන්ට ආස්‍රැති විධානය සඳහා විවිධ ව්‍යුහ විකල්පයන් වී ඇත.
- ජීවී දේහ තුළ සිදු වන රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ප්‍රතිඵල ලෙස හට ගන්නා අපද්‍රව්‍ය බොහෝ විට විෂ සහිත බැවින් ඒවා කිසියම් ලෙසකට දේහයෙන් බැහැර කළ යුතු ම ය.
- බහිස්සාවය යනු
 - > නයිට්‍රජන් පරිවෘත්තීය අපද්‍රව්‍ය හා
 - > වෙනත් පරිවෘත්තීය අපද්‍රව්‍ය දේහයෙන් බැහැර කිරීමයි
- ආහාර මාර්ගයේ දී ජීරණය නොවූණ දෑ පහ කිරීම බහිස්සාවය ලෙස සලකනු නොලබයි. (ඒවා පරිවෘත්තීය අපද්‍රව්‍ය නොවන නිසා)
- බොහෝ සතුන්ගේ ආස්‍රැති විධානයට හා බහිස්සාවයට අදාළ පද්ධති ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ලෙස සම්බන්ධිත ය.

ආස්‍රැති විධානය හා බහිස්සාවයේ අවශ්‍යතාව හා වැදගත්කම


- සතුන්ගේ පැවැත්මටත්, කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරීත්වයටත් දේහ අභ්‍යන්තර පරිසරය නියතව පවත්වා ගත යුතු ය.
- විශේෂයෙන් ම ජලය හා විවිධ ද්‍රාව්‍යයන්ගේ සාපේක්ෂ සාන්ද්‍රණ හිතකර සීමා තුළ පවත්වා ගත යුතු ය.
- මේ නිසා සතුන්ගේ දේහ තරල වක්‍රීරසායනික සංයුතිය යාමනය කර ගැනීමට ජලය හා ද්‍රව්‍ය දේහයට ලබා

ගැනීමත්, ඒවා දේහයෙන් බැහැර කිරීමත් තුළනය කිරීම අවශ්‍ය වෙයි.

- වැඩිපුර ජලය ඇතුළු වීමෙන් සත්ත්ව සෛල ඉදිමීමට හා පුපුරා යාමට ලක් වෙයි.
- එමෙන් ම වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් සෛලයෙන් හානි වුව හොත් සත්ත්ව සෛල හානිමීමට ලක්වී අවසානයේ මිය යයි.
- ශාක සෛලවල මෙන්ම සත්ත්ව සෛලවලත් ජල හානිය මෙහෙයවන බලය සැපයෙන්නේ සෛල පටලය හරහා ඇති ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණය මගිනි.
- සතුන්ට නොනැසී පැවැත්ම උදෙසා ඔවුන්ට ජීවත් වන පරිසරය මත රඳා පවතින විවිධ ආස්‍රැති විධාන උපක්‍රම පරිණාමය වී ඇත.
- සතුන්ගේ දේහ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සංයුතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම උදෙසා පරිවෘත්තීය දී නිපදවෙන විෂ සහිත ඵල බැහැර කළ යුතු ය.
- එසේ නොවූණ හොත් එම බහිස්සාවේ අන්ත ඵල දේහ සෛලවලට විෂ වේ.
- උදා: දේහ සෛල තුළ පරිවෘත්තීය දී ප්‍රෝටීන හා න්‍යෂ්ටික ධූමිල බිඳවැටී සෑදෙන ඇමයික් කාණ්ඩය සිරුරට අධික විෂ සහිත ඇමෝනියා බවට පරිවර්තනය වෙයි.
- එය දුබල භස්මයක් ලෙස ද ක්‍රියා කරයි.
- එමෙන් ම ශ්ලෂ්මස් පරිවෘත්තීය දී ඔක්සිකරණය වී CO₂ නිදහස් වේ.
- මෙම CO₂ මගින් දුබල අම්ලයක් සෑදේ. $HCO_3^- + H^+$
- මේ දුබල අම්ල හා භස්ම දේහ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඒකරාශී වීමෙන් අම්ල-භස්ම තුළාතාව වෙනස් වෙයි.
- අම්ල-භස්ම තුළාතාව වෙනස් වූ විට ප්‍රෝටීන දුස්වාභාවීකරණය වැනි අයහපත් බලපෑම් ඇති වේ.
- මේ නිසා පැවැත්මට සහ කාර්යක්ෂම දේහ ක්‍රියාකාරීත්වයක් සඳහා දේහ අභ්‍යන්තර පරිසරය හිතකර සීමා තුළ පවත්වා ගැනීම උදෙසා පරිවෘත්තීය අපද්‍රව්‍ය දේහයෙන් බැහැර කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ද ශ්ලෂ්ම ධූමිල නිදහස් වීම පරිවෘත්තීය උපස්කර හා බහිස්සාවේ ඵල අතර ඇති සබඳතාව

- සෛල තුළ පරිවෘත්තීයයට ලක් කරන උපස්කර වන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්, මේදය, ප්‍රෝටීන හා න්‍යෂ්ටික අම්ලයි.
- මේ උපස්කරවලින් නිපදවෙන බහිස්සාවේ ඵල විවිධ සාධක මත රඳා පවතී.



NH₃ විෂ දෑයකු බව මධ්‍ය ජෛව විද්‍යා පද්ධතියට කෙළින්ම බලපෑම.

භාජන ආහාර ↑ - ජල විභවය ↓

- එනම් බහිෂ්ටාචාරයක් වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන්, එන්සයිමවල සුලබතාව, ඔක්සිජන් සුලබතාව හා සතුන් ජීවත් වන වාසස්ථානය ආදියයි.
- O₂ පවතින විට දේහ සෛල තුළ කාබොහයිඩ්‍රේට් පරිවෘත්තියෙන් බහිෂ්ටාචාරයන් එල ලෙස CO₂ හා ජලය නිපදවෙයි.
- කාබොහයිඩ්‍රේට් නිර්මාණය වීම සහ සාමාන්‍යයෙන් නිපදවෙන්නේ ලැක්ටික් අම්ලයයි.
- මේදය ස්වායු ලෙස පරිවෘත්තියට ලක් කිරීමෙන් අවසාන බහිෂ්ටාචාරය ලෙස CO₂ හා ජලය නිපදවෙයි.
- ප්‍රෝටීනවල ව්‍යුහය තුළ ඇමයින කාණ්ඩයක් පවතින බැවින් අතිරික්ත ඇමයිනෝ අම්ල පරිවෘත්තියෙන් ඇමෝනියා නිපදවෙයි. න්‍යෂ්ටික අම්ල පරිවෘත්තියේ දී ඒවායේ නයිට්‍රජන් හස්ම අඩංගු බැවින් ඇමෝනියා නිපදවෙයි.
- සතුන් ජීවත් වන වාසස්ථානය, හා එන්සයිමවල පැවැත්ම, අනුව මේ ඇමෝනියා යුරියා හෝ යුරික් අම්ලය වැනි වෙනත් නයිට්‍රජන් බහිෂ්ටාචාරය එල බවට පරිවර්තනය වෙයි.

සතුන් ජීවත් වන පරිසරය හා නයිට්‍රජන් බහිෂ්ටාචාරය ද්‍රව්‍ය අතර ඇති සබඳතාව

- සතුන්ගේ නයිට්‍රජන් බහිෂ්ටාචාරය එලයන් වනුයේ ඇමෝනියා, යුරියා හා යුරික් අම්ලයයි.
- මේ වෙනස් අතර, විෂ සහිත ස්වභාවය හා නිපදවීමට වැය වන ශක්තිය මත සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වෙයි.
- ඇමෝනියා ඉතා විෂ ද්‍රව්‍යයකි.
- ඒවා බැහැර කිරීමට දේහයෙන් විශාල ජලය පරිමාවක් වැය කළ යුතුය.
- එහෙත් ඇමෝනියා නිපදවීමට වැය වන්නේ සාපේක්ෂව අඩු ශක්ති ප්‍රමාණයකි.
- මේ නිසා පහසුවෙන් ද්‍රව්‍ය පිට කළ හැකි ජලය තුළ ජීවත් වන ජීවීන්ගේ නයිට්‍රජන් බහිෂ්ටාචාරය එලය ඇමෝනියා ය.
- එනම් අස්ථික මත්ස්‍යයෝ, බොහෝ ජලජ අපෘෂ්ටවංශීහු, ජලජ උභය ජීවීහු (විශේෂයෙන් ඉස්කේටියෝ) ආදීහුය. **(කිටි ඉවැය ආව)**
- එහෙත් භෞමිකවාසී සතුන්ට ප්‍රධාන බහිෂ්ටාචාරය එලය ලෙස ඇමෝනියා බැහැර කිරීමට කරමි ප්‍රමාණවත් ජලය ලබා ගත නොහැකි ය. **(උභය ජීවීන්)**
- ක්ෂීරපායීන් හා සුහුඹුල් ඇමිබියාවන් වැනි භෞමික සත්තු ප්‍රධාන නයිට්‍රජන් බහිෂ්ටාචාරය එලය ලෙස යුරියා බහිෂ්ටාචාරය කරති.
- යුරියා විෂ බවින් අඩු ය.
- එහෙත් සතුන්ට ඇමෝනියාවලින් යුරියා නිපදවීමට වැඩි ශක්තියක් වැය කළ යුතු ය.
- මෝරා වැනි ඇතැම් කරදිය මත්ස්‍යයෝ ද ප්‍රධාන නයිට්‍රජන් එලය ලෙස යුරියා බහිෂ්ටාචාරය කරති (මෙම යුරියා ආසුනි විධානය සඳහා භාවිතා වේ).

(කොන්ක්‍රීට් ගෙස්)

- පක්ෂීන්, බොහෝ උරගයන්, භෞමික ගොරොච්චලන් සහ භෞමිකවාසී කෘමීන් වැන්නන්ගේ ප්‍රධාන නයිට්‍රජන් බහිෂ්ටාචාරය එලය යුරික් අම්ලය යි.
- යුරික් අම්ලය සාපේක්ෂව විෂ රහිත ය, සාමාන්‍යයෙන් ජල අද්‍රාව්‍ය ය, මේ නිසා ජලය ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් සමඟ අර්ධ සහ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස බැහැර කරයි.
- එහෙත් ඇමෝනියාවලින් යුරික් අම්ලය නිපදවීම සඳහා යුරියා නිපදවීමටත් වඩා වැඩි ශක්ති ප්‍රමාණයක් වැය කළ යුතු ය.

සතුන්ගේ බහිෂ්ටාචාර ව්‍යුහවල විවිධත්වය (සියුම් ව්‍යුහය අවශ්‍ය නැත)

- දේහ පෘෂ්ඨය:**
ඇතැම් සතුන්ගේ දේහ සෛල සෘජුවම බාහිර පරිසරය සමඟ ගැටෙයි. එනිසා බහිෂ්ටාචාර ද්‍රව්‍ය විසරණය මගින් බැහැර කරයි. උදා: නිඩාරියාවෝ
- සිර සෛල (Flame cells):** **ශ්‍රාක් වාණික්‍ය**
විශේෂණය වූ පක්ෂ්මධර බහිෂ්ටාචාර සෛල වන මේවා, සත්වයාගේ ශරීරය තුළ පවතින නාලිකා ජාලයක් හා සම්බන්ධිත ය. එම නාලිකා සත්ත්වයාගේ බාහිරට විවෘත වෙයි. උදා: පැතලි පත්‍රවත් **ඡලා විහරා ලේඛක**
- වෘක්කිකා (Nephridia)**
බහු සෛලික නාලාකාර ව්‍යුහයන් ය. නාලයේ එක් අන්තයක් සිලෝමයටත් අනෙක් අන්තය බාහිරටත් විවෘතය. උදා: ඇනලිඩාවෝ **කොලොමානි**
- මැල්පිගීය නාලිකා (Malpighian Tubules)** **බී**
පැතිරුණු, අන්ධව අවසන් වන අන්තයක් සහිත රුධිර වසා තුළ ගිලුණු, ජීරණ මාර්ගයට විවෘත වූණු නාලිකාවකි. උදා: කෘමීහු හා අනෙකුත් භෞමික ආත්‍රපෝඩාවෝ
- හරිත ග්‍රන්ථි/ ස්පර්ශක ග්‍රන්ථි (Green glands/ Antennal glands)**
හිසෙහි උදරියව හා අන්තස්‍රෝතයට පූර්වව පිහිටන විශාල ග්‍රන්ථි දෙකකි. උදා: කුස්ටේෂියාවෝ **(මැණික)**
(නොනිකුක් නිග්න දිය ගාම.)
- ස්වේද ග්‍රන්ථි (sweat gland)**
දහර ගැසුණු නාලාකාර ග්‍රන්ථි වන මේවා හමේ වර්මය තුළ පිහිටමින් ස්වේද ප්‍රතිලාප හරහා සම මතුපිටට පිදුයකින් විවෘත වෙයි. උදා: මිනිස් සම
- ලවණ ග්‍රන්ථි (Salt glands)**
අතිරේක ලවණ බැහැර කිරීමට හැඩගැසුණු ඇස් ආසන්නයේ පිහිටන ග්‍රන්ථි යුගලකි. **මොලේ නිග්න**
උදා: කරදිය පක්ෂීහු හා කරදිය උරගයෝ **දික**
- වෘක්ක (Kidney)**
සියලුම පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ ප්‍රධාන බහිෂ්ටාචාර හා ආසුනි විධාන අවයවයයි.

බාහිර භෞමික ආවරණය - **ශ්‍රාක් වාණික්‍ය** - **කිසි වෙලාවේ**
බහු සිර **(බාහිර ශ්‍රාක් වාණික්‍ය)**

ඉහළ ස්ථරයේ වඩා ආශ්වාදයක් වේ. ඉහළ මාර්ගය බෙදා හරිනු ලබයි.

(9) මානව මොහු පද්ධතිය


වෘක්ක යුගල, මුත්‍රවාහිනී යුගල, මුත්‍රාශය හා මුත්‍ර මාර්ගය යන කොටස්වලින් මානව මුත්‍රවාහිනී පද්ධතිය සමන්විතය. ඒවායේ ප්‍රධානතම කෘත්‍ය පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

කොටස	ප්‍රධාන කෘත්‍ය
වෘක්ක	ආස්‍රාදික තුළරතාව හා අම්ල හස්ම සමතුලිතතාව පවත්වා ගනිමින් අපද්‍රව්‍ය බහිෂ්චය කිරීමට මුත්‍ර නිපදවීම
මුත්‍රවාහිනිය	වෘක්කවලින් මුත්‍ර ලබාගෙන මුත්‍රාශයට යැවීම
මුත්‍රාශය	මුත්‍ර කාවකාලිකව ගබඩා කිරීම
මුත්‍රමාර්ගය	මුත්‍රාශය තුළ ගබඩා කර තිබූ මුත්‍ර දෙහයෙන් පිට වන මාර්ගයක් සැපයීම

වෘක්කවල පිහිටීම බෞද්ධ ධර්ම භාෂාවෙන් දැක්වේ. සුගතයාගේ ජීවයේ වැදගත්කම.

- වෘක්ක දෙක අපර උදර බිත්තිය මත,
- කශේරුවට දෙපසින්,
- ප්‍රති උදරවස්ථයේ හා
- මහා පාචරයට පහළින් පිහිටයි.
- දකුණු වෘක්කය වම් වෘක්කයට වඩා මදක් පහළින් වනසේ පිහිටා ඇත.

ඉහළ මාර්ගයේ පිහිටීම




රුධිර සැපයුම

- මහා ධමනියේ රුධිරය වෘක්කය ධමනි හරහා වෘක්ක තුළට සැපයෙන අතර,
- වෘක්කය ශිරා මස්සේ වෘක්කවලින් බැහැරවන රුධිරය අධර මහ ශිරාවට ගලා යයි.

වෘක්කයේ දළ ව්‍යුහය

- බෞවි බීජ හැඩැති අවයවයක් වන මෙය මේද ස්කන්ධයෙන් මඟින් නියමිත ස්ථානයේ රඳවා ඇත.
- තන්තුමය සම්බන්ධක පටකයෙන් වෘක්ක යුගල ආවරණය වී ඇත.

- වෘක්කයක දික්කඩක පවතින ප්‍රදේශ 3ක් පියවි ඇසින් හඳුනාගත හැකිය. ඒවා නම්
 - බාහිර තන්තුමය ප්‍රාවරය
 - වෘක්ක බාහිකය හා
 - අභ්‍යන්තර වෘක්ක මජ්ජාව යි.




- බාහිකය හා මජ්ජාව ප්‍රදේශවල රුධිරවාහිනී හා තදින් ඇසිරී ඇති බහිස්ප්‍රාචි නාලිකා පවතියි.
- වෘක්කයේ බාහිකය ගුවිජකා පිහිටන නිසා කණිකාමය ස්වරූපයක් ගෙන ඇත.
- මජ්ජාව වෘක්ක පිරමිඩවලින් සමන්විත බැවින් විලිඛිත ස්වභාවයකින් යුක්තය.
- පිරමිඩවල අග්‍රස්ථ, වෘක්ක පිටිකා තුළින් වෘක්ක ශ්‍රෝණිය වෙතට යොමු වී ඇත.
- වෘක්ක ශ්‍රෝණිය ප්‍රදේශයෙන් මුත්‍රා වාහිනිය ආරම්භ වෙයි.
- වෘක්කය ධමනිය හා වෘක්කය ශිරාව ශ්‍රෝණිය තුළින් ගමන් කරයි.

වෘක්කාණුවක ව්‍යුහය : ආනල ජීවිතයේ වැදගත්කම

- වෘක්කයක ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය වෘක්කාණුවයි. එක් එක් වෘක්කයක වෘක්කාණු මිලියනයකට අධික සංඛ්‍යාවක් ඇත. වෘක්කාණු ආකාර දෙකකි. එනම්
 - බාහික වෘක්කාණු - මජ්ජාවේ කෙටි දුරකට ගමන් කරයි.
 - ජ්‍යෙෂ්ඨ මජ්ජාමය වෘක්කාණු - මජ්ජාවේ ගැඹුරට ම විහිදෙයි.


කාශේරුව



- වෘක්කයක වැඩිපුර පිහිටා ඇත්තේ බාහික වෘක්කාණුය.
- එක් වෘක්කාණුවක් තනි දිගු නාලිකාවකින් සමන්විතය.
- දිගු නාලිකාවේ ඇති කෝප්ප හැඩැති සංවෘත කෙළවර බෝමන් ප්‍රාවරය ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, එමඟින් රුධිර කේශනාලිකා ගලියකින් සෑදී ඇති ගුවිජකාව වට කරනු ලැබේ.
- මේ නාලයේ අනෙක් කෙළවර සංග්‍රාහක ප්‍රනාලයට සම්බන්ධ වෙයි.
- මෙම දිගු නාලිකාව සමන්විත වනුයේ, බෝමන් ප්‍රාවරය, අවිදුර සංවලිත නාලිකාව, තේන්ලේ පුඩුව හා විදුර සංවලිත නාලිකාවෙනි.

බෝමන් ප්‍රාචරය/ ගුවර්කා ප්‍රාචරය

- වෘක්කාණුවේ නාලාකාර ව්‍යුහයේ පිහිටන ප්‍රසාරිත, සංවෘත කොටසයි.
- කෝප්ප හැඩැති අතර, බිත්ති දෙකකින් සමන්විත ව්‍යුහයකි. මෙහි ඇතුළු බිත්තිය පෙරිම සඳහා විශේෂණය වූ පැතලි අපිච්ඡද සෛල තනි ස්තරයකින් සමන්විත ය.
- බෝමන් ප්‍රාචරයේ පිටත ස්තරය සරල ගල්කමය අපිච්ඡදයෙන් සැදී ඇත.
- එම ඇතුළු හා පිටත ස්තර දෙක අතර, ඇති අවකාශය ගුවර්කා පෙරනය, ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
- එය ප්‍රාචර අවකාශයයි.
- ඉන් පසු ගුවර්කා පෙරනය, නාලිකාවේ ප්‍රධාන නාලාකාර ප්‍රදේශ තුන වන අවිදුර සංවලිත නාලිකාව, හෙන්ලේ පුඬුව හා විදුර සංවලිත නාලිකාව පසු කරමින් ගමන් කරයි.



ගුවර්කාව




Figure 42.9 The glomerulus and glomerular capsule.

- බෝමන් ප්‍රාචරය මගින් වට කරනු ලබන, රුධිර කේශනාලිකා බෝලය ගුවර්කාවයි.
- වෘක්කාණුවට රුධිරය සපයන රුධිර නාලිකාව අභිවාහි ධමනිකාව ලෙසත්, ඉන් පිටතට ගමන් කරන රුධිර වාහිනිය අපවාහි ධමනිකාව ලෙසත් හැඳින්වේ.
- අපවාහි ධමනිකාවේ විෂකම්භය, අභිවාහි ධමනිකාවේ විෂකම්භයට වඩා අඩු ය.
- මේ විකරණය මගින් ගුවර්කාවේ අති පරිපූර්ණයට අවශ්‍ය පරිදි රුධිර පීඩනය ඉහළ නැංවීමට වැදගත් වෙයි. ගුවර්කාවෙන් පිටතට යන අපවාහි ධමනිකාව කේශනාලිකා ජාල දෙකක් ගොඩනංවයි.
 - පරිනාලාකාර කේශනාලිකා ජාලය - අවිදුර හා විදුර සංවලිත වට කරයි.
 - වාසා රෙක්ටා - මජ්ජා දෙසට යොමු වෙමින් හෙන්ලේ පුඬුව වට කරයි.

අවිදුර සංවලිත නාලිකාව (Proximal convoluted tube)

- විදුර සංවලිත නාලිකාවට සාපේක්ෂව දිගින් හා පළලින් වැඩිය.
- ගුවර්කා පෙරනයේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය (පෝෂක අයන හා ජලය) වර්ණීය ප්‍රතිශෝෂණයට විශේෂණය වී ඇති සරල අපිච්ඡදයෙන් ආස්තරණය වී ඇත.

හෙන්ලේ පුඬුව (Loop of Henle)

- වෘක්කාණුවේ "U" හැඩැති කොටස වන මෙය සරල අපිච්ඡදයකින් ආස්තරණය වී ඇත.
- එය අවරෝහන බාහුව හා ආරෝහන බාහුවකින් සමන්විතය.
- අවරෝහණ බාහුවේ ආස්තරණය ජලයේ නිදහස් චලනයන්ට අවකාශය සලසමින් ජල ප්‍රතිශෝෂණයට විශේෂණය වී ඇත.
- නමුත් ආරෝහණ බාහුවේ ආස්තරණය ජලයට අපාරග්‍යය යි.


විදුර සංවලිත නාලිකාව (Distal convoluted tube)

- මෙය විශේෂිත අයන වර්ග හා ජලයේ වර්ණීය ප්‍රතිශෝෂණය සිදුකල හැකිවන පරිදි විශේෂණය වූ සරල අපිච්ඡදයකින් ආස්තරණය වී ඇත. මෙය සංග්‍රාහක ප්‍රනාලයකට සම්බන්ධ වෙයි.

මුත්‍ර සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය

මුත්‍ර සෑදීමේ ක්‍රියාවලියට අයත් ප්‍රධාන පියවර 3කි.

- (1) අතිපරිපූර්ණය (Ultrafiltration)
- (2) වර්ණීය ප්‍රතිශෝෂණය (Selective reabsorption)
- (3) ප්‍රාවය (secretion)



A Figure 44.13 The nephron and collecting duct: regional functions of the transport epithelia. The numbered regions in this diagram are listed in the correct numbers in the text according to kidney function.

(1) අතිපරිපූර්ණය

- අධික පීඩනයක් යටතේ බෝමන් ප්‍රාචරයේ තුනරය තුළට රුධිරය පෙරි ෆ්‍රෑම් අතිපරිපූර්ණයයි.
- ගුවර්කා කේශනාලිකා බිත්ති තුළින් හා බෝමන් ප්‍රාචරයේ ඇතුළු බිත්තිය තරහා මේ පෙරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙයි.

ආරම්භක ආකෘතිමය වැටුප්
 සහ පර්යේෂණ කාර්යයන්

- ගුවිෂ්කා රුධිර කේශනාලිකා සිදුරු සහිත වන අතර, බෝමන් ප්‍රාවරයේ ඇතුළු ආස්තරණයේ සෛල බිත්තිය කුඩා ප්‍රමාණයේ අණු හා අයන වර්ග පෙරීම සඳහා විශේෂණය වී ඇත.
- මේ විශේෂණය වීම මඟින් ජලය හා කුඩා ද්‍රාව්‍ය අණු වර්ගවලට රුධිර කේශනාලිකා බිත්ති හරහා බෝමන් ප්‍රාවරය තුළට ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
- නමුත් රුධිර සෛල, පට්ටිකා හා ජලාස්ම ප්‍රෝටීන වැනි විශාල අණුවලට මේ හරහා බෝමන් ප්‍රාවරය තුළට ගමන් කළ නොහැකි ය.
- බෝමන් ප්‍රාවරය තුළ ඇති ගුවිෂ්කා පෙරනයේ ජලය, අයන, ඇම්යිනෝ අම්ල, ග්ලුකෝස්, වීටමින්, නයිට්‍රජන් සහ අපද්‍රව්‍ය හා වෙනත් කුඩා අණු වර්ග අන්තර්ගත ය. ගුවිෂ්කා පෙරනයේ සංයුතිය රුධිර ජලාස්මාවේ සංයුතියට සමාන නමුත්, එහි ජලාස්ම ප්‍රෝටීන, රුධිර සෛල වර්ග හා පට්ටිකා අඩංගු නැත.

(2) වර්ණය ප්‍රතිශෝෂණය

- ප්‍රයෝජනවත් අණු වර්ග, අයන වර්ග හා ජලය ගුවිෂ්කා පෙරනයේ සිට යළිත් අන්තරාල තරලයටත්, එහි සිට නාලිකාවල රුධිර කේශනාලිකා ජාලය තුළටත් නැවත ඇතුළු කර ගැනීම වර්ණය ප්‍රතිශෝෂණයයි.
- ගුවිෂ්කා පෙරනයේ වැඩි කොටසක් ම ප්‍රතිශෝෂණයට ලක් වනුයේ සංවලිත නාලිකා හරහාය.
- අයන වර්ග (Cl^- , Na^+), ජලය හා වැදගත් පෝෂක (උදා. ග්ලුකෝස්, ඇම්යිනෝ අම්ල) සක්‍රීය හෝ අක්‍රීය පරිවහනය මඟින් ආරම්භක පෙරනයේ සිට ප්‍රතිශෝෂණය කර ගනියි.

(3) ස්‍රාවය

- ආගන්තුක ද්‍රව්‍ය හා දේහයට අවශ්‍ය නොවන අපද්‍රව්‍ය වැනි දෑ අන්තරාල තරලයේ හා පරිනාලාකාර කේශනාලිකා ජාලයේ සිට පෙරනයට ඇතුළු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ස්‍රාවය ලෙස හඳුන්වයි.
- ගුවිෂ්කාව තුළ රුධිර සිටින්නේ කෙටි කාලසීමාවක් බැවින් ඇතැම් ද්‍රව්‍ය මුළුමනින් ම පෙරීමට ලක් නොවෙයි.
- මේ නිසා ස්‍රාවය අවශ්‍යය ම ක්‍රියාවලියකි.
- මෙසේ පෙරනයට ස්‍රාවය කරනු ලබන ද්‍රව්‍යයන් වන්නේ H^+ , NH_3 , ක්‍රියාත්මකයන්, මාෂධ වර්ග (පෙතිසිලින් ඇස්ප්‍රින් වැනි) හා අතිරික්ත K^+ , අයන යනාදිය යි.
- H^+ හා NH_3 වල නාලිකා ස්‍රාවය රුධිරයේ සාමාන්‍ය pH අගය පවත්වා ගැනීමට වැදගත් ය.
- මෙය සිදු වන්නේ මුත්‍රවල NH_4^+ සෑදීමෙනි.
- මෙහි දී NH_3 , H^+ සමඟ සම්බන්ධ වී NH_4^+ සාදයි.
- අවිදුර හා විදුර සංවලිත නාලිකා තුළදී ස්‍රාවය සිදුවෙයි.
- ස්‍රාවය කරන ද්‍රව්‍ය සහ/හෝ ස්ථානය මත එම ස්‍රාවය සක්‍රීය ද අක්‍රීය ද යන්න රඳා පවතියි.
- අතිපරිස්‍රාවණ ක්‍රියාවලිය නිසා බෝමන් ප්‍රාවරය තුළ ඇති ගුවිෂ්කා පෙරනයේ රුධිර සෛල, පට්ටිකා හා ජලාස්ම ප්‍රෝටීන වැනි විශාල අණු රහිත, රුධිරයේ ඇති අනෙකුත් සියලුම සංඝටක අඩංගු ය.

- මේ පෙරනය බෝමන් ප්‍රාවරයේ සිට අවිදුර සංවලිත නාලිකාවට ගමන් කරයි. මෙහි දී වර්ණය ප්‍රතිශෝෂණය මඟින් අයන (Cl^- , Na^+), ජලය හා විටිනා පෝෂක (උදා. ග්ලුකෝස්, ඇම්යිනෝ අම්ල) ආරම්භක පෙරනයේ සිට නැවත රුධිරයට ඇතුළු කර ගැනීම සිදුවෙයි.
- ග්ලුකෝස්, ඇම්යිනෝ අම්ල වැනි පෝෂක අන්තරාල තරලයට සක්‍රීයව ඇතුළු කර ගනියි.
- අවිදුර සංවලිත නාලිකා ආස්තරණයේ ඇති සෛල මඟින් සක්‍රීයව Na^+ අන්තරාල තරලය තුළට ඇතුළු කරයි.
- ධන ආරෝපණ නාලිකාවෙන් පිට වීම සමඟ, අන්තරාල තරලයට Cl^- අයන ද අක්‍රීය පරිවහනය වේ.
- එමෙන් ම අවිදුර සංවලිත නාලිකාවේ දී K^+ හා HCO_3^- බොහොමයක් අක්‍රීය පරිවහනය මඟින් ප්‍රතිශෝෂණය කරයි.
- පෙරනයෙන් HCO_3^- ප්‍රතිශෝෂණය වීම මඟින් දේහතරලවල pH කුළුණාව පවත්වා ගැනීමට දායක වේ.
- පෙරනයේ සිට අන්තරාල තරලයට ද්‍රාව්‍ය ගමන් කිරීම නිසා ආසෘතිය මඟින් අක්‍රීයව ජලය ප්‍රතිශෝෂණය සිදුවෙයි.
- ජලයෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිශෝෂණය වන්නේ අවිදුර සංවලිත නාලිකාවේදීය.
- එමෙන්ම පෙරනය මෙතුළින් ගමන් කිරීමේදී විශේෂිත ද්‍රව්‍යයන් පෙරනය තුළට ස්‍රාවය ද සිදුවෙයි.
- නාලිකාව ආස්තරණයේ සෛල මඟින් නාලය තුළට සක්‍රීය පරිවහනයෙන් H^+ හා අක්‍රීය පරිවහනයෙන් NH_3 ද නාලිකාවේ කුහරයට ස්‍රාවය කරයි.
- එම NH_3 ස්ථාවරත්වයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම නිසා H^+ සමඟ සම්බන්ධ වී NH_4^+ තනයි.
- මීට අමතරව මාෂධ වර්ග සහ විෂද්‍රව්‍ය වැනි අක්මාවේ දී පරිවෘත්තියට ලක්වූ සමහර ද්‍රව්‍යයන් අවිදුර සංවලිත නාලිකාවේ කුහරය තුළට සක්‍රීයව ස්‍රාවය කරයි.
- ජල ප්‍රතිශෝෂණය හා විවිධ ද්‍රව්‍ය ස්‍රාවය නිසා අවිදුර සංවලිත නාලිකාවෙන් බැහැරවල තරලය වඩාත් සාන්ද්‍ර බවට පත්වේ.
- පෙරනය හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහණ බාහුවට පැමිණි පසු, ආසෘතිය මඟින් අක්‍රීයව ජලය ප්‍රතිශෝෂණය සිදුවීමෙන් පෙරනය වඩාත් සාන්ද්‍ර වීම සිදුවෙයි.
- ඉන් පසු පෙරනය හෙන්ලේ පුඩුවේ අග්‍රය පසු කරමින් ආරෝහණ බාහුවට පැමිණෙයි.
- මේ ආරෝහණ බාහුව ජලයට අපාරගමය නිසා ජලය ප්‍රතිශෝෂණය සිදු නොවෙයි.
- නමුත් NaCl සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සක්‍රීයව මෙන්ම අක්‍රීයව ප්‍රතිශෝෂණය වේ.
- Na^+ වැඩි ප්‍රමාණයක් සක්‍රීය පරිවහනය මඟින් පෙරනයේ සිට අන්තරාල තරලයට ප්‍රතිශෝෂණය කරයි.
- NaCl බැහැර වීමත්, ජලය බැහැර නොවීමත් නිසා පෙරනය විදුර සංවලිත නාලිකාව දෙසට ගමන් කරන විට වඩාත් තනුක වේ.
- විදුර සංවලිත නාලිකාවේ දී දේහ තරලවල K^+ හා Na^+ සාන්ද්‍රණ යාමනයට අදාළ වැදගත් කාර්යභාරයක් සිදු

කරයි. මේ ස්ථානයේ දී පෙරනය තුළට (සක්‍රීය පරිවහනයෙන්) ස්‍රාවය වන K^+ ප්‍රමාණය සහ පෙරනයෙන් ප්‍රතිශෝෂණය වන Na^+ (සක්‍රීය පරිවහනය මගින්) ප්‍රමාණය දෙකගේ අවශ්‍යතාවලට අනුව වෙනස් විය හැකි ය.

- අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන පරිදි K^+ වල සක්‍රීය පරිවහනය මගින් ස්‍රාවය සිදු වීමත් Na^+ වල සක්‍රීය ප්‍රතිශෝෂණයක් සිදු වෙයි.
- එමෙන්ම H^+ ස්‍රාවය හා HCO_3^- ප්‍රතිශෝෂණය සිදු කිරීම මගින් pH යාමනයට ද විදුර සංවලිත නාලිකාව දායක වෙයි. ADH හෝමෝනයේ බලපෑම යටතේ අක්‍රීයව ජල ප්‍රතිශෝෂණය සිදු වීමෙන් සාන්ද්‍ර මුත්‍රා නිපදවීමට ද විදුර සංවලිත නාලිකාව දායක වේ.
- අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථි වලින් ශ්‍රාවය කරන ඇල්ඩෝස්ටරෝන හෝමෝනය මගින් Na^+ හා ජලය ප්‍රතිශෝෂණය වැඩි කිරීමත්, K^+ බහිස්ස්‍රාවය වැඩි කිරීමත් සිදු කරයි.
- විදුර සංවලිත නාලිකා තුළ ඇති තරලය අවසානයේ දී සංග්‍රාහක ප්‍රනාලයට එක් වෙයි.
- සංග්‍රාහක ප්‍රනාලය තුළින් තරලය ගමන් කරන විට එය සාන්ද්‍ර බවට පත් වෙමින් මුත්‍ර සාදයි.
- ADH වල බලපෑම යටතේ ජලය ප්‍රතිශෝෂණය වැඩි වීම සංග්‍රාහක ප්‍රනාලවලින් සිදු වෙයි.
- මෙවිට මුත්‍ර වඩාත් සාන්ද්‍ර වෙයි.
- එසේම ඇල්ඩෝස්ටරෝන මගින් Na^+ සක්‍රීය ප්‍රතිශෝෂණය හා ජලයේ අක්‍රීය ප්‍රතිශෝෂණය උත්තේජනය කරවයි.
- තරලයේ අඩංගු අධික යුරියා සාන්ද්‍රණය නිසා එහි සිට අන්තරාල තරලයට යුරියා යම් ප්‍රමාණයක් විසරණයට ලක්විය හැකි ය.
- සංග්‍රාහක ප්‍රනාල පෙරනය අවසන් සැකසීමෙන් පසු මුත්‍රා සෑදේ.
- තනුක මුත්‍ර නිපදවෙන විට ආස්‍රානිය මගින් ජල ප්‍රතිශෝෂණයට ඉඩ නොතබමින් වෘක්ක මගින් සක්‍රීයව ලවණ ප්‍රතිශෝෂණය සිදු කරනු ලබයි.

වෘක්ක ක්‍රියාකාරීත්වය කෙරෙහි හෝමෝනවල දායකත්වය:-
(වැඩි විස්තර සඳහා (13 වසර) ආස්‍රානි විධානය කොටස බලන්න)

සමස්ථිකයේ දී වෘක්කවල කාර්යභාරය:-

- (1) දේහ තරලවල ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණය හා ජල තුල්‍යතාව පවත්වා ගැනීම
- (2) විෂ අපද්‍රව්‍ය දේහයෙන් බැහැර කිරීම
- (3) අම්ල භස්ම තුල්‍යතාව තුළින් රුධිරයේ pH යාමනය
- (4) රුධිර පරිමාව හා රුධිර පීඩනය පාලනය
- (5) රක්තාණු නිපදවීම උත්තේජනය සඳහා එරිත්‍රොපොයිටින් හෝමෝනය ස්‍රාවය කිරීම
- (6) රුධිර පීඩනය පාලනයට වැදගත් රිනින් එන්සයිමය නිපදවීම හා ස්‍රාවය කිරීම.

මානව මුත්‍ර පද්ධතිය ආශ්‍රිත ආබාධ:-

(වෘක්ක රෝගය)

(1) මුත්‍රාශයේ හා වෘක්කවල ගල් හට ගැනීම

- සාමාන්‍යයෙන් මුත්‍රවල අඩංගුවන ඇතැම් සංඝටක අවක්ෂේපනය වීමෙන් (සාමාන්‍යයෙන් ඔක්සලේට් හා පොස්ෆේට්) මුත්‍ර ගල් හට ගනියි.
 - ඒවා වෘක්කය අශ්ම ලෙස හැඳින්වේ.
 - මේ කෙරේ බලපාන හේතූන් වන්නේ
- (1) ප්‍රමාණවත් පරිදි ජලය පානය නොකිරීමෙන්, විජලන තත්ත්වයට පත් වීම
 - (2) මුත්‍රවල ක්ෂාරීය බව වැඩි වීම ($PH > 7.0$)
 - (3) ආසාදන නිසා මුත්‍රවල pH වෙනස් වීම නිසා හට ගන්නා
 - (4) පරිවෘත්තීය තත්ත්ව
 - (5) පවුල් ඉතිහාසය
- මේ තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් පරිදි ජලය පානය කළ යුතු ය.

(2) වෘක්ක අකර්මණය වීම - (Kidney failure)

- වෘක්කවලට තම ක්‍රියා නිසි පරිදි ඉටු කිරීමට නොහැකි වීමෙන් මේ තත්ත්වය හට ගනියි.
 - මේ නිසා අපද්‍රව්‍ය හා අතිරික්ත තරල රුධිරයේ එකරාගී වෙයි.
 - වෘක්ක අකර්මණය වීමට බලපාන හේතු
- (1) දියවැඩියාව
 - (2) අධික රුධිර පීඩනය
 - (3) පවුල් ඉතිහාසය
 - (4) විශපත් වීම

(3) නිදන්ගත වකුගඩු රෝග - Chronic kidney disease (CKD)

- කාලයත් සමඟ ක්‍රමයෙන් වකුගඩු ක්‍රියාකාරීත්වය අඩාල වෙමින් යාමයි.
 - වෘක්ක අකර්මණයතාවට බලපාන හේතු මෙයට ද බලපායි.
 - මේ තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට,
- (1) ලවණ හා මේදය අඩු ආහාර ගැනීම
 - (2) ක්‍රමවත් ව්‍යායාම වල නිරතවීම
 - (3) දුම්පානය නොකිරීම
 - (4) වෘක්ක ක්‍රියාකාරීත්වය නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සිදු කළ යුතු ය.

කාන්දු පෙරීම - (Dialysis):-

- > වෘක්ක අකර්මණය වූ රෝගීන්ගේ රුධිරයේ ඇති අපද්‍රව්‍ය, විෂ හා අතිරික්ත ද්‍රාව්‍ය හා තරල කෘතිමව රුධිරයෙන් ඉවත් කිරීම කාන්දු පෙරීමයි.

(4) ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුනා නොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝග (CKDu)

- මෙහිදී ද කාලයත් සමඟ වෘක්ක ක්‍රියාකාරීත්වය අඩ වීම සිදු වෙයි.

- මේ තත්ත්වය හට ගැනීම බලපාන නිශ්චිත හේතුව තව ම හඳුනා ගෙන නැති නිසා හේතුව හඳුනා නොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය ලෙස හඳුන්වයි.
- නිදන්ගත වකුගඩු රෝගයට (CKD) වඩා මෙය වෙනස් ආකාරයකි.
- එයට සම්මත අවදානම් සාධක බලපායි. ඒවා නම් මධුමේහය, අධිරුධිර පීඩනය, ප්‍රවේණික ආබාධ හා මුත්‍ර මාර්ග ගැටලු වේ.
- එනමුත් මෙම CKDu රෝගය ඇරඹීමත් සමඟ ම රෝග ලක්ෂණ හට නොගෙන රෝගියා ප්‍රතිකාර ගැනීමට යොමු වන අවස්ථාවේ දී අප්‍රතිවර්ත ලෙස වෘක්ක හානි විමෝචන රෝගයේ අවසාන අදියරයට ළඟා වී තිබීම මෙහි ඇති හයානතම තත්ත්වයයි (End stage renal disease/ ESRD).
- ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරුමැද පළාතේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලත් (මැදවව්විය, කැබිකිගොල්ලෑව, පදවිය, මැදිරිගිරිය), **ඌව පළාතේ** (ගිරාදුරු කෝට්ටේ), **නැගෙනහිර පළාතේ** (දෙහිඅක්කකස්සිය) වැනි ප්‍රදේශවලින් මුලින් වාර්තා වී ඇත.
- පසුව **වයඹ, දකුණු, මධ්‍යම හා උතුරු** පළාත්වලත් ද රෝගීන් වාර්තා වී ඇත.
- CKDu සඳහා උපකල්පිත හේතු.
- මේ සඳහා සාධක බොහොමයක් බලපෑ හැකිය.
 - (1) ජලය හා ආහාර තුළින් As, Cd වැනි බැර ලෝහ / ලෝහාලෝහවලට නිරාවරණය වීම
 - (2) ආහාර පිළියෙළ කිරීමට බාල තත්ත්වයෙන් යුක්ත උපකරණ භාවිතය
 - (3) පානීය ජලයේ ඇති අධික F^- ප්‍රමාණය
 - (4) පලිබෝධ නාශකවලට නිරාවරණය වීම
 - (5) ප්‍රවේණික සාධක
 - (6) මන්දපෝෂණය හා විජලනය

මානව අන්තරාසර්ග පද්ධතියේ කාර්යභාරය

- මානව දේහයේ පවතින, කෘත්‍ය සමායෝජනය හා යාමනය සඳහා සහභාගී වන මූලික පද්ධති දෙක අතුරින් එකක් වන්නේ අන්තරාසර්ග පද්ධතියයි.
- ස්නායු පද්ධතිය හා සැසඳීමේ දී අන්තරාසර්ග පාලනය තරමක් සෙමෙන් වුව ද වඩාත් නිවැරදිව, දේහයේ සමස්තීය පවත්වා ගනියි.
- විශිෂ්ට අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි මගින් හා විශිෂ්ට අන්තරාසර්ග සෛල මගින් ස්‍රාවය කරනු ලබන 'හෝමෝන' ඒකම; රසායනික සංඥා ආධාරයෙන් අන්තරාසර්ග පද්ධතිය ක්‍රියා කරයි.

අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි

- මේවා නිර්නාල ග්‍රන්ථි වන අතර, හෝමෝන (රසායනික පණිවුඩකාරක) ස්‍රාවය කරන විශේෂණය වූ සෛල කාණ්ඩවලින් සමන්විත ය.

ආන්තරාසර්ග රෙහෙළ ,

ආමාශය - ග්‍රේෆ්ස් - ගැස්ට්‍රින් හි හෝමෝන ය.
 ක්‍රමලාභය - ඝනුරින් / හොමොස්ටාසිස් ග්‍රන්ථි

Unit 05 | Smart Tute_02 | A/L Biology | සකස් කරුවා

- හෝමෝන රුධිර ධාරාවට සෘජුව ම විසරණය වන අතර ඇතිත් පිහිටන විශිෂ්ට වූ ඉලක්ක අවයව/ පටක කරා ළඟා වේ.



(a) In endocrine signaling, secreted molecules diffuse into the blood stream and trigger responses in target cells anywhere in the body.

- නිර්නාල ග්‍රන්ථිවල සිට රුධිර ධාරාවට මේ හෝමෝන විසරණය වීම, ඒ ග්‍රන්ථි වටා ඇති රුධිර කේශනාලිකා ජාල සැපයුම් මගින් වඩාත් පහසු කර ඇත.

හෝමෝන


- අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි/ අන්තරාසර්ග සෛලවලින් ස්‍රාවය කරන විශිෂ්ට ආකාරයේ සංඥා අණු වන අතර රුධිරය හරහා පරිවර්තනය වී සිරුරේ වෙනත් ස්ථානයක ඇති විශිෂ්ට ඉලක්ක සෛල මත ක්‍රියා කර, ඒවායේ සෛලීය කෘත්‍ය වෙනස් කරනු ලබයි. **මෙම විශිෂ්ට ඉලක්ක සෛල** ද **ඉලක්ක සෛල** වේ.
- විශේෂිත වූ හෝමෝනයකට සියලු දේහ සෛලවලට ළඟා විය හැකි වුව ද රසායනික සංඥාවලට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ඒ අදාළ හෝමෝනය සඳහා ගැළපෙන ප්‍රතිග්‍රාහක පවතින ඉලක්ක සෛල මගින් පමණි.
- ඉලක්ක සෛලයේ විශේෂිත ප්‍රතිග්‍රාහක සමඟ හෝමෝනය බැඳුණු විට, ඒය ඒ සෛලය තුළ රසායනික/ පරිවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියා සිදු වීමේ ආරම්භකය ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- රසායනික සංඥා මගින් යාමක පණිවිඩ දේහය පුරා සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව හෝමෝනවලට ඇත.

මානව අන්තරාසර්ග පද්ධතිය

- මානව අන්තරාසර්ග පද්ධතිය, ඒකිනෙකු වෙන්ව පිහිටි විශිෂ්ට අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථිවලින් සමන්විත වේ.
- මානව දේහයේ ඇති අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථිවල පිහිටීම රූපසටහනෙහි දක්වා ඇත

- මානව අන්තරාසර්ග පද්ධතියට අයත් අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි ලෙස,

- (1) කේතු දේහය
- (2) හයිපොතලමස,
- (3) පිරිසුටරි ග්‍රන්ථිය,
- (4) තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය,
- (5) පැරාතයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි,
- (6) තයිමස් ග්‍රන්ථි
- (7) අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථි,
- (8) ලැන්ගර්හැන් දිසිකා (අශ්නාශයේ ඇති),
- (9) ප්‍රජනනද්‍රිය (Gonads), දැක්විය හැකි ය.



දේහී පැහැය - පීච්ඤානු ආකෘතිය
 හෝමෝන - පීච්ඤානු ආකෘතිය
 දේහී පැහැය - පීච්ඤානු ආකෘතිය
 හෝමෝන - පීච්ඤානු ආකෘතිය

සමාජයාගේ - දේහී පැහැය

මානව - පීච්ඤානු ආකෘතිය

දේහී පැහැය - පීච්ඤානු ආකෘතිය
 හෝමෝන - පීච්ඤානු ආකෘතිය
 දේහී පැහැය - පීච්ඤානු ආකෘතිය
 හෝමෝන - පීච්ඤානු ආකෘතිය

- මේ අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථිවලට අමතරව සමහර අවයව හා පටකවල තනිව පිහිටි අන්තරාසර්ග සෛල ඇති වී ඇත.
 - (1) ආමාසය - **පාරාඥික**
 - (2) ක්ෂුද්‍රාන්තය - **නිකුරිත්, හෙල්පික්වොලොක්**
 - (3) වෘක්ක - **පරික්‍රමනාත්මක**
- ආදි ඒවා මගින් විශේෂිත හෝමෝන ස්‍රාවය කෙරේ

කේතු දේහය

- මෙය මොළය තුළ පිහිටා ඇත.
- කේතු දේහයෙන් ස්‍රාවය කරන මෙලොටිනින් මගින් ප්‍රජනනයට හා දෛනික ක්‍රියා මට්ටමට අදාළ වන ජෛව විද්‍යාත්මක රිද්මයන් යාමනය කිරීමෙහි ලා වැදගත් වේ.
- කෘත්‍යයන්
 - (1) බොහෝ පටකවල දෛනික රිද්මයට සම්බන්ධීකරණය
 - (2) වැඩිවියට පත් වීමට පෙර ලිංගික අවයවවල වර්ධනය හා විකසනය නියෝධනය

හයිපොතැලමිස

- පූර්ව මස්තිෂ්ක පාදස්ථයේ, කැලමසට වහා ම පහළින් පිටිපුටුර් ග්‍රන්ථියට සම්බන්ධව පිහිටයි.
- හෝමෝන හතක් හයිපොතැලමිස මගින් නිපදවා ස්‍රාවය කරන අතර ඒවා පූර්ව පිටිපුටුරිය මත ක්‍රියා කරයි (ප්‍රාථමික හෝමෝන 5ක් සහ ස්‍රාවය නියෝධක හෝමෝන 2කි).
- හයිපොතැලමිසෙන් ස්‍රාවය වන මේ හෝමෝන මගින්, පූර්ව පිටිපුටුරියෙහි හෝමෝන ස්‍රාවය යාමනය කරයි.
- (වගුව - 5.3) හයිපොතැලමිසෙන් ස්‍රාවය වන අනෙක් හෝමෝන දෙක (මක්සිටොසින් හා ප්‍රතිමොනුලය/ADH / Antidiuretic හෝමෝන) රුධිර ධාරාවට ස්‍රාවය කොට විශේෂිත වූ ඉලක්ක අවයව මත ක්‍රියා කරන තෙක් අපර පිටිපුටුරියේ කැන්පන්ව පවතී.

වගුව 5.3: පූර්ව පිටිපුටුරිය මත ක්‍රියා කරන හයිපොතැලමිසෙන් ස්‍රාවය වන හෝමෝන

හයිපොතැලමිසෙන් ස්‍රාවය වන හෝමෝන	කෘත්‍යය
වර්ධක හෝමෝන ප්‍රාථමික හෝමෝනය (GHRH)	පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් වර්ධක හෝමෝන ස්‍රාවය උත්තේජනය කරයි. (GH)
තයි‍රොට්‍රොපික් ප්‍රාථමික හෝමෝනය (TRH)	පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් තයි‍රොක්සිඩ් උත්තේජක හෝමෝන ස්‍රාවය උත්තේජනය කරයි. (TSH)
කෝටිකොට්‍රොපික් ප්‍රාථමික හෝමෝන (CRH)	පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් ඇඩ්‍රිනොකෝටිකෝට්‍රොපික් හෝමෝන (අධිවෘක්ක බාහික හෝමෝනය) (ACTH) ස්‍රාවය උත්තේජනය කරයි.

ගොනැඩොට්‍රොපික් ප්‍රාථමික හෝමෝනය (GnRH)	පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් සෘජුකර්ම උත්තේජක හෝමෝන (FSH) හා ලුටේනීකර්ම හෝමෝන (LH) ස්‍රාවය උත්තේජනය කරයි.
ප්‍රොලැක්ටික් ප්‍රාථමික හෝමෝනය (PRH)	පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් ප්‍රොලැක්ටික් හෝමෝන (PRL) ස්‍රාවය උත්තේජනය කරයි.
ප්‍රොලැක්ටික් නියෝධක හෝමෝනය (PIH)	පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් ප්‍රොලැක්ටික් හෝමෝන ස්‍රාවය නියෝධනය කරයි.
වර්ධක හෝමෝන ප්‍රාථමික නියෝධක හෝමෝනය (GHRH)	පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් GH හා TSH ස්‍රාවය නියෝධනය කරයි.

පිටිපුටුර් ග්‍රන්ථිය

- හයිපොතැලමිසට වහා ම පහළින් පූර්ව මස්තිෂ්කයේ පිහිටන අතර ඊට වෘත්තයකින් සවි වී ඇත.
- පිටිපුටුර් ග්‍රන්ථිය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් සමන්විත වන අතර **පූර්ව** හා **අපර** පිටිපුටුරිය) එය වෙනස් වූ කෘත්‍ය ඉටු කරන බද්ධ වූ ග්‍රන්ථි දෙකකි.
- පූර්ව පිටිපුටුරිය විශිෂ්ට වූ හෝමෝන **සංශ්ලේෂණය** කරයි. (වගුව 5.4)
- පූර්ව පිටිපුටුරිය හයිපොතැලමිස හා සම්බන්ධ වන්නේ **ප්‍රතිහාර රුධිර තාල** මගිනි.
- හයිපොතැලමිසෙන් ස්‍රාවය කරන විශිෂ්ට නිදහස් කිරීමේ හෝමෝනවලට ප්‍රතිචාර ලෙස (වගුව 5.3) පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් ඊට අදාළ විශිෂ්ට හෝමෝන රුධිර ධාරාවට ස්‍රාවය කරයි.
- පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් ස්‍රාවය කරන සමහර හෝමෝන හයිපොතැලමිසෙන් පැමිණෙන රසායනික සංඥා අනෙක් අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි වෙත නැවත හරවා යවයි.
- මේ ආකාරයේ හෝමෝන පෝෂී හෝමෝන ලෙස හැඳින්වෙන අතර (TSH, ACTH, FHS හා LH) ඒවායේ විශේෂිත ඉලක්ක ස්ථානය වන්නේ වෙනත් අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථියක් හෝ අන්තරාසර්ග සෛලයකි.
- පූර්ව පිටිපුටුරියෙන් ස්‍රාවය වන ප්‍රොලැක්ටික් හෝමෝනය පෝෂී හෝමෝනයක් නොවේ.
- මෙයට හේතුව එහි ඉලක්ක ස්ථාන අන්තරාසර්ගී නොවන පටක වීම ය.
- ප්‍රොලැක්ටික් මගින් සිදු කරනු ලබන්නේ පෝෂී නොවන බලපෑමකි.
- පූර්ව පිටිපුටුරිය මගින් ස්‍රාවය කරන වර්ධක හෝමෝනය (GH) පෝෂී මෙන් ම පෝෂී නොවන බලපෑම් ඇති කරයි.
- එහි ඉලක්ක ස්ථාන ලෙස අන්තරාසර්ගී හෝ අන්තරාසර්ගී නොවන සෛල ක්‍රියා කරයි. පූර්ව පිටිපුටුරිය මගින් බහුලව ම සංශ්ලේෂණය කරනු ලබන හෝමෝනය වන්නේ (GH) ය.

මේ අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථියකින් නිපදවී
වෙනත් අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථියක රුධිර
සංසරණය මගින් බාහිර වශයෙන්
පෝෂී රුධිර මගින් රැගෙන යාම.

හයිපොතැලමිසෙන් ස්‍රාවය
කරන මේ හෝමෝන වල විශේෂ අංශ
පූර්ව පිටිපුටුරිය වෙත. මේ මගින්
පිටිපුටුරියෙන් ස්‍රාවය කරන





Figure 9.3 The pituitary gland. A, The lobes of the pituitary gland and their relationship with the hypothalamus. B, Synthesis and storage of anterior pituitary hormones and oxytocin.

කයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි



- ගෙල ප්‍රදේශයෙහි ස්වරාලයට වහා ම පහළින් ස්වාසනාලයට ඉදිරියෙන් කයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය පිහිටයි.
- එය බුණ්ඩිකා දෙකකින් යුක්තයි.
- කයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය මගින් කයිරොයිඩ් හෝමෝන (එනම් ට්‍රයිප්‍රොෆොකයිරොනින් (T_3) හා කයිරොක්සිජන් (T_4)) සහ කැල්සිටොනින් හෝමෝනය සූචය කරයි
- කයිරොයිඩ් හෝමෝන වල කාර්යයන්
 - (1) කයිරොයිඩ් හෝමෝන මගින් පාදස්ථ පරිවෘත්තීය වේගය හා ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරයි.
 - (2) කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන් හා මේද පරිවෘත්තීය යාමනය කරයි.
 - (3) විශේෂයෙන් ම සැකිලි හා ස්නායු පද්ධතිවල සාමාන්‍ය වර්ධනයට හා විකසනයට කයිරොයිඩ් හෝමෝන අවශ්‍ය වේ.

- (4) සාමාන්‍ය රුධිර පීඩනය, හෘත් ස්පන්දන වේගය හා ප්‍රේෂිතානය පවත්වා ගෙන යාමට උදව් වේ
 - (5) ජීරණ හා ප්‍රජනක කාර්යය යාමනය කරයි.
- කැල්සිටොනින් හෝමෝනයේ කාර්යයන්
- (1) අස්ථි සෛල මත ක්‍රියා කොට අස්ථි පවක තුළ කැල්සියම් ගබඩා කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.
 - (2) වෘක්කීය නාල මත ක්‍රියා කොට කැල්සියම් ප්‍රතිශෝෂණය නියේධනය කරමින් කැල්සියම් බහිසාවය වැඩි කරයි.

පැරාතයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි


- පැරාතයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි (කුඩා ග්‍රන්ථි යුගල් දෙකක්) ගෙලෙහි පිහිටා ඇති කයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ අපර පාෂ්ඨයේ ගිලී පවතී.
- කයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ එක් එක් බන්ධිකාවේ පැරාතයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි 02 බැගින් ගිලී පවතී.
- පැරාතයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි මගින් පැරාතයිරොයිඩ් හෝමෝන (PTH) සූචය කරයි.
- PTH හි ප්‍රධාන කාර්යයන් රුධිරයේ ඉහළ කැල්සියම් මට්ටමක් පවත්වා ගැනීම සඳහා

- (1) වෘක්කීය නාලිකා මගින් කැල්සියම් ප්‍රතිශෝෂණය උත්තේජනය කිරීම
 - (2) ක්ෂුද්‍රාන්තයෙන් කැල්සියම් අවශෝෂණය උත්තේජනය කිරීම
 - (3) එම ප්‍රභව වලින් ලැබෙන කැල්සියම් සැපයුම ප්‍රමාණවත් නොවූ විට PTH අස්ථි බිඳ හෙළන සෛල මත ක්‍රියා කර අස්ථි බිඳ හෙළන රුධිරයට කැල්සියම් නිදහස් කිරීම දිරි ගැන්වීම
- රුධිර කැල්සියම් මට්ටම සම්බන්ධයෙන් කැල්සිටොනින් හෝමෝනයේ ක්‍රියාවට විරුද්ධ වූ බලපෑමක් PTH සතු වේ.



- උරෝස්ථියට සෘජුව ම පිටුපසින් පෙණහැලී දෙක අතර පපුවේ ඉහළ කොටසේ මේ ග්‍රන්ථිය පිහිටයි.
- කයිමස් ග්‍රන්ථිය මගින් කයිමොසින් හෝමෝනය සූචය කරයි.
- කයිමොසින් හෝමෝනයේ කාර්යයන්
 - (1) වසා සෛල මත ක්‍රියා කර T වසා සෛලවල විකසනය හා පරිණතිය යාමනය කරයි.
- මෙම වසා සෛල ඇටමීදුසුවල වූ මූලික සෛලවලින් සම්භවය වන අතර විශිෂ්ට ප්‍රතිශක්තියේදී වැදගත් වේ

අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථි



- මේවා යුගලමය වන අතර එක් වෘක්කයකට එක බැගින් වෘක්කයට උත්තර ව පිහිටා ඇත.
- එක ග්‍රන්ථියක ප්‍රදේශ දෙකක් හඳුනා ගත හැකි ය. එනම් පිටතින් පිහිටන අධිවෘක්ක බාහිකය හා ඇතුළතින් පිහිටන අධිවෘක්ක මජ්ජාව ලෙස ය.
- ඒ කොටස්/ ප්‍රදේශ දෙකෙහි ව්‍යුහය හා කාර්‍ය වෙනස් ය.
- අධිවෘක්ක බාහිකයෙන් හා මජ්ජාවෙන් ප්‍රාචය වන හෝමෝන දෙකේදී ආතති ප්‍රතිචාර සඳහා මැදිහත් වේ.

හෝමෝන බාහික

- > **ග්ලූකෝකෝර්ටිකොයිඩ** (ප්‍රධානවම - කෝටිසෝල්)
- > **මිනරලොකෝර්ටිකොයිඩ** (ප්‍රධානවම - ඇල්ඩෝටෙරෝන්)

- **කෝටිසෝල්** හෝමෝනයේ කාර්‍යයන්
 - (1) විරූකාරීතා ආතති ප්‍රතිචාර ප්‍රේරණය කරයි.
 - (2) පරිවෘත්තියේ දී සමස්ථික යාමනයට ද සහභාගී වේ.
 - (3) ග්ලූකෝකෝර්ටිකොයිඩ මඟින් ග්ලූකෝස් පරිවෘත්තියේ දී ප්‍රධාන බලපෑමක් ඇති කරයි.
 - (4) කාබෝහයිඩ්‍රේට් නොවන (ප්‍රෝටීන, මේද වැනි) ප්‍රභවවලින් ග්ලූකෝස් සංස්ලේෂණය දිරි ගන්වයි.
 - (5) සෛලීය ශක්තිය නිපදවීම සඳහා රුධිර සංසරණයේ පවතින ප්‍රයෝජ්‍ය ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය වැඩි කරයි.
 - (6) දේහයට ග්ලූකෝස් වැඩිපුර අවශ්‍ය වූ විට කංකාල පේශිවල ප්‍රෝටීන බිඳ දැමීමෙන් ග්ලූකෝස් නිපදවීම දිරි ගන්වයි. **ආහ් ව්න, මෙහෙණ්**.

- **ඇල්ඩෝටෙරෝන්** හෝමෝනයේ කාර්‍යයන්
 - (1) වෘක්කීය නාලිකාවලින් Na^+ ප්‍රතිශෝෂණය උත්තේජනය
 - (2) මුත්‍රා මඟින් K^+ බහිෂ්චාලය උත්තේජනය
 - (3) රුධිර පරිමාව හා රුධිර පීඩනය යාමනය කිරීම (Na^+ ප්‍රතිශෝෂණය සමඟ ජලය රඳවා තබා ගැනීම (retention) සිදුවන නිසා)

- අධිවෘක්ක මජ්ජාවෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් නිපදවන හෝමෝන වන්නේ

- > **ඇඩිරිනලින් (එපිනෙෆ්රින්)**
- > **නොඇඩිරිනලින් (නොඑපිනෙෆ්රින්)**

- මේවා කෙටි කාලීන ආතති ප්‍රතිචාරවලට මැදිහත්විය හැකි හෝමෝන වේ
- පුළුල් අනුවේශී ස්නායු උත්තේජන නිසා අධිවෘක්ක මජ්ජාව මඟින් මෙම හෝමෝන ග්‍රාචය කෙරේ
- කාර්‍යයන්
 - (1) හෘද ස්පන්දනය හා රුධිර පීඩනය වැඩි කිරීම,
 - (2) අනුච්ඡාදන අවයවවලට (හෘදය, මොළය හා කංකාල පේශි) සපයන රුධිර සැපයුම වැඩි කිරීම
 - (3) පරිවෘත්තීය වේගය ඉහළ දැමීම නිසා පහර දීම හෝ පලා යාමේ ප්‍රතිචාර උත්තේජනය වීම
 - (4) ඉක්මන් භාවිතාව සඳහා පවතින රසායනික ශක්තිය වැඩි කිරීම සඳහා,


→ **ATP නිෂ්පාදනයේ වේගය ↑ කිරීම.**

- > අක්මාවේ හා කංකාල පේශිවල ග්ලයිකොජන් බිඳ හෙලීමේ වේගය වැඩි කිරීම
 - > මේද සෛලවලින් මේද අම්ල නිදහස් කිරීම සිදු කිරීම
- මඟින් සංසරණය වන රුධිරයට ග්ලූකෝස් නිදහස් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.

(5) දේහ සෛල තුළ ශක්ති නිෂ්පාදනය උත්තේජනය කරයි.

අන්තරාසාදයේ ලැන්ගර්හැන් දීපිකා

Islet of Langerhans



- අන්තරාසාදය අන්තරාසාර්ග මෙන් ම බහිරාසාර්ග ග්‍රන්ථියක් ලෙස ද සැලකිය හැකි ය.
- එය පිහිටා ඇත්තේ ආමාශයට පිටුපසින් ග්‍රහනි වක්‍රය තුළ ය.
- අන්තරාසාදය පුරා විසිරී පවතින සෛල ගොනු ලෙස පවතින ලැන්ගර්හැන් දීපිකා අන්තරාසාදයේ කාර්‍යය ඉටු කරන කොටසයි.
- මේ දීපිකා ප්‍රධාන වශයෙන් ග්ලූකගොන් හා ඉන්සියුලින් නම් වූ හෝමෝන දෙක ග්‍රාචය කරයි.
- මේ හෝමෝන එකිනෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස ක්‍රියා කරමින් රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම පාලනය කරයි.
- අන්තරාසාදයේ ලැන්ගර්හැන් දීපිකාවල ඇති ඇල්ෆා සෛල ග්‍රාචය කරන ග්ලූකගොන් මඟින් රුධිරගත ග්ලූකෝස් මට්ටම වැඩි කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.
- එසේ ම දීපිකාවල ඇති බීටා සෛල මඟින් ප්‍රාචය වන ඉන්සියුලින් රුධිරගත ග්ලූකෝස් මට්ටම පහත හෙළීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.
- මේ හෝමෝනවල ප්‍රධාන ඉලක්ක ස්ථාන කංකාල පේශි හා අක්මාවයි (සමස්ථිකයේ රුධිර ග්ලූකෝස් යාමනය කොටස පරිශීලනය කරන්න).

ගොනැඩ

- ස්ත්‍රී ලිංගික ගොනැඩ (ඩිම්බ කෝෂ) යුගලක් ශ්‍රෝණි කුහරයේ පිහිටා ඇත.
- පුරුෂ ලිංගික ගොනැඩ යුගල (වාෂණ) වාෂණ කෝෂය තුළ පිහිටයි.
- පුරුෂයාට අමතරව ඩිම්බ කෝෂ හා වාෂණ අන්තරාසාර්ග කාර්‍යයක් ද දරයි.
- ඩිම්බ සූනිකා මඟින් ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය නිපදවයි.
- පිත දේහය (ඩිම්බ මෝචනයෙන් පසු ග්‍රාචි සූනිකාව මඟින් නිපදවෙන ව්‍යුහය) ප්‍රොජෙස්ටරෝන් නිපදවයි.
- මේ ස්ත්‍රී ලිංගික හෝර්මෝන පුළුල් පිටියුටරියෙන් ග්‍රාචය වන FSH හා LH සමඟ ආර්ථව වක්‍රය යාමනය කිරීම,

- ගර්භනී භාවය පවත්වා ගැනීම හා ක්ෂීරණය සඳහා ස්කන්ධ ග්‍රන්ථි දූදානම් කිරීම සිදු කරයි.
- ස්ත්‍රී ලිංගික ලක්ෂණ ස්ථාපනය හා පවත්වා ගෙන යෑමට ද මේවා සහාය වෙයි.
- පූර්ව පිටියුටරියෙන් FSH ග්‍රාහය නිශේධනය සඳහා අදාළ වන ඉන්හිබිට් නිපදවනු ලබන්නේ ද සීමා කෝෂ මගිනි.
- වෘෂණ අන්තරාල සෛලවලින් නිපදවන හා ග්‍රාහය කරන ප්‍රධාන පුරුෂ ලිංගික හෝමෝනය වන්නේ ටෙස්ටෝස්ටේරෝන් ය.
- පුරුෂ ද්විතියික ලිංගික ලක්ෂණ වර්ධනය හා පවත්වා ගෙන යාම හා ඉන්ද්‍රිය නිපදවීම යාමනය කරනු ලබන්නේ ටෙස්ටෝස්ටේරෝන් ය.
- මීට අමතරව වෘෂණ (සටොලි සෛල) FSH ග්‍රාහය නිශේධනය කිරීමට දායක වන ඉන්හිබිට් හෝමෝනය නිපදවයි.

අන්තරාසර්ග පද්ධතිය හා සම්බන්ධ ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණය

- ඉලක්ක සෛල මත හෝමෝනවල ක්‍රියා ද ඇතුළත්ව මානව දේහයේ කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලි රැසක් ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ මගින් යාමනය වෙයි.
- යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් එහි අන්තර්ල හෝ ප්‍රතිඵලය මගින් යාමනය වීම ප්‍රතිපෝෂණයයි.
- මානව දේහයේ බොහෝ හෝමෝනමය පාලනයන් සඳහා සෘණ ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ යෝදා ගනියි.
- එහි දී යම් ක්‍රියාවලියක අන්තර්ල එක්රැස් වන විට (උත්තේජනයට දක්වන ප්‍රතිචාරය) අදාළ ක්‍රියාවලියේ වේගය අඩු කිරීම (ආරම්භක උත්තේජනයේ බලපෑම අඩු කිරීම) සිදු වේ.
- අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථි හෝමෝන රුධිරයට නිදහස් කරනුයේ ග්‍රන්ථි උත්තේජනය වූ විට පමණි.
- ඉලක්ක ප්‍රදේශය ප්‍රතිචාරයේ සෘණ ප්‍රතිපෝෂී යාන්ත්‍රණය මගින් උත්තේජනය ප්‍රත්‍යාවර්තනය හෝ උත්තේජනය අඩු වීම සිදු වේ.
- උත්තේජනය නැති වන විට ද රුධිරයේ හෝමෝන මට්ටම අඩු වෙයි.
- රුධිරයේ පවතින උත්තේජක මට්ටම්වල ප්‍රමාණ මගින් (උදා : රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම මගින් ඉන්සියුලින් හා ග්ලූකගොන් ස්‍රාවය) රුධිරයේ පවතින සමහර හෝමෝනවල මට්ටම් සෘජුව ම පාලනය විය හැකි ය.
- උදාහරණ ලෙස ඉහළුව පවතින රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම අග්න්‍යාසයෙන් ඉන්සියුලින් සංසරණ රුධිරයට නිදහස් කිරීම උත්තේජනය කරයි.
- මේ ඉන්සියුලින් ඉලක්ක පටක මත ක්‍රියා කර රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම පහළ හෙළයි.
- රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම ප්‍රශස්ත අගය කරා ළඟා වූ විට, තවදුරටත් රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම පහළ යෑම වළක්වාලීම සඳහා පවතින රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම මගින් සෘජුව ම අග්න්‍යාසයේ ඉන්සියුලින් ග්‍රාහය පාලනය කරයි.
- හෝමෝන යාමන පද්ධති පූර් සංඛ්‍යාවක් ධන ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ මගින් ක්‍රියාත්මක වෙයි.
- මෙහි දී සිදු වන්නේ අදාළ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵල හෝ අන්තර්ල මගින් එම ක්‍රියාවලියේ වේගය වැඩි කිරීමෙන් මෙම වෙනස් වීම ප්‍රවර්ධනය වේ.

- මෙමගින් අන්තර්ල සෑදීම ප්‍රතිස්ථාපනය හෝ ප්‍රවර්ධනය වේ.
- ප්‍රසූතියේ දී හා ස්කන්ධ ග්‍රන්ථිවලින් කිරි මුදා හැරීමට ඔක්සිටෝසින්හි දායකත්වය ධන ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණයකට උදාහරණ වේ.
- අපර පිටියුටරියෙන් නිදහස් වන ඔක්සිටෝසින් හෝමෝනය මගින් ප්‍රසූතියේ දී ගර්භාශයික සංකෝචන උත්තේජනය වේ.
- මේ සංකෝචක බලයන් නිසා ළදරුවාගේ හිස ගැබ් ගෙලට ඇතුළු වීම නිසා එහි ඇති ප්‍රසාර ප්‍රතිග්‍රාහක උත්තේජනය වෙයි.
- ප්‍රසාර ප්‍රතිග්‍රාහක උත්තේජනයට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් නැවත සංවේදක නියුරෝන උත්තේජනය වී අපර පිටියුටරියෙන් ඔක්සිටෝසින් නිදහස් වීම වැඩි කරයි.
- මේ මගින් ගර්භාශයේ සංකෝචනය වීම වැඩි කරයි. දරුවා බිහි වන තුරු ම මේ ක්‍රියාවලිය නැවත නැවත සිදු වෙයි.
- පසුව උත්තේජනය (ගැබ් ගෙලේ ඇදීම) තව දුරටත් නොපැවැත්ම හේතුවෙන් ඔක්සිටෝසින් ග්‍රාහය කිරීම නවතියි.
- තවත් ධන ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණයක් වනුයේ ස්කන්ධ ග්‍රන්ථිවලින් කිරි මුදා හැරීම සඳහා ඔක්සිටෝසින්හි දායකත්වයයි (රූපසටහන 5.21).
- කිරි උරා බීමේ දී සංවේදක නියුරෝන මගින් අපර පිටියුටරියට යැවෙන ස්නායු ආවේග සංසරණය වන රුධිරයට ඔක්සිටෝසින් මුදා හැරීම වේගවත් කරයි.
- එවිට ඔක්සිටෝසින් ස්කන්ධ ග්‍රන්ථි මත ක්‍රියා කර එහි සිනිඳු පේශි සංකෝචනය ප්‍රේරණයෙන් කිරි මුදාහැරෙයි.
- මෙසේ ක්ෂීරණය නිදහස් කිරීම මගින් සංවේදක උත්තේජනය වැඩි කර, ධන ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක වීම නිසා කිරි මුදා හැරීමේ උත්තේජනය ප්‍රවර්ධනය කරයි.
- මේ ධන ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණයේ ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ඔක්සිටෝසින් වැඩිපුර නිදහස් කිරීම මගින් කිරි මුදාහැරීම වැඩි කරයි.

මිනිසාගේ සමහර අන්තරාසර්ග ආබාධ

මධුමේහය

- අග්න්‍යාසයේ ලැන්ගාහැන් දීපිකාවලින් ඉන්සියුලින් නිශ්පාදනය හා සම්බන්ධ සුලබ ආබාධයකි.
- මෙහි ප්‍රාථමික ලක්ෂණය වන්නේ රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම සාමාන්‍ය අගයට වඩා ඉහළ යෑමයි.
- මේ රුධිරගත ඉහළ ග්ලූකෝස් මට්ටම නිසා මුත්‍ර සමග ග්ලූකෝස් බිහිස්සාවය, වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මුත්‍ර නිශ්පාදනය හා පිපාසය ඇති වෙයි.
- මේ ආබාධය ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකකට වර්ග කර ඇත.

මධුමේහය 1 හා මධුමේහය 11

- මධුමේහය 1 ලෙස සඳහන් වන්නේ ඉන්සියුලින් මත යැපෙන (Insulin dependent) මධුමේහය ලෙස ය.
- මෙය සාමාන්‍යයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ ළමයින් හා තරුණ වැඩිහිටියන් අතරය.
- මෙය ස්වයං ප්‍රතිශක්ති රෝගාබාධයකි.

- මේ රෝගී තත්ත්වයට හේතු වන්නේ දේහයේ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය මගින් ලැන්ග්හැන් දිපිකාවල ඇති බීටා සෛල විනාශ කිරීමයි.
- මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රෝගී පුද්ගලයන්ගේ ඉන්සියුලින් ස්‍රාවය ප්‍රබල ලෙස දාහ වී හෝ නැති වී යයි. මේ ආබාධයට ප්‍රවේණික හා පාරිසරික සාධක හේතු වන බව පෙනෙයි.
- අඩු කාබෝහයිඩ්‍රේට් හා ලිපිඩ සහිත ආහාර වේල් ගැනීම, ක්‍රමානුකූලව රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම පරීක්ෂා කිරීම හා ඉන්සියුලින් ආවර්ති ලෙස නික්ෂේපණ මගින් මධුමේහය 1 ආකාරය පාලනය කළ හැකි ය.
- මධුමේහය 11 ආකාරය, ඉන්සියුලින් මත නොයැපෙන (Non- Insulin dependent) මධුමේහය ලෙස හඳුන්වයි.
- මේ තත්ත්වය ඉන්සියුලින් නිෂ්පාදනය මත රඳා නොපවතී.
- ඉන්සියුලින් නිෂ්පාදනය කර රුධිරය ධාරාවට ස්‍රාවය කළත් ඉලක්ක සෛල රුධිරයෙන් ග්ලූකෝස් ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වෙයි.
- එබැවින් රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම ඉහළ අගයක පැවතිය ද දේහ සෛල තුළ ග්ලූකෝස් දාහනයක් පවතියි.
- මේ මධුමේහය 11 ආකාරය සඳහා හේතු බහු සාධකීය වෙයි. මේ සඳහා හේතු වන්නේ කුරබාරු බව, ව්‍යායාම මද බව (බත් ජීවන රටාව), වයස්ගත වීම හා ප්‍රවේණි සාධකයි.
- මධුමේහය 11 යන තත්ත්වය කාබෝහයිඩ්‍රේට් හා ලිපිඩ අඩු ආහාර ලබා ගැනීම, ව්‍යායාම සමග සිති පරිභෝජනය කුලනය හා සුදුසු ඖෂධ ගැනීම මගින් පාලනය කළ හැකි ය.

අධිකයිරෝයිඩ්‍යාව හා මන්ද යිරෝයිඩ්‍යාව

- යිරෝයිඩ් ග්‍රන්ථියේ අසාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය, පිටිපිටි ග්‍රන්ථියේ හා හයිපොතැලමස් ආබාධ හේතුවෙන් යිරෝයිඩ් හෝමෝනවල (T_3 හා T_4) අසාමාන්‍ය ස්‍රාවයන් නිසා මේ තත්ත්ව ඇති වේ.
- මේ තත්ත්ව දිගු කාලීන පැවැත්ම හේතුවෙන් යිරෝයිඩ් ග්‍රන්ථිය විශාල වේ (ගලගණ්ඩය).



Figure 9.16 Enlarged thyroid gland in goitre.

අධිකයිරෝයිඩ්‍යාව

- මේ තත්ත්වය ඇති වන්නේ දේහ පටක අධික T_3 හා T_4 මට්ටම්වලට නිරාවරණය වීමෙනි.
- සුලභ ලක්ෂණ වන්නේ
 - > පාදස්ථ පරිවෘත්තීය වේගය ඉහළ යෑම,
 - > බර අඩු වීම,
 - > දහඩියෙන් තෙත් වූ උණුසුම් හම හා
 - > පාවනයයි.

- සමහර තත්ත්වවලදී ඇස ඉදිරියට නෙරා යෑම (exophthalmos) හා ගලගණ්ඩය ඇති වෙයි.



Figure 9.17 Abnormally bulging eyes in exophthalmos.

- ප්‍රතිකාරය වන්නේ
 - > කයිරෝයිඩ් ග්‍රන්ථියේ කොටසක් හෝ සම්පූර්ණ කයිරෝයිඩ් ග්‍රන්ථිය ම ඉවත් කිරීම හා
 - > කයිරෝයිඩ් හෝමෝන සංශ්ලේෂණය වැළැක්වීමට සුදුසු ඖෂධ භාවිතයයි.

මන්ද යිරෝයිඩ්‍යාව

- යිරෝයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ප්‍රමාණවත් නොවන යිරෝයිඩ් හෝමෝන ස්‍රාවය (T_3 හා T_4) මෙයට හේතු වෙයි.
- මෙය පූර්ව පිටිපිටිග්‍රන්ථියෙන් TSH නිෂ්පාදනය අඩු වීම හෝ ආහාරයේ අයඩින් දාහනය මෙයට හේතු විය හැකි ය.
- සුලභ ලක්ෂණ
 - > අඩු පාදස්ථ පරිවෘත්තීය වේගය,
 - > බර වැඩි වීම,
 - > අලසකම හා මැළි කම,
 - > මලබද්ධය හා වියළි සිසිල් සම මෙහි සාමාන්‍ය ලක්ෂණ වෙයි.
- ප්‍රතිකාරය
 - > ආහාරයෙන් අයඩින් පරිභෝජනය වැඩි කිරීම සහ/හෝ
 - > මෞඛ යිරෝයිඩ් හෝමෝන ප්‍රතිකාරය මගින් මේ තත්ත්වය පාලනය කළ හැකි ය.

මානව දේහයේ අභ්‍යන්තර පරිසරය නියත පරාසයක් තුළ පවත්වා ගෙන යෑම

සමස්ථීතිය

- සමස්ථීතිය යනු
 - > බාහිර පරිසරයේ සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ඇති වුව ද
 - > දේහයේ අභ්‍යන්තර පරිසරය
 - > පටු කායික විද්‍යාත්මක සීමා තුළ
 - > සාපේක්ෂව නියතව පවත්වා ගැනීමයි
- මෙහි දී බාහිර පරිසරය ලෙස හඳුන්වන්නේ දේහයේ බාහිර වටපිටාවයි.
- අභ්‍යන්තර පරිසරය ලෙස හඳුන්වන්නේ දේහ සෛල ජීවත් වන ජීවයේ ආසන්නතම වටපිටාවයි (සෛල ජීවත්වන මාධ්‍යය).
- දේහයේ අභ්‍යන්තර පරිසරයට උදාහරණ වන්නේ අන්තරාල තරලය සහ රුධිරයයි.
- භෞතික හා රසායනික ගති ලක්ෂණ පරාසයක් සඳහා බොහෝ සත්තු සහ මානවයෝ සමස්ථීතිය ප්‍රදර්ශනය කරති.

- මානවයන් විසින් පවු කායික විද්‍යාත්මක සීමා තුළ සාමාන්‍ය දේහ උෂ්ණත්වය, රුධිර pH, රුධිර ග්ලූකෝස් සහ ආප්‍රාතික මොලිබ්ඩනම් නියතව පවත්වා ගනු ලැබේ.
- මිනිස් දේහයේ ප්‍රශස්ත අභ්‍යන්තරීය තත්ත්ව ස්ථාවර සහ තුළිත මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට සමස්තීය අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- මානව දේහයේ සමස්තීය පාලන පද්ධති ප්‍රධාන වශයෙන් සෑහ ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ මත රඳා පවතී.
- එමඟින් නියත මට්ටමක් පවත්වා ගනිමින් අභ්‍යන්තර පරිසරය තුළ තදබල වෙනස්වීම් වළක්වා ගනී.
- සමස්තීය ළඟා කර ගනුයේ යම් විචල්‍යයක් (උදා: දේහ උෂ්ණත්වය, රුධිර ග්ලූකෝස්) නියමිත අගයක (set point) හෝ එයට ආසන්නයේ පවත්වා ගැනීමෙනි.
- විචල්‍යය නියමිත මට්ටමට වඩා ඉහළ යෑම හෝ පහළ යෑම උච්චාවචන උත්තේජ ලෙස ක්‍රියා කරන අතර ඒවා සංවේදක (අනාවරකය) මඟින් අනාවරණය කර ගනී.
- සංවේදකයේ සිට සංඥාවක් ලැබුණු විට පාලක මධ්‍යස්ථානය මඟින් ප්‍රතිදානයක් (output) ජනනය කරයි.
- එමඟින් ප්‍රතිචාරයක් ප්‍රේරණය කරයි.
- එම ප්‍රතිචාරය විචල්‍යය නැවත නියමිත සාමාන්‍ය මට්ටම කරා පත් කරවන කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියකි.
- නියමිත සාමාන්‍ය මට්ටම ලබා ගන්නේ ප්‍රතිචාරය මඟින් උත්තේජනයේ සෑහ ප්‍රතිපෝෂී පාලනය මඟිනි.

(ସଂଗ୍ରହୀତ ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶନ)

මිනිසාගේ දේහ උප්පත්තියේ සමස්තීකිත ශාමනය

- රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි උෂ්ණත්වය බලපාන බැවින්, සමස්තීක පාලනය මගින් මානව දේහය ප්‍රශස්තව ක්‍රියා කරන උෂ්ණත්වයක පවත්වා ගනී.
- මිනිසාගේ සාමාන්‍ය දේහ උෂ්ණත්වය දර්ශීය වශයෙන් 37°C (36.5°C - 37.5°C) වේ.
- මිනිස් දේහ උෂ්ණත්වය සෑණ ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ මගින් පාලනය වේ.
- දේහ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය පරාසයෙන් පිටත ඇති වීම, මොළයේ හයිපොතලමික්ස් ස්නායු සෛල කාණ්ඩයක් (දේහ උෂ්ණත්වය පාලන මධ්‍යස්ථානය) උෂ්ණත්ව පාලකය ලෙස ක්‍රියා කරමින්, උෂ්ණත්වය වැඩි වීමට හෝ අඩු වීමට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ දේහ උෂ්ණත්වය කළින් පැවති නියමිත මට්ටමට පත් වන තුරු පිළිවෙලින් තාප හානි යන්ත්‍රණ සක්‍රිය කරමින් හෝ තාපලාභී යන්ත්‍රණ ප්‍රවර්ධනය කරමිනි.

බැසීමේ උණුසුම් ප්‍රතිග්‍රාහක මගින් ඉහළ පර්යන්ත
උෂ්ණත්වය (උදා: පුද්ගලයා උණුසුම් වටපිටාවක සිටින
විට) අනාවරණය කර ගනී.

ඉහළ දේහ ගැඹුරු උණ්ණත්වය (උදා: ව්‍යායාම කිරීමෙන් පසු දේහය තුළ ඉහළ යන තාප ජනනය නිසා) අනාවරණය (detect) කර ගනු ලබන්නේ හයිපොතැල්මිය හරහා උණුසුම් රුධිරය ගලා යන විට, හයිපොතැල්මිය උණ්ණත්ව සංවේදී ස්නායු අන්ත ගිණිනි.

- මේ ස්නායු ආවේග හයිපොතැලමිස තුළ පිහිටි "දේහ උෂ්ණත්ව පාලන මධ්‍යස්ථානය" (උෂ්ණත්ව පාලකය) වෙත යවයි.

- පෙර පැවති නියමිත මට්ටමට වඩා දේශ උෂ්ණත්වය වැඩි වීමට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස හයිපොතැලමසේ උෂ්ණත්ව පාලකය මඟින්
 - තාප හානි යන්ත්‍රණ සක්‍රීය කිරීමෙන්
 - තාප ජනන යන්ත්‍රණ නිශේධනය කිරීමෙන් ස්නායු ආවේග යවයි.

- එමගින් දේශ උෂ්ණත්වය නියමිත මට්ටම දක්වා අඩු කරයි.

- පහත දැක්වෙන කාප හානි යන්ත්‍රණ මගින් දේහ උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම දිරි ගන්වයි.

- සමෙහි රුධිරවාහිනී විස්තාරණය කරන අතර එය රුධිර කේශනාලිකා උණුසුම් රුධිරයෙන් පිරී යැමට හේතු වෙමින්

සම මත පැවැත්විය යුතු නීති පිළිබඳව විකල්පයක් සිදු කරයි.

- ස්වේද ග්‍රන්ථිවලින් ස්වේද ප්‍රාවය වැඩි කරයි.
එය වාෂ්පීභවන සිසිලනය මඟින් කාසය විසුරුවා
හැරීමට හේතු වේ.

- දේශ උප්පයවිය සාමාන්‍ය පරාසය තුළ නැවත පවතින විට උණුසුම් උප්පයව සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක තවදුරටත් උත්තේජනය නොවන අතර "හයිපොතලැමිය උප්පයව පාලය" වෙත සංඥා යැවීම නවත්වන්නේ සෘණ සතිපෙයි යන්නකි. මිනිසා.

- ඉන් පසු අතිරේක තාප හානි යන්ත්‍රණ නවතින අතර පර්යන්තයට රුධිර ගලනය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වේ.

- පහළ පර්යන්ත උෂ්ණත්ව (ශීතල වටපිටාවක් ඇති වීම) සමෙහි පිහිටි සීතල ප්‍රතිග්‍රාහක මඟින් අනාවරණය කරයි.

- අඩු ගැඹුරු දේශ උෂ්ණත්වය (දේශය තුළ වැඩි තාප තත්වය සහ අඩු තාප ජනනය නිසා) හයිඩ්‍රොකැලම්සේ උෂ්ණත්ව සංවේදී ස්නායු අන්ත මගින් අනාවරණය කර ගනී.

- මේ ස්නායු ආවේග හයිපොතැලමසේ දේහ උෂ්ණත්ව පාලන මධ්‍යස්ථානයට යවයි.

- දේශ උෂ්ණත්වය පෙර පැවති නියමිත මට්ටමට වඩා පහළ ගිය විට හයිපොතැලමිස් උෂ්ණත්ව පාලකය

- තාපද්‍රාහී යන්ත්‍රණ සක්‍රීය කිරීමටත්
- තාප හානි යන්ත්‍රණ නිශේධනයටත් ආවේග යවයි.

- එමඟින් දේශ උෂ්ණත්වය පෙර පැවති තියමින් මට්ටම දක්වා වැඩි වේ.

- පහත දැක්වෙන තාප සංරක්ෂක සහ තාපද්‍රාහී යන්ත්‍රණ දේහ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම දිරි ගන්වයි.

- മാവേലം രാജ്യത്തിലെ മലപ്പുറം (പ്രദേശം) നഗരം ↓ വീതം.)

- සමෙහි රුධිරවාහිනී සංක්‍රමනය කරමින්, සමෙ සිට ගැලුරු පටක කරා රුධිරය යොමු කරමින් සමෙ පෘෂ්ඨය හරහා වන තාප හානිය අඩු කරයි.

- කාපලාහි යන්ත්‍රණ

- වෙවිලිම: කංකාල ජෙයිවල ශිෂ්ට පුනරාවර්ති
සංකෝචන මඟින් තාප ජනනය.

- යම් ප්‍රමාණයක තාප ජනනය සඳහා රෝසා
 උද්ගාමක පේශි සංකෝචනය (භීර්ගය) 6 කි

- කයි‍රොසිඩ් හෝමෝන (උදා: කයි‍රොක්සින්) සහ ඇඩ්‍රින්ලින් රුධිරයට වැඩිපුර ආවය උත්තේජනය

- > එමඟින් වැඩිපුර තාපය නිපදවීම සඳහා පරිවෘත්ති ශීඝ්‍රතාව සහ සෛලීය පරිවෘත්තිය (විශේෂයෙන් අක්මාවේ මේද ඔක්සිකරණය) වැඩි කරයි.
- දේහ උෂ්ණත්වය නියමිත පරාසයට පැමිණි විට ශීතල ආල උෂ්ණත්වයට සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක කවරුන් උත්තේජනය නොවන අතර සෑහ ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ හේතුවෙන් හයිපොතලමිස උෂ්ණත්ව පාලකයට එම ප්‍රතිග්‍රාහකවලින් එන සංඥා නවතී.
- අනතුරුව දේහයේ අතිරේක තාප ජනන යන්ත්‍රණය නවතී. පර්යන්තයට රුධිර ගලනය සාමාන්‍ය මට්ටමට පත් වේ.

මිනිසාගේ රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටමේ සමස්තීය සාමාන්‍ය

- මිනිසාගේ සාමාන්‍ය රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම 70-110mg/100mL (නිරාහාරව සිටින විට) වේ.
- එය දේහ සෛලවල ක්ෂණික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමාණවත් ය.
- දියවැඩියාව නැති පුද්ගලයකුගේ රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම කායික විද්‍යාත්මක සීමාවන් තුළ දවස පුරා උච්චාවචනය වේ.
- මානව දේහයේ රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම අන්‍යාසයෙන් ප්‍රාචය වන ඉන්සියුලින් සහ ග්ලූකගන් නම් හෝමෝනවල ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියා මඟින් සමස්තීයව පාලනය වේ.
- ඉහළ රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම සාමාන්‍ය සීමා ඉක්මවූ විට ලැන්ගූහැන් දිපිකාවල බීටා සෛලවලින් ඉන්සියුලින් හෝමෝනය රුධිරයට ප්‍රාචය වීම උත්තේජනය කරයි.
- ඉන්සියුලින් විශිෂ්ට ඉලක්ක පටක මත ක්‍රියා කර රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම පහළ යාම වළක්වයි.
- සංසරණය වන රුධිරයේ ඇති ඉන්සියුලින්,
 - (1) දේහ සෛල තුළට ග්ලූකෝස් පරිවහනය
 - (2) දේහ සෛල මඟින් ATP නිෂ්පාදනය සඳහා ග්ලූකෝස් භාවිතය (ග්ලූකෝස් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හා ජලය බවට බිඳ හෙළීමට ද හැකි ය.)
 - (3) ග්ලූකෝස් මේද අම්ලවලට පරිවර්තනය
 - (4) මේද, මේද පටක තුළ සංචිත කිරීම,
 - (5) ග්ලූකෝස්, ග්ලයිකොජන් බවට පරිවර්තනය උත්තේජනය
 - (6) ග්ලයිකොජන් අක්මා සෛල සහ කුකුළු පේශි සෛල තුළ සංචිත කිරීම උත්තේජනය.
- රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම සාමාන්‍ය පරාසයට ළඟා වූ විට, සෑහ ප්‍රතිපෝෂණය ඔස්සේ අන්‍යාසයෙන් ප්‍රාචය වන ඉන්සියුලින් මට්ටම, රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම මඟින් කෙළින් ම පාලනය කළ හැකි ය.
- මේ යන්ත්‍රණය මඟින් සාමාන්‍ය සීමාවෙන් ඔබ්බට කවරුන් ග්ලූකෝස් මට්ටම පහළ යාම වළක්වයි.
- සාමාන්‍ය සීමාවට වඩා රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම පහළ ගිය විට, ලැන්ගූහැන් දිපිකාවල ඇල්ෆා සෛලවලින් සංසරණය වන රුධිරයට ග්ලූකගෝන් ප්‍රාචය උත්තේජනය කරයි.

- ග්ලූකගෝන් විශිෂ්ට ඉලක්ක පටක මත ක්‍රියා කර රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම වැඩි වීම දිරිගන්වයි.
 - (1) ග්ලූකගෝන් මඟින් අක්මාව සහ කුකුළු පේශි තුළ ග්ලයිකොජන් බිඳ හෙළීම දිරිගන්වයි.
 - (2) රුධිරයට ග්ලූකෝස් නිදහස් වීම වැඩි වීම දිරිගන්වයි.
- රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම සාමාන්‍ය පරාසයට ළඟා වූ විට රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම මඟින් ම සෑහ ප්‍රතිපෝෂීව අන්‍යාසයෙන් ප්‍රාචය වන ග්ලූකගෝන් මට්ටම කෙළින් ම පාලනය කරයි.
- එමඟින් සාමාන්‍ය සීමාව ඉක්මවා රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම කවරුන් ඉහළ යාම වළක්වයි.

ආප්‍රාති විධානය

- ආප්‍රාති තුල්‍යතාව පවතින විට සෛලවල ඇතුළත හා පිටත පවතින ජල ප්‍රමාණය හා ද්‍රාව්‍ය සාන්ද්‍රණය සමාන වේ.
- දේහය තුළ නියත ප්‍රශස්ත ආප්‍රාති පීඩනයක් පවත්වා ගැනීමෙහිලා ආප්‍රාති විධානය වැදගත් වේ.
- මිනිසුන් තුළ ඇප්‍රාති විධානය මඟින් මුළු රුධිර පරිමාව සහ ජලාස්මාව හා පටක තරල තුළ දිය වී ඇති ද්‍රව්‍යවල සාන්ද්‍රණය හිතකර පරාසයක් තුළ නියතව පවත්වා ගැනීම තහවුරු කරයි.
- මිනිස් දේහය තුළ ආප්‍රාති තුල්‍යතාව ආකාර දෙකකින් සාක්ෂාත් කර ගනී.
 - ඒ ජල ප්‍රමාණය පාලනය සහ දේහය තුළට ලබා ගන්නා සහ හානි වන ද්‍රාව්‍ය ප්‍රමාණ පාලනය මඟිනි.
 - රුධිර ජල සමස්තීය හයිපොතොලමිස මඟින් පාලනය වේ.
- හයිපොතොලමිසේ ආප්‍රාති ප්‍රතිග්‍රාහක ඇත.
- මොළය ඔස්සේ ගමන් කරන රුධිරයේ ආප්‍රාති මොලිකතාව (Osmolarity හෝ ආප්‍රාති පීඩනය) ඒවා මඟින් අනාවරණය කර ගනී.
- රුධිර ආප්‍රාති මොලිකතාවට (හෝ ආප්‍රාති පීඩනයට) ප්‍රතිචාර ලෙස හයිපොතොලමිස පිපාස සංවේදනය පාලනය සහ අපර පිටිපිටියේ ADH ප්‍රාචය පාලනය සිදු කරයි.
- රුධිර ආප්‍රාති මොලිකතාව කායික විද්‍යාත්මක සීමා ඉක්මවා වැඩි වූ විට හයිපොතොලමිසේ ආප්‍රාති ප්‍රතිග්‍රාහක මඟින් ඒ සංවේදනය ලබා ගන්නා අතර, එමඟින් රුධිරය සංසරණයට ADH නිදහස් කිරීමට අපර පිටිපිටියේ උත්තේජනය කරයි.
- ADH වෘක්ක නාලිකා මත ක්‍රියා කරමින් වෘක්කාණුවේ විදුර සංවලිත නාලිකාවෙන් සහ වෘක්කවල සංග්‍රාහක ප්‍රණාලවලින් ජලය ප්‍රතිශෝෂණය උත්තේජනය කරමින් සාන්ද්‍ර මුත්‍ර නිපදවයි.
- රුධිර ආප්‍රාති මොලිකතාව අඩු වූ විට, ADH ප්‍රාචය නොවන බැවින් වෘක්කාණුවේ විදුර සංවලිත නාලිකා සහ වෘක්කවල සංග්‍රාහක ප්‍රණාලවලින් ජල ප්‍රතිශෝෂණය නවතී.
- එනිසා තහනු මුත්‍ර නිපදවයි.
- ඊට අමතරව අඩු රුධිර පරිමාව සහ අඩු රුධිර සෝඩියම් අයන මඟින් ඇන්ජියොටෙන්සින් II නිපදවීමට වෘක්ක උත්තේජනය කරයි.

ආප්‍රාති ජීවගත = 300

- ඇන්ඩ්‍රොවෙන්සින් 11 මගින් ඇල්ඩොස්ටෙරෝන් හෝමෝන ප්‍රාචයට අධිවෘක්ක බාහිකය උත්තේජනය කරයි.
- ඇල්ඩොස්ටෙරෝන්, වෘක්ක නාලිකාවල සෝඩියම් අයන ප්‍රතිශෝෂණය උත්තේජනය කරන විට ඒ සමගින් ජලය රඳවා ගැනීම ද සිදු වේ.
- එමගින් රුධිර පරිමාව හා රුධිර පීඩනය වැඩි වේ.
- එබැවින් මිනිස් දේහයේ ආප්‍රාති විධානයේ ලා වෘක්ක මගින් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

සමස්තීය තුළ අක්මාවේ කාර්යභාරය

- අක්මාව මානව දේහයේ සමස්තීය පවත්වා ගැනීමේලා එමගින් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන සක්‍රීය අවයවයකි.
- අක්මාවේ කෘත්‍ය සඳහා පහත සඳහන් දෑ ද ඇතුළත් වේ.

(1) කාබෝහයිඩ්‍රේට් පරිවෘත්තිය

- රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම සාමාන්‍ය පරාසය තුළ පවත්වා ගැනීමේලා අක්මාව වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
- රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම වැඩි වූ විට (උදා: ආහාරයට පසුව) ඉන්සියුලින් මගින් වන උත්තේජනය යටතේ ග්ලූකෝස්, ග්ලයිකොජන් ලෙස සංචිත වේ.
- රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම අඩු වූව හොත් (නිරාහාර ව සිටින විට) ග්ලයිකොජන්, ග්ලයිකොගන්වල බලපෑම යටතේ ග්ලූකෝස් බවට නැවත පත් වේ.

(2) මේද පරිවෘත්තිය

- දේහයට වැඩිපුර ශක්තිය අවශ්‍ය වූ විට අක්මා සෛල තුළ සංචිත මේද ATP නිපදවීම සඳහා පරිවෘත්තියට ලක් වේ.

(3) ප්‍රෝටීන පරිවෘත්තිය

- අක්මා සෛල තුළ දී නව ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සඳහා අවශ්‍ය නොවන සමහර ඇමයිනෝ අම්ලවල නයිට්‍රජන්ය කොටස ඉවත් කර (ඇමයින හරණය) මුත්‍ර සමග බහිස්ප්‍රාවය හෝ නව අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමයිනෝ අම්ල සංශ්ලේෂණයට කාබෝසහයිඩ්‍රේට්වලට මාරු කිරීම (ට්‍රාන්ස් ඇමයිනීකරණය) සිදු කරයි.
- අක්මාව ඇමයිනෝ අම්ලවලින් ජලාස්මා ප්‍රෝටීන ද (ඇල්බියුමින්, ග්ලොබියුලින්) සංශ්ලේෂණය කරයි.

(4) රක්තාණු බිඳ හෙළීම සහ ක්ෂුද්‍රජීවී ආසාදනවලට එරෙහි ආරක්ෂණය

- මිනිසාගේ අක්මාව රතු රුධිර සෛල බිඳ හෙළන ස්ථානයකි. (කැරි 6642)
- අක්මාව තුළ පිහිටි මහාභක්ෂාණු ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ ආරක්ෂණයට සහභාගී වේ.

(5) ඖෂධ සහ විෂ ද්‍රව්‍යවල විෂ හරණය

- අක්මාව, විෂ හරණයේ දී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. (චාප්‍ර 120)

(6) කාපය නිෂ්පාදනය

- අක්මාවේ ඉහළ පරිවෘත්තීය ශීඝ්‍රතාව නිසා දේහයේ ප්‍රධාන කාපය නිපදවන අවයවය ලෙස ක්‍රියා කරයි.

(7) පෝෂක සංචිත කිරීම

- ග්ලයිකොජන්, මේදයේ ද්‍රාව්‍ය විටමින් (A,D,E,K) ඇතැම් ජලද්‍රාව්‍ය විටමින් (B₁₂), යකඩ, කොපර් බඳු අත්‍යවශ්‍ය ඛණිජ අක්මාව තුළ සංචිත කෙරේ.

(8) හෝමෝන අක්‍රිය කිරීම

- ඇතැම් හෝමෝන, ඒවයේ දෛවීය ක්‍රියාවලට පසුව අක්මාව මගින් අක්‍රිය කෙරේ.

(9) පිත ශ්‍රාවය

- මේද ජීරණය හා බිලිරුබින් (රතු රුධිර සෛල බිඳ හෙළීමේදී නිපදවන ඵල) බහිස්ප්‍රාවයට වැදගත් වන සංඝට්‍රේෂණය පිත අක්මා සෛල මගින් සංශ්ලේෂණය කරයි.

සමායෝජනයට හා අදාළ ක්‍රියාදාම සහ පද්ධති

- ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සඳහා, ජීවී දේහ තුළ නියත අභ්‍යන්තර පරිසර තත්ත්ව පවත්වා ගැනීම පිණිස උත්තේජ හා ප්‍රතිචාර අතර සමායෝජනයක් අවශ්‍ය වෙයි.

සමායෝජනයට දායක වන පද්ධති

- ශාක මෙන් නොව සත්ත්වයන්ට හට දේහ ක්‍රියාකාරීත්වයන් සමායෝජනය සඳහා එකිනෙකට සහසම්බන්ධ නමුත් එකිනෙකට වෙනස් පද්ධති දෙකක් ඇත.
 - ස්නායු පද්ධතිය
 - අන්තරාසර්ග පද්ධතිය

වගුව 5.1: ස්නායු පද්ධතිය හා අන්තරාසර්ග පද්ධතිය අතර සමායෝජනය හි අදාළ සමානකම් සහ අසමානකම්

ලක්ෂණය	ස්නායු සමායෝජනය	හෝර්මෝනමය සමායෝජනය
සම්ප්‍රේෂණය	නියුරෝන හරහා	රුධිරය හරහා
සම්ප්‍රේෂකයේ ස්වභාවය	රසායනික හා විද්‍යුත්	රසායනික
ප්‍රතිචාරය	ස්ථානීයයි	විසිරිතය
ප්‍රතිචාරය ඇරඹීම සඳහා කාලය	ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාකාරී වේ	සෙමෙන් ක්‍රියාකාරී වේ
ප්‍රතිචාරයේ කාලසීමාව	කෙටි	දිගු

විවිධ සත්ත්ව වංශවල ස්නායු පද්ධතිවල සංවිධානය

- වටපිටාව සමඟ සංවේදී විමර්ශන වේගයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට විශේෂයෙන් වූ නියුරෝන පද්ධතියක් සත්ත්ව රාජධානියේ සතුන්ට ඇත.
- ඇනිමාලියා රාජධානියේ සරලතම ස්නායු පද්ධතිය දරනුයේ නිඩාරියාවෝ ය.
 > ඔවුන්ට තනි නියුරෝන එකිනෙකට සම්බන්ධ වී සෘජුකූණ විසිරිත ස්නායු ජාලයක් ඇත.
- වඩාත් සංකීර්ණ සත්ත්වයන්ගේ ස්නායු පද්ධතියේ ස්නායු සෛල කාණ්ඩ (නියුරෝන), ස්නායු ලෙසත් බොහෝ විට ගැංග්ලියා සහ මොළය ලෙසත් සංවිධානය වී ඇත.
- ප්ලානේරියාවන් වැනි සමහර ප්ලැටිහෙල්මින්තේස් වංශිකයන්ගේ ස්නායු පද්ධතිය සමන්විත වනුයේ පූර්ව ප්‍රදේශයේ ඇති ගැංග්ලියා යුගලක් ("මොළය") හා අන්වායාම වලින් ස්නායු රජයක් දෙකකින් ය.
- ප්ලානේරියාවන්ගේ ගැංග්ලියා ආසන්නව ඇති අක්ෂි ලප ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- ඇනලිඩාවන් හා ආත්‍රොපෝඩාවන් හට තරමක් සංකීර්ණ මොළයක් හා උදරීය ස්නායු රැහැන් ඇත. උදරීය ස්නායු රැහැන් ගැංග්ලියා දරයි.
 > ඒවා බැස්ඩිකා සැකසී ඇත.

- එකසිනොඩමේටාවන්ගේ ස්නායු පද්ධතිය අරීය ස්නායු හා ස්නායු වලයකින් සමන්විත ය.
- කෝඩේටාවන්ගේ ස්නායු පද්ධතිය සමන්විතව ඇත්තේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය (CNS) හා පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියෙන් (PNS) වේ.
 > මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට මොළය හා සුෂුම්නාව ඇතුළත් වෙයි.
 > පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය ස්නායු හා ගැංග්ලියාවලින් යුක්ත ය.

චිත්‍ර 5.2: විවිධ සත්ත්ව වංශ සහ ඔවුන්ගේ ස්නායු සංවිධානය

වංශය	සංවිධානය	උදාහරණ
නිඩාරියා	ස්නායු දැල/ ජාලය	හයිඩ්‍රා (Hydra)
ප්ලැටිහෙල්මින්තේස්	මොළය, අන්වායාම ස්නායු රැහැන්	ප්ලානේරියා (Planaria)
ඇනලිඩා	මොළය, උදරීය ස්නායු රැහැන්, බැස්ඩිකා ගැංග්ලියා	කුඩාල්ලා
ආත්‍රොපෝඩා	මොළය, උදරීය ස්නායු රැහැන්,	කැරපොන්තා

	බැස්ඩිකා ගැංග්ලියා	
එකසිනොඩමේටා	ස්නායු වලය හා අරීය ස්නායු	තාරකා මාලාව
කෝඩේටා	මොළය, සුෂුම්නාව (පෘෂ්ඨීය ස්නායු රැහැන්), ස්නායු හා ගැංග්ලියා	හූනා




Figure 49.2: Nervous system organization. (a) A hydra contains radial neurons (purple) organized in a diffuse net. (b) A sea star contains radial neurons (purple) organized in a diffuse net. (c) A planarian contains a brain, nerve cord, and ganglia. (d) A leech contains a brain, nerve cord, and ganglia. (e) An insect contains a brain, nerve cord, and ganglia. (f) A crab contains a brain, nerve cord, and ganglia. (g) A squid contains a brain, nerve cord, and ganglia. (h) A salamander contains a brain, nerve cord, and ganglia.


මානව ස්නායු පද්ධතියේ දළ ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකිරීත්වය

මානව ස්නායු පද්ධතියේ සංවිධානය හා ප්‍රධාන කොටස්

- එය මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් හා පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියකින් යුක්ත වෙයි.
- පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට මොළය හා සුෂුම්නාව අයත් ය.
- පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියෙහි ප්‍රධාන සංරචක වන්නේ ස්නායු හා ගැංග්ලියා ය.

මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය (CNS)

- මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය මොළය හා සුෂුම්නාවෙන් යුක්ත වෙයි.
- පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ එය කලල විකසනයේ දී පෘෂ්ඨීය කුහරමය ස්නායු රැහැනකින් විකසනය වෙයි.
- එහි පූර්ව කෙළවර විශාල වී මොළය සාදන අතර, එහි පූර්ව මොළය, මධ්‍ය මොළය හා අපර මොළය යන ප්‍රධාන ප්‍රදේශ තුනක් ඇත.



හූර්ව මොළය
මධ්‍ය මොළය
අපර මොළය
සුෂුම්නාව

- මොළයේ මධ්‍ය නාලයෙන් මස්තිෂ්ක කෝෂිකා ලෙස හැඳින්වෙන අක්‍රමවත් හැඩැති කුහර සෑදයි.
- මොළයේ කෝෂිකා හතරක් ඇත.
- ඉන් තුනක් පූර්ව මොළයේ ද අනෙක අපර මොළයේ ද පිහිටයි.
- මේ මධ්‍ය නාලය සුළුමනට තුළුව අඛණ්ඩව පවතියි. මේ කෝෂිකා හා සුළුමනට මධ්‍ය නාලය මස්තිෂ්ක සුළුමනා කරලයෙන් පිරී පවතියි.
- මස්තිෂ්ක සුළුමනා කරලයේ කෘත්‍යයන්
 - මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය තුළ ඒකාකාර පීඩනයක් පවත්වා ගැනීම
 - මොළය සහ කපාලය අතර කම්පන අවශෝෂණය.
 - පෝෂක හා හෝමෝන සංසරණයට
 - අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට ද දායක වෙයි.





Figure 7.24 The cerebellum and associated structures.

- භෞතික හානිවලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා මොළය හා සුළුමනාවේ නොයෙක් අනුවර්තන ඇත.
 - මොළය කපාලය තුළ පිහිටා ඇත.
 - කශේරුව සාදනු ලබන කශේරුකාවලින් සුළුමනාව වටවේ.



- මෙනින්ජිය නැමැති පටක ස්ථර තුනකින් මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය තවදුරටත් ආරක්ෂා වී පවතියි.
 - බාහිරතම ස්තරය → වරායිකාව (Dura mater)
 - මධ්‍ය ස්තරය → ජාලාකාර පටලය (Arachnoid)
 - අභ්‍යන්තර ස්තරය → විනාංශුකාව (Pia mater)

මානව මොළයේ ප්‍රධාන කොටස්



- මානව කලලයේ,
 - පූර්ව මොළය,
 - මධ්‍ය මොළය හා
 - අපර මොළය

සුප්‍රසිද්ධ මොළය බවට විකසනය වෙයි.

- පූර්ව මොළයෙන්
 - මස්තිෂ්කය,
 - නැලමස,
 - හයිපොතලමස හා
 - කේතු දේහය නිර්මාණය වෙයි.
- මධ්‍ය මොළයෙන්
 - මස්තිෂ්ක වෘත්තයේ (මොළ කඳේ) කොටසක් සෑදෙයි.
- අපර මොළය මගින්
 - අනුමසනීයත්වය,
 - වැරෝලි සේතුව හා
 - සුළුමනා ශීර්ෂකය සෑදෙයි.
- මස්තිෂ්ක වෘත්තය මධ්‍ය මොළය, වැරෝලි සේතුව හා සුළුමනා ශීර්ෂකයෙන් තැනී ඇත.

මස්තිෂ්කය

- මිනිස් මොළයේ විශාලතම කොටසයි.
- එය ගැඹුරු පැල්මක් මගින් වම් හා දකුණු මස්තිෂ්ක අර්ධගෝල දෙකකට බෙදී ඇත.
- මස්තිෂ්කයේ මතුපිට ප්‍රදේශය ස්නායු සෛලවල සෛල දේහවලින් සැදී (බ්‍රසර ද්‍රව්‍ය) මස්තිෂ්ක බාහිකය සෑදයි.



මස්තිෂ්ක බාහිකයේ පවතින ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශ තුනක් හඳුනා ගෙන ඇත. ඒවා නම්,





Figure 7.20 The cerebrum showing the main functional areas. Viewed from the left side.

- සංවේදක ප්‍රදේශ
 - > වේදනාව, උෂ්ණත්වය, ස්පර්ශය, දෘෂ්ටිය, ශ්‍රවණය, රස හා ආස්‍රාණ ප්‍රතිග්‍රහණය ඇතුළුව සංවේදන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සහ සැකසීම (process) හා සම්බන්ධ ප්‍රදේශ
- සංඛ්‍යාමි ප්‍රදේශ
 - > සංවේදනය පිළිබඳ තොරතුරු හඳුනා ගැනීම හා අර්ථකථනය (Interpretation)
 - > මතකය, බුද්ධිමත්භාවය, හේතු දැක්වීම, විනිශ්චය හා වික්ෂේපය වැනි සංකීර්ණ මානසික ක්‍රියාවලි සමෝධානය හා සංකලනය පිළිබඳ වගකීම් දරන ප්‍රදේශ
- වාලක ප්‍රදේශ
 - > ඉව්ජානුගත ජෛව සංකෝචනය ආරම්භය හා පාලනය මඟින් කංකාල (ඉව්ජානුගත) ජෛව වලනය මෙහෙයවීම හා සම්බන්ධ වගකීම් දරන ප්‍රදේශ



කැලමස



- මස්තිෂ්ක අර්ධගෝල තුළ කැලෝස දේහවලට වහා ම පහළින් පිහිටා ඇත.

- එය ශ්වේත හා බුසර ද්‍රව්‍ය අඩංගු ගොනු දෙකකින් සැදී තිබේ.

කෘත්‍ය


එය විශේෂ සංවේදක අවයව සහ සම මගින් අන්තර්ගත අවයවවල පිහිටි සංවේදන ප්‍රතිග්‍රාහකවලින් පැමිණෙන සංවේදන ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය ලෙස ක්‍රියා කරයි.

වැඩිදුර සැකසීම හා සංජානනය සඳහා සංවේදන තොරතුරු තෝරා බේරා ගැනීම හා ඒවා මස්තිෂ්ක බාහිකයේ අදාළ විශේෂ ස්ථාන කරා යොමු කිරීම මේ මඟින් සිදු කෙරේ.

- මොළයේ විවිධ කොටස්වලින් ලබා ගන්නා ස්නායු ආවේග කැලමස මඟින් මස්තිෂ්ක බාහිකයේ විවිධ ප්‍රදේශ කරා යොමු කරයි.

හයිපොතලමස

- කැලමසට ඉදිරියෙන් හා පහළින් ද පිටියුටරි ග්‍රන්ථියට වහා ම හෙළින් ද පිහිටයි.
- එය ස්නායු තන්තු මඟින් පිටියුටරි ග්‍රන්ථියේ අපර බණ්ඩකාවට ද සංකීර්ණ රුධිර නාල පද්ධතියක් මඟින් එහි පූර්ව බණ්ඩකාවට ද සම්බන්ධ වේ. (සුභ්‍යාගාර රුධිර නාල සැකසීම)



ඉව්ජානුගත

කෘත්‍ය

(36.5°C - 37.5°C)

- (1) දේහ උෂ්ණත්ව යාමනය
- (2) පිපාසය සහ ජල තුල්‍යතාව යාමනය
- (3) ආහාර රුචිය යාමනය
- (4) නින්ද හා අවදි වීමේ වක්‍ර යාමනය
- (5) ලිංගික හැසිරීම හා සම්බන්ධ කාර්ය ඉටු කිරීම
- (6) පහර දීමේ හෝ පලා යාමේ ප්‍රතිචාර ආරම්භය
- (7) පූර්ව පිටියුටරිය මත ක්‍රියා කරන හෝමෝන නිදහස් කිරීම හා අපර පිටියුටරි හෝමෝන නිපදවීම
- (8) ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතිය පාලනය

මධ්‍ය මොළය (Central Nervous System)

- මධ්‍ය මොළය, මස්තිෂ්කය වෘත්තයේ ඉහළ කොටසයි.
- මෙය පිහිටා ඇත්තේ මස්තිෂ්කය හා වැරෝලි සේකුව අතර මස්තිෂ්කයට පහළින් හා වැරෝලි සේකුවට ඉහළින් වන සේ තුන්වන හා හතරවන මස්තිෂ්ක කෝෂිකා සම්බන්ධ කරමින් ඇති මස්තිෂ්ක සුෂුම්නා තරලය වටාය.
- මෙය මස්තිෂ්කය, අපර මොළය හා සුෂුම්නාව සම්බන්ධ කරන ස්නායු රැහැන් සහ නියුරෝන දේහවලින් යුක්ත ය.

කෘත්‍ය

- (1) ආරෝහණ හා අවරෝහණ ස්නායු තත්තු හුවමාරු (Relay) මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම
- (2) සංවේදක තොරතුරු (දෘෂ්ටි හා ශ්‍රවණ) ලබා ගැනීම සහ සංකලනය (integration) හා පූර්ව මොළයේ අදාළ ස්ථාන කරා ඒවා යොමු කිරීම
- (3) දෘෂ්ටි හා ශ්‍රවණ ප්‍රතික්‍රියා සමායෝජනය

වැරෝලි සේකුව

- මධ්‍ය මස්තිෂ්කයට පහළින් හා සුෂුම්නා ශීර්ෂකයට ඉහළින්, අනුමස්තිෂ්කයේ ඉදිරියෙන් පිහිටා ඇති මස්තිෂ්කය වෘත්තයේ කොටසකි.
- මෙහි ස්නායු තත්තු ඇති අතර එමඟින් අනුමස්තිෂ්කයේ අර්ධගෝල දෙක අතර පාලමක් සාදයි.
- එහි සුෂුම්නාව සහ මොළයේ ඉහළ ප්‍රදේශ අතර ගමන් කරන ස්නායු තත්තු ද ඇත.
- වැරෝලි සේකුවේ ඇති ස්නායු සෛල කාණ්ඩයක් ශ්වසන යාමක මධ්‍යස්ථානය සාදයි.
- මෙහි අඩංගු සමහර ස්නායු සෛල දේහ හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන ලෙස ක්‍රියා කරයි.

කෘත්‍ය

- (1) පූර්ව මොළය, මධ්‍ය මොළය හා පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය අතර තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය
- (2) දිවීම හා නැගීම වැනි විශාල පරිමාණයෙන් සිදු වන දේහ චලන සමායෝජනය
- (3) සුෂුම්නා ශීර්ෂකයේ දායකත්වය ද ඇතිව ශ්වසන ක්‍රියාවලිය යාමනයට දායක වීම

සුෂුම්නා ශීර්ෂකය


- මස්තිෂ්කය වෘත්තයේ පහළ ම කොටසයි.
- වැරෝලි සේකුවෙන් ඇරඹී පහළින් පිහිටි සුෂුම්නාවට සම්බන්ධ වෙයි.
- එය
 - > හෘත් ස්නායු මධ්‍යස්ථානය, (රුකර්ෂ බෙදා දීම)
 - > ශ්වසන මධ්‍යස්ථානය
 - > ප්‍රතික්‍රියා මධ්‍යස්ථානය, (උණුසුම, ක්‍රියාත්මක, මධ්‍යය, යන ඒවා වලින් සමන්විත වෙයි. නිරීක්ෂණය)

වැරෝලි සේකුව

කෘත්‍ය

- (1) පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය (PNS), මධ්‍ය මොළය හා පූර්ව මොළය අතර තොරතුරු හුවමාරු කරයි.
- (2) දිවීම, නැගීම වැනි විශාල පරිමාණයේ දේහ චලන සමායෝජනය කරයි.
- (3) සුෂුම් ගැනීම, හෘදය හා රුධිරවාහිනී ක්‍රියාකාරීත්ව (ශ්වසන මධ්‍යස්ථානය හා හෘත් ස්නායු පාලන මධ්‍යස්ථානය මඟින්) වැනි විවිධ ස්වයංසාධක සමස්ථිතික ක්‍රියා පාලනය කරයි.
- (4) ප්‍රතික්‍රියා මධ්‍යස්ථාන හරහා වමනය, ශිලීම, කැස්ස, කිවිසීම වැනි අනිවාර්‍ය ප්‍රතික්‍රියා ක්‍රියා පාලනය කරයි.

(නිත්‍යතාමය)



අනුමස්තිෂ්කය


- එය වැරෝලි සේකුවට පිටුපසින් හා මස්තිෂ්කයේ අපර කොටසට පහළින් පිහිටා ඇත.
- එය ද අර්ධගෝල දෙකකින් යුක්ත ය.

කෘත්‍ය

(නිත්‍යතාමය)

- (1) ඉවහරානු පේශි චලන සමායෝජනය
- (2) ඉරියව්ව හා සම්බරතාව පවත්වා ගැනීම
- (3) වාලක හැකියා ඉගෙනීමට හා මතක තබා ගැනීමට උපකාරී වීම

සුෂුම්නාව



- සුෂුම්නාව යනු කශේරු නාලය තුළ අවලම්බනය වී ඇති දිගු සිලින්ඩරාකාර ව්‍යුහයකි.
- එය සුෂුම්නා ශීර්ෂකය සමඟ අඛණ්ඩව පවතියි.
- සුෂුම්නාවේ මධ්‍යයේ ධූසර ද්‍රව්‍යවලින් වට වී ඇති මධ්‍ය නාලය පිහිටයි.
- සුෂුම්නාවේ බාහිර ප්‍රදේශය සෑදී ඇත්තේ ශ්වේත ද්‍රව්‍යයෙනි.

කෘත්‍ය

උපරිමානුපාත

- (1) මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය, සංවේදක හා වාලක නියුරෝනවලට සම්බන්ධ කරන අතර, මොළය දෙසට හා ඉන් ඉවතට ආවේග ප්‍රචාරණය සඳහා පහසුකම් සපයයි.
- (2) ප්‍රතික්‍රියා ඇති කරයි. සමායෝජනය කරයි.

පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය




Figure 49.6 The vertebrate nervous system. The central nervous system consists of the brain and spinal cord (shaded). The peripheral nervous system (PNS) consists of the rest of the nervous system.

- පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය සෑදී ඇත්තේ
 - කපාල ස්නායු,
 - සුෂුම්නා ස්නායු හා
 - ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතියෙනි (ගන්ධරියා සමඟ).

- ජීවිතයේ චලන හා ඔවුන්ගේ අභ්‍යන්තර පරිසරය යාමනය කරමින් මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය දෙසට හා ඉන් ඉවතට ආවේය සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
- අභ්‍යන්තර නියුරෝන (සංවේදක නියුරෝන) ලෙස හඳුන්වන නියුරෝන ඔස්සේ සංවේදක ප්‍රතිග්‍රාහක මගින් ලබා ගන්නා සංවේදක තොරතුරු මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය වෙත ළඟා වෙයි.
- මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ දී මේ තොරතුරු සැකසුම් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ උපදෙස් අපවාහී (චාලක) නියුරෝන නමින් හැඳින්වෙන පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියේ නියුරෝන ඔස්සේ කාරක පටක/ අවයව (පේශි, ග්‍රන්ථිවේ හෝ අන්තරාසර්ග සෛල) වෙත සම්ප්‍රේෂණය වේ.
- පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය අපවාහී සංරචක දෙකකින් සමන්විත ය.
 - චාලක පද්ධතිය - මෙය කංකාල පේශි වෙත ස්නායු ආවේය ගෙන යන නියුරෝනවලින් සමන්විත ය. එම නිසා එය ඉවිතානුකූල ක්‍රියාවලි පාලනය කරයි.
 - ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතිය - සාමාන්‍යයෙන් දේහයේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලි පාලනය කරයි. ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතිය සිතියු පේශි, හෘත් පේශි හා ග්‍රන්ථිවේ ක්‍රියාවලි පාලනය කිරීම සඳහා ආවේය ගෙන යන නියුරෝනවලින් සමන්විත ය.

- ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි.
 - අනුවේගී කොටස
 - ප්‍රත්‍යානුවේගී කොටස

ප්‍රත්‍යානුවේගී හා අනුවේගී ස්නායු පද්ධතිය




Figure 49.9 The parasympathetic and sympathetic divisions of the autonomic nervous system. Most pathways in each division involve two neurons. The axon of the first neuron extends from a cell body in the CNS to a set of PNS neurons whose cell bodies are clustered into a ganglion (plural, ganglia). The axons of these PNS neurons transmit instructions to internal organs, where they form synapses with smooth muscle, cardiac muscle, or gland cells.

- එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස ක්‍රියා කරන අනුවේගී හා ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු වර්ග දෙක ම මගින් දේහයේ ඇති අවයව වැඩි ගණනක් ස්නායු සැපයුම ලබයි.
- අනුවේගී උත්තේජන මගින් උද්දීපනය / පීඩාකාරී අවස්ථා හා ශක්ති උත්පාදනය කිරීමේ තත්ත්වවලට මුහුණදීම සඳහා දේහය සූදානම් කරයි (සටන් වැදීම හෝ පලායාම).
- ප්‍රත්‍යානුවේගී පද්ධතිය ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව ක්‍රියා කරමින් දේහය සන්සුන් බවට පත් වීම සඳහා පෙළඹවීම හෝ නැවත ස්වයංපාලන ක්‍රියාකාරීත්වයට පත් වී සිදු කරයි (විවේකය, ජීර්ණය සහ ආහාර අවශෝෂණය උත්තේජනය කරයි.)
- ඉහත කොටස් දෙකෙහි සමස්ත ක්‍රියාවලිය, සංවිධානය හා නිකුත් කරන සංඥා යන කරුණු පාදකව වෙනස් වේ.
- ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් නිකුත් වනුයේ මොළයේ පාදස්ථයෙන් හෝ සුෂුම්නාවෙන් පිළිවෙලින් කපාල ස්නායු හෝ සුෂුම්නා ස්නායු ලෙසිනි. එහෙත් අනුවේගී ස්නායු නිකුත් වනුයේ සුෂුම්නාවෙන් පමණි.
- පෙණහැලි, හෘදය, අන්ත්‍රය, මුත්‍රාශය වැනි විවිධ අවයවවල ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවලි දෙකක් ඉටු කිරීම සඳහා පද්ධති දෙකෙන් වෙනස් ස්නායු සම්ප්‍රේෂක භාවිතා කරයි.
- උදා: ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු පද්ධතිය මගින් ශ්‍රාවය කරනු ලබන ස්නායු සම්ප්‍රේෂක ද්‍රව්‍යය ඇසිවැල්කොටින් වන විට අනුවේගී කොටස මගින් නො එපිනෙප්‍රින් ස්‍රාවය කරයි.

මේ ඡායාරූපය වචන දැක්වීමට භාවිත කර ඇත.


ආයුර්වේදය

ස්නායු ආවේග උත්පාදනය හා සම්ප්‍රේෂණය සිදු වන ආකාරය

- නියුරෝන ඇතුළු සියලු සෛලවල සෛල අභ්‍යන්තරය හා බාහිර ප්‍රදේශය (බිත් සෛලීය තරලය) අතර අයන ව්‍යාප්තව ඇත්තේ අසමාකාරව ය.
- සාමාන්‍යයෙන් සෛල අභ්‍යන්තරය සෘණ ලෙස ආරෝපිත අතර, බාහිරය ධන ලෙස ආරෝපිතය.
- මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ආරෝපණ ජලාස්ම පටලය හරහා ආකර්ෂණය වන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පටලය හරහා විභව අන්තරයක් ඇති වේ.
- එය පටල විභවය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

අක්‍රිය විභවය


- අක්‍රිය තත්ත්වයේ ඇති නියුරෝනයක (සංඥාවක් ගමන් නොකරන විට/ සන්නයනයක් නොවන විට) ඇති පටල විභවය (පටලය හරහා වෝල්ටීයතා වෙනස) අක්‍රිය විභවය ලෙස හැඳින්වේ.
- සන්නයනයක් සිදු නොවන නියුරෝනයක අක්‍රිය විභවය දර්ශීය ලෙස -60mV සිට -80mV දක්වා අගයන් ගනී.



- අක්‍රිය පටල විභවය පවත්වා ගනු ලබන්නේ,

(1) නියුරෝනයේ පිටත හා ඇතුළත අයන සාන්ද්‍රණයන්හි ව්‍යාප්තිය

- ආවේගයක් ගමන් නොකරන අවස්ථාවේ ඇති නියුරෝනයක ඇතුළත K^+ සාන්ද්‍රණය ඉහළ අගයක් ගන්නා අතර, එහි පිටත Na^+ සාන්ද්‍රණය ඉහළ අගයක් ගනියි.
- Cl^- අයන සම්හරණයට අමතරව විශාල සෘණ අයන (ප්‍රෝටීන) සෛල තුළ පවතියි.
- එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නියුරෝනයේ ඇතුළත සෘණ ආරෝපණයක් ද පිටත ධන ආරෝපණයක් ද යට ගනියි.



අක්‍රිය විභවය සාපේක්ෂව ස්ථය. ATP හි භාවිතය මගින් Na^+ හා K^+ අයන පටලය හරහා ගමන් කරයි.

(2) Na^+ හා K^+ සඳහා ජලාස්ම පටලයේ වර්ණය පාරගම්‍යතාව

- ජලාස්ම පටලයට බැඳුණු ප්‍රෝටීනමය පොටාසියම් හා සෝඩියම් නාලිකා පිහිටයි.
- මෙම නාලිකා කාන්දුවන අතර, පොටාසියම් නාලිකා K^+ අයන පමණක් ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසන අතර, සෝඩියම් නාලිකා Na^+ අයනවලට පමණක් ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
- කාන්දුවන මේ නාලිකා මගින් සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයකට අනුව Na^+ හා K^+ අයනවලට විසරණය වීමට ඉඩ සලසයි.
- කෙසේ නමුත් Na^+ නාලිකාවලට වඩා සංඛ්‍යාවකින් කාන්දුවන K^+ නාලිකා විවෘතව පවතියි.
- මෙම පොටාසියම් නාලිකා රසායනික සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයක් මත පොටාසියම් අයන ශුද්ධ බිහි ගැලීමකට ඉඩ ලබා දෙයි.
- කෙසේ වෙතත් සෝඩියම් අයන සහ අනෙක් අයන වලට පටලය හරහා පහසුවෙන් ගමන් කළ නොහැකි වේ.
- එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සෛලය තුළ ශුද්ධ සෘණ ආරෝපණයක් හට ගනියි.

(3) සෝඩියම් - පොටාසියම් පොම්පය

- මෙමගින් සෛලයට පරිවහනය කරන සෑම K^+ දෙකක් සඳහා ම Na^+ තුනක් සෛලයෙන් පිටතට පරිවහනය කිරීමෙන් පටලය හරහා Na^+ හා K^+ අනුක්‍රමණයක් පවත්වා ගනී.
- මේ අයන සක්‍රීයව පරිවහනය කිරීම සඳහා මේ පොම්පය මගින් ATP භාවිතා කරයි.

ක්‍රියා විභවය (සාන්ද්‍ර අනුක්‍රමණයට පෙරහනක් ගත් ක්‍රියා විභවය)

- උත්තේජයක් හේතුවෙන් පටල විභවය වෙනස් වී (විචුලනය) පටල වෝල්ටීයතාවය යම්කිසි අගයකට වඩා වැඩි වූ විට (දේහලීය අගය) ක්‍රියා විභවයක් ඇති වේ.
- ක්‍රියා විභවයකට පහත සඳහන් කලා (අවධි) ඇත.

- විචුලනය
- ප්‍රතිචුලනය
- උපරිචුලනය

(1) විචුලනය

- සෛලයක පටල විභවය එහි පිටතට සාපේක්ෂව ඇතුළත අඩු සෘණ අගයක් වන පරිදි වෙනස් වීම විචුලනයයි.
- උත්තේජයකට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ජලාස්ම පටලයට බැඳුණු සෝඩියම් නාලිකා තුළින් Na^+ ඇතුළට ගලා ඒමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විචුලනය වේ.

මෝල්ටීයකරණයට පෙරෙහි Na^+ ගැලීම (සාන්ද්‍ර වන ප්‍රේමයෙන්.)


නියුරෝනයක ඇතුළත අයන සාන්ද්‍රණය

(2) ප්‍රතිද්‍රාවනය මෝල්ට් ක්ෂුණ්ණ ක්ෂණික K⁺ ගාලනය

- Na⁺ ඇතුළුව ගැලීම වළක්මන් සෝඩියම් නාලිකා වැසෙයි. කෙසේ නමුත් K⁺ බාහිර යාමට සලසමින් බොහෝ පොටාසියම් නාලිකා විවෘත වේ.
- මෙමඟින් සෛලය ඇතුළත ආරෝපණය සෘණ බවට පත් කෙරෙයි.

(3) උපරිද්‍රාවනය

- සෝඩියම් නාලිකා වැසී ඇති අතර, පොටාසියම් නාලිකා විවෘතව පවතී.
- එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පටලයෙහි ඇතුළත ආරෝපණය වඩාත් සෘණ බවට පත් වේ.



අනස්සව කාලය

- අනස්සව කාලය යනු සෝඩියම් නාලිකා අක්‍රීය වීමේ හේතුවෙන්
 - > ක්‍රියාවිච්ඡේදය වන ම පසුව ඇති වන
 - > නියුරෝනයකට වෙනත් උත්තේජයක් සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට නොහැකි වන,
 - > කෙටි කාල පරාසය (අනස්සව කාලයයි).


- මෙමඟින් අක්ෂයක ආවේගයක් ආපස්සට සන්නයනය වීම (ප්‍රත්‍යාවර්තනය) වැළැක්වේ.

ක්‍රියාවිච්ඡේද සන්නයනය (ස්නායු ආවේගය)

- අක්ෂයක් මස්සේ ගමන් කරන ක්‍රියාවිච්ඡේද ශ්‍රේණියක් ස්නායු ආවේගයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
- ක්‍රියාවිච්ඡේදයේ ජනනය වන්නේ Na⁺ අක්ෂයේ එක් ස්ථානයකින් ඇතුළුව ගැලීමෙනි (විද්‍රාවනය).
- ඒ අරමුණක් ස්ථානය ප්‍රතිද්‍රාවනය වන අතරතුර ක්‍රියාවිච්ඡේදය යාබද ස්ථානයකට පැතිරෙයි.
- මේ විද්‍රාවන, ප්‍රතිවිද්‍රාවන ක්‍රියාවලිය අක්ෂය මස්සේ ප්‍රත්‍යාවර්තනය වේ (නැවත නැවත ඇති වේ).
- මේ සන්නයනයේ වේගය පහත කරුණු මත රඳා පවතියි.

ස්නායු ආවේගයේ විද්‍රාවනයේ වේගය මත රඳා පවතියි. මෙය විද්‍රාවන තරංගයක් වේ.


- අක්ෂයේ විශ්කම්භය - සන්නයන වේගය අක්ෂයේ විශ්කම්භය වැඩි වීමත් සමඟ වැඩි වේ.
- මයිලීනීකුත අක්ෂය පැවතීම (මයිලීනීකුත නියුරෝනවල ක්‍රියාවිච්ඡේදය එක් අන්වීර්ණ ගැටයක සිට අනෙක අන්වීර්ණ ගැටය දක්වා පතිමින් ගමන් කරයි). මෙමගින්



උපාගමය

- උපාගම පැල්ම (උපාගම බෙන්ම) නම් වූ පටු හිඳැසක් හරහා නියුරෝනයක් (පූර්ව උපාගම සෛලය) වෙන්ත් සෛලයක් (පශ්චාත් උපාගම සෛලය) සමඟ සන්නිවේදනය සිදු කරන සන්ධියකි.
- පශ්චාත් උපාගම සෛලය වෙන්ත් නියුරෝනයක් හෝ පේශි සෛලයක් හෝ ස්ත්‍රී සෛලයක් හෝ විය හැකිය.
- රසායනික ද්‍රව්‍ය (ස්නායු සම්ප්‍රේෂක) භාවිතයෙන් එක් නියුරෝනයක් තවත් සෛලයක් සමඟ සන්නිවේදනය කරන සන්ධි රසායනික උපාගම නම් වෙයි.
- සමහර නියුරෝන අතර සන්නිවේදනය සෘජුව ම විද්‍යුත් සම්බන්ධතාවයක් හරහා සිදු වේ (විද්‍යුත් උපාගම).

රසායනික උපාගම හරහා ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණය වීමේ සිත්හුණය



- (1) අක්ෂය අග්‍රස්ථයේ දී ක්‍රියාවිච්ඡේදයක් මගින් පූර්ව උපාගම සෛලයේ ප්ලාස්ම පටලය විද්‍රාවනය කරයි.
- (2) පූර්ව උපාගම පර්යන්තයේ විද්‍රාවනය නිසා Ca²⁺ මේ අග්‍රස්ථය තුළට විසරණය වෙයි.
- (3) Ca²⁺ අයන සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම නිසා, ස්නායු සම්ප්‍රේෂක සහිත උපාගම ආශයිකා පූර්ව උපාගම පටලයට බැඳීමට හේතු වෙයි.

මෙය දිගින් දිගටම සිදුවේ. මෙය විද්‍රාවන තරංගයක් වේ.

(ඡන්ද්‍රා ආවේගය)


- (4) මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ ස්නායු සම්ප්‍රේෂක උපාගම පාල්ම තුළට නිදහස් වීමයි.
- (5) ස්නායු සම්ප්‍රේෂක උපාගම පාල්ම හරහා විසුරණය වෙයි.
- (6) ස්නායු සම්ප්‍රේෂක පශ්චාත් උපාගම පටලයෙහි ඇති විශිෂ්ට ප්‍රතිග්‍රාහකවලට බැඳී ඒවා සක්‍රීය කරයි.
- (7) ස්නායු සම්ප්‍රේෂකයකට උදාහරණයක් ලෙස ඇසිටයිල් කෝලින් ගත හොත් පශ්චාත් උපාගම පටලයට ස්නායු සම්ප්‍රේෂක ද්‍රව්‍ය බැඳීම මගින් පශ්චාත් උපාගම පටලය හරහා K^+ හා Na^+ අයන විසුරණය වීමට ඉඩ සලසයි.
- (8) පශ්චාත් උපාගම පටලයෙහි විද්‍රාවනාය සිදු වන අතර, එය ක්‍රියාවිභවය කරා ළඟා වෙයි.
- (9) ස්නායු ආවේගය පශ්චාත් උපාගම සෛලයට ගමන් කිරීමෙන් අනතුරුව පූර්ව උපාගම අක්ෂන අන්තයේ ඇති සංඥාව පහත සඳහන් කුමන ක්‍රමයකින් හෝ නවතාලයි.
 - ස්නායු සම්ප්‍රේෂක එන්සයිමය ජල විච්ඡේදනය
 - පූර්ව උපාගම පර්යන්ත තුළට ස්නායු සම්ප්‍රේෂක ප්‍රතිග්‍රාහණය

ස්නායු සම්ප්‍රේෂක

- ස්නායු සම්ප්‍රේෂක යනු
 - පූර්ව උපාගම නියුරෝනවල උපාගම පර්යන්තයෙන් නිදහස් වී
 - උපාගම පාල්ම හරහා විසුරණය වී
 - පශ්චාත් උපාගම පටලයේ ඇති ප්‍රතිග්‍රාහකවලට බැඳී,
 - ප්‍රතිචාරයක් උත්තේජනය කරන අණු වේ
- සුලභ ස්නායු සම්ප්‍රේෂක වනුයේ-
 - (1) ඇසිටයිල් කෝලින්
 - (2) සමහර ඇමයිනෝ අම්ල (ග්ලූටමික්)
 - (3) ජෛව ජනන ඇමීන්
 - (4) නියුරොපෙප්ටයිඩ්
 - (5) සමහර වායු වර්ග

ප්‍රතික වාපය

- පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ ස්නායු පද්ධතියේ කෘත්‍යමය ඒකකයයි. දර්ශීය ප්‍රතික වාපයක් නියුරෝන තුනකින් යුක්ත වෙයි.
 - (1) අභිවාහි/ සංවේදක නියුරෝන
 - (2) අන්තර්හාර නියුරෝන (ප්‍රමුඛ මූල)
 - (3) අපවාහි/ වාලක නියුරෝන
- සංවේදක නියුරෝන සංවේදක ප්‍රතිග්‍රාහකවල සිට මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කරා ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කරන අතර
- එය අන්තර්හාර නියුරෝනයක් සමඟ උපාගම සාදයි.
- මේ ආවේගය වාලක නියුරෝනයක් කරා සම්ප්‍රේෂණය වෙයි.
- වාලක නියුරෝනය මගින් මේ ආවේගය කාරක පටකය/ අවයවය වෙත ගෙන යනු ලැබේ.



ස්නායු පද්ධතිය හා සම්බන්ධ පොදු ආබාධ

පොදු ආබාධ වනුයේ

- (1) හින්තෝන්මාදය
 - හින්තෝන්මාදය සැබෑ තත්ත්වවලට වඩා විකෘති වූ සංජානනයෙන් යුක්ත ලාක්ෂණික මනෝ ව්‍යාධික කලාංගයන්ගෙන් (psychotic episodes) යුත් බරපතළ මානසික බාධාකාරී තත්ත්වයකි.
 - ඔවුන්ට පමණක් ඇසෙන කටහඩවල් ඔවුහු අත්දකිති.
 - අන් අය තමන්ට හිංසා කිරීමට සැලසුම් කරන බව ඔවුහු සිතති.
- (2) විශාදය
 - මොළයේ ස්නායු සම්ප්‍රේෂක මට්ටම්වල වෙනස් වීම් ප්‍රවේණික, මනෝවිද්‍යාත්මක, සාමාජික හා පාරිසරික සාධක වැනි කරුණුවල සංකීර්ණ සාධක එකතුවක් මගින් තත්ත්වයට බලපායි.
 - මේ රෝගයෙන් පෙළෙන්නන් දොම්නසට පත්වනවායක් මෙන් ම නිදා ගැනීමේ, ආහාර රුචියේ ශක්ති මට්ටම්වල අසාමාන්‍යතාවයක් පෙන්නුම් කරයි.
 - සමහර තත්ත්වවල දී යම් කාලයක දී විනෝදාත්මක කාර්යයන් තවදුරටත් සතුටුදායක හෝ රසවත්තාව සහිත නොවෙයි.
 - සමහර තත්ත්වයන් ඔවුන්ගේ මනෝභාවය අතිරේක වෙනස් කිරීමට (මනෝභාවය දෝලනය වීමට - mood swings) හේතු වෙයි.

මොළයේ සමහර ස්නායු සම්ප්‍රේෂකවල ක්‍රියාකාරී වැඩි කිරීමට ඵලදායී ප්‍රතිකාර ක්‍රම පවතියි.

(මොළයේ ආබාධයන් හා ඒවායේ ලක්ෂණ)

(3) ඇල්සයිමර් රෝගය

- මතකය නැති වීම හා මානසික ව්‍යාකූලතාව ලාක්ෂණික වූ බරපතළ මානසික පිරිහීමකි (ඩිමෙන්ශියා).
- තමා විසින් ආහාර ගැනීමට, ස්නානය කිරීමට හා ඇඳ පැලඳ ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් රෝගීන් තුළ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙයි.
- මිනිසුන් හඳුනා ගැනීමට ඇති හැකියාව හිලිහී යන අතර, ඉතා සමීප පවුලේ සාමාජිකයන් පවා හඳුනා ගැනීමට ඇති හැකියාව නැති වෙයි.
- මොළයේ, විශේෂයෙන් ම මස්තිෂ්ක බාහිකයේ නියුරෝනවල ප්‍රගාමී හා අප්‍රතිවර්ති භායනයක් නිසා මානසික ක්‍රියාකාරීත්වයේ පරිහානියක් සිදු වීම රෝගයට හේතු වේ.
- රෝගය බලපාන්නේ වයස්ගත පුද්ගලයන් සඳහා ය. ප්‍රවේණික සාධක ද හේතු විය හැකි ය.
- මෙතෙක් මේ රෝගය සඳහා ප්‍රතිකර්මයක් සොයා ගෙන නැත.

(4) පාකින්සන්ස් රෝගය

- පේශි චලනවල සමායෝජනය හා පාත්‍රීතාව නැති වී යාම ප්‍රගාමීව සිදු වන වාලක ආබාධ තත්ත්වයකි.
- චලනවල ප්‍රමාද බව, චලන ආරම්භ කිරීමට ඇති අපහසු බව, දුර්වල සම්බර බව, වෙනස් නොවන පේශි තානය නිසා මුහුණින් හැඟීම් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි වීම, කුර්පු ගැටලු ඇති වීම, පේශි චලන ගැස්ම ඇති වීම (muscle tremor). උදා: අතක, එක් අතක ඇඟිලිවල, අත් ඇඟිලිවල හා හිසෙහි සැලීම ඇති වීම.
- මේ රෝගය මොළයෙහි (මධ්‍ය මොළය, පාදස්ථ ගැංග්ලියා) ඩෝපමයින් ස්නායු සම්ප්‍රේෂක නිදහස් කරන නියුරෝනවල ක්‍රමික භායනයක් හා සම්බන්ධ ය.
- රෝගය වයස්ගත පුද්ගලයන් අතර බහුල ය.
- ප්‍රවේණික සාධක ද හේතු විය හැකි ය.
- රෝගයට ප්‍රතිකාර කළ හැකි නමුත් සුව කළ නොහැකි ය.



(මේ අ ස්වල්පයකි)
හෙබ්බා

Unit 05

සත්ත්ව ආකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය Animal Form & Function

සංවේදී අවයව

සංවේදක ප්‍රතිග්‍රාහකවල මූලික ලක්ෂණ

- (1) විශේෂ උත්තේජයක් ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂණය වූ ව්‍යුහයකි (සෛල/ ඉන්ද්‍රියයන්/ උප සෛලමය ව්‍යුහ).
- (2) උත්තේජය දේහලිය අගයේ හෝ ඊට වැඩි තත්ත්වයේ පවතින්නේ නම් ඒ උත්තේජය හඳුනා ගනී.
- (3) උත්තේජක ශක්තිය (උදා: ආලෝක ශක්තිය, ධ්වනි ශක්තිය) පටල විභව ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කර අවසානයේ දී ක්‍රියා විභවය ලෙස සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට සලසයි.
- (4) සෑම අවස්ථාවක දී ම ස්නායු පද්ධතියට සම්බන්ධව පවතී.
- (5) උත්තේජක ශක්තිය ක්‍රියා විභවය බවට පරිවර්තනයේ දී සංවේදක සංඥාව ශක්තිමත් කිරීම හෙවත් ප්‍රවර්ධනය කළ හැකි ය.
- (6) උත්තේජනය වීම නොකඩවා සිදුවන විට දී, බොහෝ සංවේදක, ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව අඩු කරන අතර, එය 'සංවේදන අනුවර්තනය' නම් වේ (උදා: ප්‍රබල ආක්‍රාණය නොකඩවා ලැබෙන විට මේ ආක්‍රාණයේ සංජානනය ක්‍රමයෙන් අඩු වී විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත නැවතීම සිදු වේ).
(6 මාසය තිස් වේ)

සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක වර්ග

- සංවේදක ඒවා මගින් හඳුනා ගන්නා උත්තේජවල ස්වභාවය මත පහත පරිදි වර්ග කළ හැකි ය.
- මානව දේහයේ ඇති ප්‍රතිග්‍රාහක වර්ග නම්,
 - (1) රසායනික ප්‍රතිග්‍රාහක
 - (2) තාප ප්‍රතිග්‍රාහක
 - (3) ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක (ඇස)
 - (4) යාන්ත්‍රික ප්‍රතිග්‍රාහක (කන)
 - (5) වේදනා ප්‍රතිග්‍රාහක


(1) රසායනික ප්‍රතිග්‍රාහක

- රසායනික ප්‍රතිග්‍රාහක ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ රසායනික උත්තේජකවලට ය.
- සංවේදී සෛල උත්තේජනය වීමට නම් රසායනික ද්‍රව්‍ය සෑම විට ම ජලයේ ද්‍රාවණගත වී තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
- රසායනික ප්‍රතිග්‍රාහක ලෙස රස ප්‍රතිග්‍රාහක සහ ආක්‍රාණ ප්‍රතිග්‍රාහක සලකනු ලබයි.
- ආක්‍රාණය සහ රස දැනීම සිදු වන්නේ රසායනික ප්‍රතිග්‍රාහක පාදක කර ගෙන ය.

- සංසරණය වන රුධිරයේ ඇති CO_2 වැනි සුවිශේෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් සමහර රසායනික ප්‍රතිග්‍රාහකවලට ඇත.

රස ප්‍රතිග්‍රාහක


- රස සංවේදක මූලික ලෙස
 - > පැණි රස,
 - > ඇමුල් රස,
 - > තිත්ත රස,
 - > ලුණු රස හා
 - > උමාම් රස (savoury taste) ලෙස, රස ආකාර පහක් විස්තර කරයි.
- රස ප්‍රතිග්‍රාහක සෛල ලෙස අපිච්ඡද සෛල විශේෂණය වී රසාංකූර ලෙස සංවිධානය වී ඇත.
- මෙම රසාංකූර දිවෙහි පවතින පිටිකා නම් වූ කුඩා (ප්‍රසර) ප්‍රසර්ජනයන් තුළ දක්නට ලැබේ.
- රසාංකූර සමන්විත වනුයේ රස සංවේදක සෛල, ආධාරක සෛල සහ සංවේදක ස්නායු අන්තවලිනි.
- රස දැනිය යුතු: රසායනික සංයෝග සංවේදක සෛලවල අවට ඇති තරලයේ දිය වී සංවේදක සෛල තුළට විසරණය විය යුතුයි. (තේට්ස්)



ආක්‍රාණ ප්‍රතිග්‍රාහක

- ආක්‍රාණ සංවේදක සෛල ලෙස පවතින්නේ ස්නායු සෛලයි.
- මේ ආක්‍රාණ සංවේදී සෛල පිහිටා තිබෙන්නේ, නාසයේ ඉහළ ප්‍රදේශයේ ඇති නාස් කුහර පියාසයේ ඇති අපිච්ඡද සෛල අතරයි.
- සංවේදක සෛලවල සංවේදී අන්ත, නාස් කුහරයේ ඇති ශ්ලේෂ්මල පටලය තුළට දික් වී ඇත. (ශ්ලේෂ්මල)
- ආක්‍රාණයට හේතු වන රසායනික සංයෝග එකී සංවේදී සෛල ආශ්‍රිතව ඇති ප්‍රදේශයට විසරණය වූ විට ප්‍රතිග්‍රාහක සෛල උත්තේජනය වේ.
- ජනනය වන ආවේග ඒවයේ අක්සන මස්සේ මොළයේ ඇති ආක්‍රාණ බල්බ කරා සම්ප්‍රේෂණය වේ.

දළු රස රසායන - අර්බුදාත්මක
මුත්රය රසායන - මංශාලයා
රසායන රසායන - රසායන
රසායන රසායන - රසායන




(2) කාර ප්‍රතිග්‍රාහක

- තාප ප්‍රතිග්‍රාහක යනු උණුසුම හා සීතල හඳුනා ගැනීම සඳහා විශේෂණය වූ උෂ්ණත්ව සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක වේ.
- මේ හඳුනා ගැනීම ශරීරයේ බාහිර පෘෂ්ඨයේ හා අභ්‍යන්තර යන පරිසර දෙකට ම අදාළ වේ.
- සමෙහි පිහිටා ඇති තාප ප්‍රතිග්‍රාහක මඟින් ශරීර මතුපිට උෂ්ණත්වය හඳුනා ගන්නා අතර
- හයිපොතැලමයේ ඇති තාප ප්‍රතිග්‍රාහක මඟින් අභ්‍යන්තර අවයව හරහා සිදු වන රුධිර සංසරණයේ උෂ්ණත්වය හඳුනා ගනී (මධ්‍ය උෂ්ණත්වය).
- සමෙහි උෂ්ණත්ව ප්‍රතිග්‍රාහක ආකාර තුනකි. එනම්
 - තුඩුස් අන්ත බල්බ (සිසිලස/ අඩු උෂ්ණත්ව හඳුනාගනී),
 - රවිනි දේහාණු (උණුසුම/ වැඩි උෂ්ණත්ව හඳුනාගනී) සහ
 - නිදහස් ස්නායු අන්ත (අඩු හා වැඩි උෂ්ණත්ව හඳුනා ගනී).
- හයිපොතැලමයයේ පිහිටි උෂ්ණත්ව ප්‍රතිග්‍රාහක විශේෂණය වූ ස්නායු සෛල වේ.

(3) ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක

- ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක ආලෝක සංවේදී වේ.
- මිනිසාගේ ප්‍රධාන ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක සෛල ආකාර දෙකක් පවතී. ඒවා යෂ්ටි සහ කේතු නම් වේ.
- යෂ්ටි: මේවා ආලෝක සංවේදී වුව ද වර්ථ වෙනස හඳුනා නොගනී.
- ඒවා මඟින් කළු හා සුදු වර්ණ ලෙස රාත්‍රී කාලයේ දී අපට පෙනීම ලබා දෙයි.
කේතු: මේවා මඟින් වර්ණ දෘෂ්ටිය ලබා දෙයි.

- එහෙත් රාත්‍රී කාලයේ දී එකරම් සංවේදී නොවන නිසා සුළු ලෙස රාත්‍රී පෙනීමට දායක වේ.
- කේතු ආකර තුනකි. මේ එක එකක් දායක වර්ණාවලියේ වර්ණ සඳහා වෙනස් වූ සංවේදන හැකියා පෙන්වුම් කරයි.
- මේවා රතු, කොළ හා නිල් ආලෝකය සඳහා ප්‍රශස්ත ප්‍රතිචාර ලබා දෙයි.



(4) යාන්ත්‍රික ප්‍රතිග්‍රාහක/ස්කන්ධ ප්‍රතිග්‍රාහක

- මේ ප්‍රතිග්‍රාහක ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ පීඩන, ස්පර්ශය, ඇදීම, වලන සහ ශබ්ද වැනි යාන්ත්‍රික ශක්තියේ සිදු වන වෙනස් වීම්වලට අදාළ උත්තේජ කෙරෙහි ය.
- මිනිස් දේහයේ හමු වන යාන්ත්‍ර ප්‍රතිග්‍රාහක සමහරක් පහත සඳහන් වේ.
- මේවා බොහෝ විට ස්ථානගතව ඇත්තේ මිනිස් සමෙහි මතුපිට ආසන්නයේ ය.
 - > මිස්තර් දේහාණු - මේවා සංවේදී වන්නේ සියුම් පීඩනවලට ය (කුඩා පීඩන වෙනස් වීම්).
 - > මර්කල් මධුර - මේවා සියුම් ස්පර්ශයට සංවේදී වේ.
 - > නිදහස් ස්නායු අන්ත ජූරේෂ සංවේදක ය.

පිටින ප්‍රතිග්‍රාහක:

- පැසිනියන් දේහාණු - මේවා ස්ථානගතව ඇත්තේ ගැඹුරු සමෙහි ය.
විශාල පිඩින වෙනස්කම්වලට මේවා සංවේදී වේ.

කම්පන ප්‍රතිග්‍රාහක:

- බොහෝ ස්පර්ශ ප්‍රතිග්‍රාහක කම්පන ද හඳුනා ගනී
- (උදා: මිස්තර් දේහාණු, පැසිනියන් දේහාණු).
- ඇතුළු කනේ ඇති කෝටි අවයවයෙහි ප්‍රවීණය රෝම සෛල මගින් ධ්වනි කම්පන හඳුනා ගනී.
- තව ද ඇතුළු කනේ ආලිත්ද නාලයෙහි ඇති රෝම සෛල මගින් ගුරුත්වය හඳුනා ගන්නා අතර අර්ධ චක්‍රාකාර නාලවල ඇති රෝම සෛල මගින් චලනය හඳුනා ගනී.


(5) වේදනා ප්‍රතිග්‍රාහක

- මේ ප්‍රතිග්‍රාහක මගින් හානිදායක අවස්ථාවන් දැක්වෙන උත්තේජක හඳුනා ගනී.

- ඒවා නම්
 - පිඩන අන්ත,
 - උෂ්ණත්ව අන්ත සහ
 - පටකවලට හානි සිදු විය හැකි සමහර රසායනික ද්‍රව්‍යයයි.
- දේහයේ විවිධ ස්ථානවල පවතින විශේෂ ස්නායු අන්ත මගින් පටක හානිය හඳුනා ගත හැකි ය.
- අවසානයේ දී මොළය මගින් මේදනාව සංජානනය කරයි.

මිනිස් ඇසේ මූලික ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකාරීත්වය

- පෙනීම සඳහා දායක වන ඉන්ද්‍රිය වන්නේ ඇසයි.
- එහි සියුම් පාරදෘශ්‍ය පටලයක් ඇති අතර, ඒ මගින් කාරා මණ්ඩලය සහ අක්ෂි ගෝලයේ ඉදිරිපස ආස්තරණය කරයි.
- එය අක්ෂිපටලය නම් වේ.
- ඇසෙහි බිත්තිය ස්තර තුනකින් සෑදී ඇත.
 - බාහිර තත්කූමය ස්තරය (ශ්වේත ඝන ස්තරය සහ ස්වච්ඡය),
 - මධ්‍ය වාහිනීමත් ස්තරය (රුධිරග්‍රාහිය, ප්‍රතියෝජක දේහය සහ කාරා මණ්ඩලය) සහ
 - ඇතුළු ස්නායුක ස්තරය (දෘෂ්ටි විකානය) වේ.
- අක්ෂි ගෝලය තුළ කාචය, අම්මය රසය සහ කාච රසය අන්තර්ගත ය.



ශ්වේත ඝන ස්තරය සහ ස්වච්ඡය

- ශ්වේත ඝන ස්තරය සුදු පැහැති ය; පාරාන්ධ ය.
- මෙය අක්ෂි ගෝලයේ පාර්ශ්විකව සහ අපර ප්‍රදේශයේ පිටතින් ම ඇති ස්තරයයි.
- මෙය ඉදිරියෙන් ඇති පැහැදිලි පාරදෘශ්‍ය අපිච්ඡද පටලයක් වන ස්වච්ඡය සමඟ සම්බන්ධව ඇත.
- ශ්වේත ඝන ස්තරය ඇසේ හැඩය පවත්වා ගැනීමට දායක වේ.
- තව ද එය ඇසෙහි බාහිර අක්ෂි පේශි සවි වීමට

(මංකුල රේඛ)

- පෘෂ්ඨයක් සපයයි.
- ආලෝක කිරණ ඇස තුළට ඇතුළු වන්නේ ස්වච්ඡය හරහා වන අතර අවසානයේ දී දෘෂ්ටිවිකානය මත නාභිගත වේ.
- ස්වච්ඡය ඇසේ පූර්ව ලෙස පවතින පාරදෘශ්‍ය උත්තල මුහුණකයි.
- මේ උත්තල භාවය ආලෝක කිරණ වර්තනය කර දෘෂ්ටි විකානය මත නාභිගත කිරීම සඳහා දායක වේ.
- රුධිරවාහිනී රහිත ය.

රුධිරග්‍රාහිය, ප්‍රතියෝජක දේහය සහ කාරා මණ්ඩලය

- රුධිරග්‍රාහිය පිහිටා ඇත්තේ ශ්වේත ඝන ස්තරයට වහා ම ඇතුළතිනි.
- මෙය රුධිරවාහිනීවලින් ගන්නා වන අතර තුනී වර්ණක සහිත ස්තරයකි.
- ප්‍රතියෝජක දේහ
 - මෙය රුධිරග්‍රාහියේ පූර්ව කොටසයි.
 - මේ ස්තරයේ සිනිඳු පේශි තත්තු (ප්‍රතියෝජක පේශි) සහ
 - සංවේදී අපිච්ඡද සෛල අන්තර්ගත වේ.
 - මේ සිනිඳු පේශි තත්තු බහුතරය වෘත්තාකාර පේශි වේ.
 - මේ නිසා මෙම ප්‍රතියෝජක පේශි වක්‍ර පිඩානයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
 - මේ ප්‍රතියෝජක පේශි අක්ෂි කාචය අවලම්බක බන්ධනී මගින් ස්ථානගත කරයි.
 - මේ අවලම්බක බන්ධනීවලට සම්බන්ධ ප්‍රතියෝජක පේශි තත්තුවල සංකෝචන හා ඉහිල් වීම මගින් අක්ෂි කාචයේ ඝනකම සහ ප්‍රමාණය පාලනය කළ හැකි ය.
 - අපිච්ඡද සෛල මගින් අම්මය රසය ස්‍රාවය කරයි.

කාරා මණ්ඩලය

- මෙය වෘත්තාකාර හැඩැති වර්ණවත්, පේශිමය ප්‍රාවරයක් වන අතර, එය වර්ණක සෛලවලින් සෑදී ඇත.
- ඇසෙහි ඉදිරිපස පිහිටා ඇත.
- මෙය පිහිටන්නේ ස්වච්ඡයට පිටුපසින් සහ කාචයට ඉදිරියෙනි.
- ප්‍රතියෝජක දේහයෙන් පූර්ව ලෙසට මෙය විහිදී ඇත.
- කාරා මණ්ඩලයේ සිනිඳු පේශි තත්තු ස්තර දෙකක් ඇති අතර ඒවා වෘත්තාකාර හා අරිය ගොනු ලෙස සංවිධානය වී ඇත.
- කාරා මණ්ඩලයේ කේන්ද්‍රීයව පිහිටා ඇති විවරය කණිනිකාව නම් වේ.
- කණිනිකාව හරහා ඇතුළු වන ආලෝක ප්‍රමාණය කාරා මණ්ඩලය මගින් පාලනය කරයි.
- මෙය සිදු කරන්නේ ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතියේ මැදිහත් වීමෙන් කණිනිකාවේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමෙනි.
- වර්ණක මගින් අධික ආලෝකය විනිවිද යෑම වළකාලයි.

මෙහි වූ රේඛි තරාඞ්ව වේ. : ආලෝක

කණිකාව හරහා යයි.

මහත්තංගුරු ජේෂ්වලාල් ජ්‍යෙෂ්ඨ ඥාණේන්ද්‍රයා - කෘතියක වූ ව්‍යාපාරයක් ලෙස දැනුවත් වීම.
 ක්‍රියාකාරී 2024 වර්ෂයේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජකාරි - කෘතියක වූ සංකෘතියක් ලෙස දැනුවත් වීම.
 ක්‍රියාකාරී 2024 වර්ෂයේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජකාරි - කෘතියක වූ සංකෘතියක් ලෙස දැනුවත් වීම.


• කාචය

- මෙය කණිනිකාවට වහා ම පිටුපසින් පිහිටා ඇත.
- මෙය ද්වි උක්තල ප්‍රත්‍යස්ථ පාරදෘශ්‍ය මඩලකි.
- එය ප්‍රේෂිතවලින් සෑදී ඇති අතර පාරදෘශ්‍ය කොපුවකින් ආවරණය වී ඇත.
- මෙය මඟින් ඇස ඉදිරියේ වස්තුවෙන් පරාවර්තනය වී ඇසට ඇතුළු වන ආලෝක කිරණ වර්තනය කර දෘෂ්ටිවිකානය මතට නාභිගත කර ප්‍රතිබිම්බය සාදයි.
- දෘෂ්ටිවිකානය මතට ආලෝකය නාභිගත කිරීම සඳහා කාචයේ වර්තන බලය අවශ්‍ය පරිදි සකස් කිරීම කාචයේ ඝනකම වෙනස් කිරීම මඟින් සිදු කෙරේ.

අම්මය රසය සහ කාච රසය

- ඇසේ කාචයට ඉදිරියෙන් ඇති ප්‍රදේශය අම්මය රසය නම් වූ පැහැදිලි ජලීය මාධ්‍යයකින් පිරී පවතී.
- (මේ තරලය ගලායන තල අවහිර වීම නිසා ග්ලූකොමා නම් වූ පෙනීම නැති වීම සිදු වන රෝගී තත්ත්වය ඇතිවේ).
- රුධිර සැපයුමක් රහිත ස්වච්ඡය, කාචය හා කාච ප්‍රාවරය වෙත පෝෂණය සැපයීම හා අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම අම්මය රසය මඟින් සිදු කෙරේ.
- අක්ෂි කාචයට පිටුපසින් පාරදෘශ්‍ය අවරණ ජෙලියම ස්වභාවය දරන කාච රසය නම් වූ ද්‍රව්‍ය දක්නට ලැබේ.
- මෙය මඟින් රුධිරග්‍රාහීයට එරෙහිව දෘෂ්ටිවිකානය මත ඇති කරන අන්ත:අක්ෂි පීඩනය (ocular pressure) පවත්වා ගෙන යෑම සිදු කිරීම හා අක්ෂි ගෝලය ඇතිවීම (collapsing) වළක්වා ගැනීම සිදු කරයි.

දෘෂ්ටිවිකානය



- මෙය අක්ෂි ගෝලයේ ඇතුළතින් ම ඇති ස්තරය වන අතර, ස්තර තුනකින් සමන්විත වෙයි.

• එනම්;

- බාහිර වර්ණධර අපිච්ඡදය,
- මධ්‍ය ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක ස්තරය සහ
- ස්නායු සෛල සහිත අභ්‍යන්තර ස්තරයයි.
- ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක ස්තරය තුළ සංවේදී සෛල වර්ග දෙකකි.
- එනම්; යෂ්ටි සෛල සහ කේතු සෛල යනුවෙනි.
- මේවායෙහි අන්තර්ගත ආලෝක සංවේදී වර්ණක මඟින් ආලෝක කිරණ පටල විභව වෙනසක් බවට පරිවර්තනය කරයි.
- දෘෂ්ටිවිකානයේ ඝනකම වැඩි ම වන්නේ පිටුපස ඇති ප්‍රදේශයේ ය.
- දෘෂ්ටිවිකානයේ අපර ප්‍රදේශයේ මධ්‍යයේ කහ ලපය හමු වේ.
- කහ ලපයේ මධ්‍යයේ කුඩා අවපාතනයක් ලෙස මධ්‍ය කුපය පවතින අතර, එහි ඇත්තේ කේතු සෛල පමණි.
- දෘෂ්ටිවිකානයේ පූර්ව ප්‍රදේශ දෙසට වන්නට කේතුවලට වඩා යෂ්ටි ඇත.
- කහ ලපයේ සිට 0.5cmක් පමණ නාසය දෙසට වන්නට දෘෂ්ටිවිකානයේ ඇති සියලු ස්නායු තන්තු අභිසාරී වී දෘෂ්ටික ස්නායුව සාදයි.
- දෘෂ්ටික ස්නායුව ඇසෙන් පිට වී යන ස්ථානයේ දෘෂ්ටිවිකානය මත ඇති කුඩා ප්‍රදේශය අන්ධ බිත්දුව නම් වේ.
- මේ ස්ථානයේ ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක වන යෂ්ටි හෝ කේතු සෛල අන්තර්ගත නොවේ.

ආලෝක සංවේදී සෛල

- ආලෝක සංවේදී සෛල ආකාර දෙකක් පවතින අතර, ඒවා කේතු සෛල හා යෂ්ටි සෛල නම් වේ.
- මේ සෛලවල බාහිර කොටස තුළ ගොනු ලෙස පවතින පටලමය මඩලවල දෘෂ්ටි වර්ණක ග්ලිසී පවතී.
- දෘෂ්ටිවිකානයේ කේතුවලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යෂ්ටි ඇත.
- යෂ්ටි සෛලවල රොඩොප්සින් නම් වූ දෘෂ්ටි වර්ණකය ඇත.
- මේවා අලෝක සංවේදී වන අතර, වර්ණ වෙනස හඳුනා ගත නොහැකි ය.
- එබැවින් රොඩොප්සින් මඟින් රාත්‍රියේ පෙනීම ලබා දෙන අතර කළු සහ සුදු ලෙස පමණක් දිස් වේ.
- කේතු සෛලවල ඇති දෘශ්‍ය වර්ණකය වන්නේ ට්‍රොඩොප්සින් ය.
- මේවා වර්ණ දෘෂ්ටිය ලබා දෙන අතර, රාත්‍රි පෙනීම සඳහා අඩු දායකත්වයක් දක්වයි.
- එයට හේතුව වන්නේ අඩු සංවේදීතාවයි.
- කේතු සෛල වර්ග තුනක් ඇති අතර, එක එකක් මඟින් දෘශ්‍ය වර්ණාවලිය කෙරෙහි වෙනස් වූ සංවේදීතාව දක්වනු ලැබේ.
- ඒවා
 - රතු
 - කොළ සහ

අදාළ වර්තනවලින් දෘශ්‍ය වන ක්‍රමය සලකා බැලීමට දෘශ්‍ය වර්ණකය බිඳ වැටී යන්නේ නිදහස වී යාම නිසා ක්‍රියා වන බැවින් ඒවා නම් කරනු ලබයි.

➤ අක්ෂි ප්‍රතියෝජනය,
ප්‍රතියෝජක දේහය වෙත සැපයෙන ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු මගින් පාලනය වේ.

- සමීප පෙනීමේ දී වස්තුව වෙත නාභිගත වීම සඳහා ඇස ස්ථානගත කිරීම (අක්ෂි ප්‍රතියෝජනය) ඉතා වැදගත් වෙයි.
- සමීප පෙනීමේ ක්‍රියාවලියේ දී ප්‍රතියෝජක පේශි සංකෝචනයෙන් ප්‍රතියෝජක දේහය ඇතුළු පැත්තට සහ කාචය දෙසට චලනය වේ.
- මෙහි ප්‍රතිඵලය ලෙස කාචයේ උත්තල භාවය ඉහළ යනු ලැබේ.
- මෙයට හේතුව වන්නේ කාචයට සම්බන්ධ අවලම්භක බන්ධනිවල ඇදීම අඩු වීමයි.
- මේ නිසා ආසන්න වස්තුවලින් ලැබෙන අලෝක තරංග දෘෂ්ටිවිකානය මතට නාභිගත වෙයි.
- දුර ඇති වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කරන විට දී ප්‍රතියෝජක පේශි ඉහළ වේ.
- මේ නිසා ප්‍රතියෝජක දේහය කාචයෙන් පිටතට චලනය වේ.
- මේ මගින් කාචයේ අවලම්භක බන්ධනිවල ඇදීම ඉහළ යයි.
- එක් සමඟ ම කාචයේ උත්තල භාවය අඩු වීම නිසා දුර ඇති වස්තුවලින් ඇසට ඇතුළු වන ආලෝක කිරණ, දෘෂ්ටිවිකානය මත නාභිගත වෙයි.

දෘෂ්ටිවිකානය මත ප්‍රතිබිම්බ නාභිගත කිරීම සහ ආලෝක ශක්තිය ක්‍රියා විභවය බවට පරිවර්තනය කර මොළය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම

- වස්තුවේ සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ වර්තනය වී (නැමී) දෘෂ්ටිවිකානය මතට නාභිගත වේ.
- මේ ක්‍රියාවලියේ දී දෘෂ්ටිවිකානය මත ඇති වන ප්‍රතිබිම්බය යටිතලු එකකි.
- ආලෝක කිරණ දෘෂ්ටිවිකානය මත පතිත වන විට එහි ඇති ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක සෛලවල (යෂ්ටි සහ කේතු) රසායනික වෙනස් වීම් සිදු වේ.
- ප්‍රකාශ ප්‍රතිග්‍රාහක මගින් ලැබෙන තොරතුරු ද්විධ්‍රැව සෛල වෙතට ළඟා වේ.
- සෑම ගැංග්ලියම් සෛලයක් ම ද්විධ්‍රැව සෛල කිහිපයකින් තොරතුරු එක්රැස් කර ගනී.
- මීට අමතරව දෘෂ්ටි විකානයේ තොරතුරු එහි ඇති පූර්වීක්ෂ ස්නායු සෛල මගින් සමෝධානය කරයි.
- ගැංග්ලියම් සෛල එක්ව දෘෂ්ටික ස්නායු තන්තු සාදන අතර, ඒ සංවේදනය ඇසේ සිට දෘෂ්ටික ස්නායුව මස්සේ මොළය කරා සම්ප්‍රේෂණය වන්නේ ක්‍රියාවිභවයක් ලෙසයි.
- මේ වෙනස් වීම මගින් ස්නායු ආවේගයක් ඇති කරයි.
- මෙසේ හට ගත් ස්නායු ආවේගය එතැන් සිට මස්තිෂ්කයේ අපර කපාල බණ්ඩිකාව මත පිහිටන දෘෂ්ටික බාහිකය වෙත යොමු කරයි.
- මෙතැන දී දෘශ්‍ය වස්තු නිවැරදි ආකාරයට (නිවැරදි උඩුකුරු ආකාරයට) මොළය විසින් සංජානනය කරයි.

- රුධිරග්‍රාහයේ කාර්යය වන්නේ දෘෂ්ටිවිකානයේ ප්‍රතිග්‍රාහක සෛල උත්තේජනයෙන් පසුව ආලෝක කිරණ අවශෝෂණයයි.

මිනිසාගේ ඒකනේත්‍රික හා ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටිය


- මිනිසාගේ ඇස් යුගල ම ස්ථානගතව ඇත්තේ මුහුණේ ඉදිරිපසින් වන අතර, එය ඇස් දෙකෙහි ම සමායෝජනයෙන් පෙනීමේ කාර්යාවලිය සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි.
- එසේ වුව ද එක් ඇසකින් පමණක් දෘෂ්ටික ක්ෂේත්‍රය දැකිය හැකි ය.
- මෙසේ දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍ර පෙනීම එක් ඇසකින් පමණක් සිදු වීම ඒකනේත්‍රික දෘෂ්ටිය නම් වේ.
- කෙසේ නමුත් එක් ඇසක් පමණක් භාවිතයේ දී ක්‍රිමාණ දෘෂ්ටිය සිදු නොවන අතර, විශේෂයෙන් ඒ නිසා දුර හා වේගය යන ඒවා පිළිබඳ තීරණය කිරීම අසීරු වේ.
- මිනිසාගේ අක්ෂි දෙක මගින් දකින දෘෂ්ටික ක්ෂේත්‍ර ඉතා හොඳින් එකට අතිපිහින වන අතර, එය ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටිය නම් වේ.
- වම් ඇස මගින් දෘෂ්ටික ක්ෂේත්‍රයේ වම් පස වැඩිපුර දර්ශනයට යෙදේ.
- එසේ ම දකුණු ඇසින් දෘෂ්ටික ක්ෂේත්‍රයේ දකුණු පැත්ත වැඩිපුර දර්ශනයට යෙදේ.
- එක් එක් ඇස මගින් යම් දර්ශනයක් දෙස පුළු කෝණික වෙනසකින් බැලුවේ වුව ද, එක් එක් ඇසේ දෘෂ්ටික ක්ෂේත්‍ර දෙක මධ්‍යයට වන්නට අතිපිහින වේ.
- අවසානයේ දී සංජානනය වන්නේ එක් ප්‍රතිබිම්බයක් පමණි.
- මේ ක්‍රියාවලියේ දී සිදු වන්නේ ඇස් දෙකෙන් ම පැමිණෙන වම්, දකුණු හා මධ්‍යම දෘෂ්ටික ක්ෂේත්‍ර ප්‍රතිබිම්බ මස්තිෂ්ක අපර කපාල බණ්ඩිකාව කොටසේ දී අතිපිහින වීම මගින් එය ක්‍රිමාණ තනි ප්‍රතිබිම්බයක් සේ සංජානනය වීමයි.
- ඒකනේත්‍රික දෘෂ්ටිය මෙන් නොව, ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටියේ දී ක්‍රිමාණ ලෙස වස්තුව නිරීක්ෂණය කළ හැකි ය.
- මේ ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටිය තමා වෙත ළඟා වන වස්තුවක (වාහනයක් වැනි) වේගය, දුර ආදිය විනිශ්චයේ දී ඉතා වැදගත් වේ.
- ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටිය යම් වස්තුවක් වෙනත් වස්තුවකට සාපෙක්ෂව පවතින දුර, ගැඹුර, උස හා පළල වඩා නිවැරදිව නිර්ණය කිරීමට දායක වේ.
- සමහර පුද්ගලයන්ගේ ද්විනේත්‍රික දෘෂ්ටිය දුර්වල වී ඇත. මේ අය තමා වෙත ළඟා වන වස්තුවක පිහිටන දුර, වේගය පිළිබඳ විනිශ්චය කිරීමේ දී අපහසුතාවට පත් වේ.

මිනිස් කනෙහි ව්‍යුහය

- මිනිස් කන ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදා ඇත.
- එනම් බාහිර කන, මැද කන සහ ඇතුළු කන වශයෙනි.

බාහිර කන

- බාහිර කන සමන්විත වන්නේ කන් පෙත්ත සහ බාහිර ශ්‍රවණ නාලයෙනි.
- බාහිර ශ්‍රවණ නාලය S හැඩයෙන් යුතු මදක් වක්‍ර වූ නාලයකි.
- එය රෝම සහිත හමෙන් ආස්තරණය වී ඇති අතර ඉටි බදු වූ ද්‍රව්‍යයක් (කලාදුරු) ප්‍රාචය කරන විකරණය වූ ස්වේද ග්‍රන්ථිවලින් යුක්තයි.
- මේ බාහිර ශ්‍රවණ නාලය කර්ණපට්‍ර පටලය (මැද කන සහ බාහිර කන අතර පිහිටා ඇති) දක්වා විහිදී ඇත.



මැද කන




Figure 8.3 The auditory ossicles.

- මැද කන (කර්ණපට්‍ර කුටීරය) යනු වාතයෙන් පිරී ඇති ඔබක අස්ථිය තුළ පවතින කුටීරයකි.
- මෙය සරල අපිච්ඡදයකින් ආස්තරණය වී ඇත.
- මැද කන හා ඇතුළු කන අතර පිහිටි මධ්‍ය බිත්තියේ විවර දෙකක් පිහිටා ඇත.
- ඒවා නම් අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය සහ ගෝලාකාර ගවාක්ෂයයි.
- අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය ධරණකය නම් වූ කුඩා අස්ථිකාවක් මඟින් ආවරණය වී ඇත.
- ගෝලාකාර ගවාක්ෂය තුනී තන්තුමය පටකයකින් වැසී ඇත.
- මැද කන තුළ ශ්‍රවණ අස්ථිකා තුනක් ඇති අතර ඒවා මුද්ගරිකාව, නිසානිය සහ ධරණකය නම් වේ.
- මේ අස්ථි වලනය විය හැකි සේ එකිනෙක සන්ධානය වී ඇත.

- කර්ණපට්‍ර පටලයේ සිට අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය දක්වා මැද කනෙහි ස්ථානගතව ඇත.
- මුද්ගරිකාව, කර්ණපට්‍ර පටලය සමඟ ස්පර්ශව ඇති අතර, නිසානිය සමඟ වලනය විය හැකි සන්ධියක් පරිදි සන්ධානය වේ.
- නිසානිය ධරණකය සමඟ සන්ධානය වී ඇති අතර, ධරණකය අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයට හේත්තු වී ඇත.
- දිගු නාලයක් වන යුස්ටේකිය ප්‍රණාලය මඟින් මැද කන ග්‍රහණිකාවට සම්බන්ධ කරයි.

ඇතුළු කන




Figure 8.5 A cross-section of the cochlea showing the spiral organ (of Corti).

- ඇතුළු කන නිර්මාණය වී ඇත්තේ ඔබක අස්ථිය තුළ ඇති ජාලාකාර නාල පද්ධතියක් සහ කුටීරවලින් යුත් අස්ථිමය ගහනයෙනි.
- මේ අස්ථිමය ගහනය තුළ තරල පිරුණ ජාලාකාර පටලමය ගහනය ඇත.
- එමඟින් අස්ථිමය ගහනය ආස්තරණය කර පුරවා ඇත.
- ඇතුළු කන ප්‍රධාන ප්‍රදේශ තුනකින් නිර්මිත ය
- ඒවා නම්
 - > අලින්දය,
 - > අර්ධ චක්‍රාකාර නාල තුන සහ
 - > කර්ණ ඔබය වේ.
- අලින්දය මැද කන ආසන්නයේ ප්‍රසාරණය වී ඇති කොටසයි.
- අලින්දයේ පාර්ශ්වික බිත්තියේ අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය හා ගෝලාකාර ගවාක්ෂය පිහිටා ඇත.
- අලින්දයෙහි ප්‍රධාන පටලමය මඩ් දෙකක් ඇති අතර
- ඒවා කුම්භිකාව හා මඩ්චිවිය වේ.
- අර්ධ චක්‍රාකාර නාල එකිනෙකට ලම්බක තල තුනක පිහිටා ඇති නාල තුනකි.
- ඒවා අලින්දය සමඟ සන්තතිකව පිහිටා ඇත.

- කර්ණ ශබ්දය යනු දඟරමය ව්‍යුහයක් වන අතර, පාද්‍යව ප්‍රසාරණය වූ ස්වභාවයක් දරයි.
- මෙය ද අලින්දය සමඟ සන්තතික ය.
- කර්ණ ශබ්දය ප්‍රධාන කොටස්/ කුටීර තුනකින් සෑදී ඇත.
- ඉහළින් ඇති නාලය අලින්ද නාලය වන අතර, පහළින් පිහිටා ඇත්තේ කර්ණ පටහ නාලය වන අතර මධ්‍යව ඇත්තේ කර්ණ ශබ්ද ප්‍රණාලය නම් වූ කුඩා නාලයකි.
- කර්ණ ශබ්ද ප්‍රණාලය මගින් ඉහළින් පිහිටි අලින්ද නාලය හා පහළින් පිහිටි කර්ණ පටල නාලයෙන් වෙන් කරයි.
- අලින්ද නාලය හට ගන්නේ අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයෙන් ය.
- කර්ණපටහ නාලය අවසන් වන්නේ ගෝලාකාර ගවාක්ෂයෙනි. ඉහත නාල දෙක ම එකිනෙක සමඟ සන්තතිකව පවතින අතර, ඒවා පරිවසා තරලයෙන් පිරී ඇත.
- කර්ණශබ්ද නාලය, පටලමය ගහනයේ කොටසක් වන අතර, අන්තෝ වසා තරලයෙන් පිරී ඇත.
- කර්ණශබ්ද නාලයේ පාදස්ථ පාදාශ්‍ර පටලය වේ.
- පාදාශ්‍ර පටලයේ කෝර්ටි අවයවය පිහිටා ඇත.
- මේ කෝර්ටි අවයවය සෛල සහ ශ්‍රවණ සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක හෙවත් යාන්ත්‍රික ප්‍රතිග්‍රාහක දරන විශේෂණය වූ කර්ණ ශබ්ද රෝම සෛලවලින් නිර්මිත ය.
- මේ කර්ණශබ්ද රෝම සෛලවල ඇති රෝම වැනි ව්‍යුහ කර්ණශබ්ද ප්‍රනාලය තුළට යොමු වී ඇත.
- බොහෝ රෝම කෝර්ටි අවයවයේ ඇති ටෙක්ටම් පටලයට සම්පව පවතී.
- ටෙක්ටම් පටලය කෝර්ටි අවයව මගින් එල්ලෙමින් ඇත.
- රෝම සෛල සංවේදක නියුරෝන වල අනුශාඛිකා සමඟ උපාගම තනන අතර එම සංවේදක නියුරෝන එකතු වී අවසානයේ මොළය කරා ස්නායු ආවේග සපයන ශ්‍රවණ ස්නායු වී සෑදේ.

මිනිස් කනෙහි ක්‍ෂණ

ශ්‍රවණය

- කම්පනය වන වස්තු මගින් අවට වාතයේ පීඩන තරංග ඇති කරයි.
- ශ්‍රවණයේ දී කන් මගින් මේ පීඩන තරංග (යාන්ත්‍රික උත්තේජන) පටල විභව වෙනසක් බවට පත් කරන අතර, පසුව ඒවා ස්නායු ආවේග ලෙසට පාරනයනය (transduce) වී මොළය කරා සම්ප්‍රේෂණය වීමෙන් එය ශබ්දය ලෙස සංජානනය වෙයි.
- බාහිර කන විසින් ශබ්ද තරංග එකතු කිරීම, සාන්ද්‍රගත කිරීම හා ඒවා ශ්‍රවණ නාලය ඔස්සේ කර්ණපටහ පටලය වෙත යොමු කිරීම සිදු කරයි.
- මේ ශබ්ද තරංග මගින් කර්ණපටහ පටලය කම්පනය කරවයි. කර්ණපටහ පටල කම්පන, එකිනෙක හා සම්බන්ධිත ශ්‍රවණ අස්ථිකා තුනෙහි වලන මගින් ප්‍රවර්ධනය කර මැද කන හරහා සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

- ශ්‍රවණ අස්ථිකා මගින් මේ කම්පන කර්ණශබ්ද පෘෂ්ඨයේ පිහිටි අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
- ධරණකය අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයට එරෙහිව කම්පනය වන විට කර්ණ ශබ්දයේ ඇතුළත ඇති පරි වසා තරලය තුළ පීඩන තරංග ඇති වේ.
- අලින්ද නාලය තුළට ඇතුළු වන තරල පීඩන තරංග වැඩි කොටසක් කර්ණශබ්ද ප්‍රණාලයේ අන්තෝවසා තරලයට සම්ප්‍රේෂණය වී එමගින් පාදස්ථ පටලය මත තෙරපීමක් ඇති කරයි.
- මේ හේතුවෙන් පාදාශ්‍ර පටලය හා ඊට සම්බන්ධිත රෝම සෛල ඉහළට හා පහළට කම්පනය වේ.
- මෙය රෝම සෛලවලින් තෙරා ඇති රෝම වැනි ව්‍යුහ ඒවාට ඉහළින් ඇති අවල ටෙක්ටම් පටලය හා ගැටී නැවී යාමට හේතු වෙයි.
- මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රවණ රෝම සෛලවල ඇති ශ්‍රවණ ප්‍රතිග්‍රාහක උත්තේජනය වී ස්නායු ආවේගයක් ඇති වේ.
- මෙයින් හට ගන්නා ස්නායු ආවේග ශ්‍රවණ ස්නායුව හරහා මස්තිෂ්කයේ ශබ්ද බණ්ඩිකාවේ පිහිටා ඇති ශ්‍රවණ ප්‍රදේශය වෙත ළඟා වීමෙන් ශබ්දය සංජානනය වේ.
- ශබ්ද සංජානනයෙන් පසුව මේ තරල තරංග අවසානයේ දී ගෝලාකාර ගවාක්ෂයේ පටලය කම්පනය කරමින් මැද කන වෙත පැතිරෙයි.
- යුස්ටේකියා නාලය මගින් කර්ණපටහ පටලය දෙපස වායු පීඩනය වායුගෝලීය පීඩන අගයෙහි පවත්වා ගනියි.

සම්තුලිතතාව


- ඇතුළු කනෙහි පිහිටා ඇති අර්ධ චක්‍රාකාර නාල හා අලින්දය විසින් අවකාශය තුළ හිසෙහි පිහිටීම පිළිබඳ තොරතුරු සපයන අතර ඉරියව් හා සම්බරතාව පවත්වා ගැනීමට ද දායක වේ.
- අලින්දයේ ඇති තුම්බිකාව හා මඩිවිවිය ගුරුත්වය හා රේඛීය චලනයන්ට අදාළව පිහිටීම සංජානනය කරයි.
- මේ අන්තෝවසා තරලය පිරී කුටීරය තුළ, කැල්සියම් කාබනේට් අංශු (කර්ණාශ්ම/otolith) හිලි පවතින ජෙලිමය ද්‍රව්‍යයක් තුළට තෙරා ඇති රෝම සෛල හමු වේ.
- හිස ඈල වී ඇති විට (tilted) ජෙලි මාධ්‍යය තුළට තෙරා ඇති රෝම මත කර්ණාශ්ම තෙරපේ.
- මේ උත්කූලණය රෝම සෛල ප්‍රතිග්‍රාහක මගින් පටල විභව වෙනස් වීමක් බවට පරිවර්තනය කරන අතර පසුව ස්නායු ආවේග ලෙස පරිවර්තනය කරන අතර පසුව ඒවා ස්නායු ආවේග ලෙස අනුමස්තිෂ්කය වෙත ළඟාවේ.
- අවකාශය තුළ ලම්භක තල තුනක පිහිටා ඇති අර්ධ චක්‍රාකාර නාල කෝණික චලනයන් හඳුනා ගනියි.
- ජෙලිමය වැස්මක් තුළට තෙරා ඇති රෝම සහිත රෝම සෛල ගොනුවක් සෑම නාලයක් තුළ ම සෑදී ඇත.
- හිසෙහි පිහිටීම වෙනස් වන විට පරිවසා තරලයේ හා

අන්තඃචයා කරලයේ වලනයන් ඇති වේ.

- මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රෝම සෛල උත්තේජනය වී ඉන් හට ගන්නා ස්නායු ආවේග මොළය වෙත සම්ප්‍රේෂණය වේ.

මානව සමේ ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකාරීත්වය

- මිනිස් දේහයේ විශාලතම අවයවය වන්නේ සමයි.
- එය ප්‍රධාන ස්ථර දෙකකින් සමන්විත ය.
- ඒවා නම් අපිචර්මය හා වර්මයයි.
- සමට යටින් ඇති ස්කරය අධිශ්වර්මය වන අතර, එය මේද පටක හා අරියල පටකවලින් තැනී ඇත.



අපිචර්මය ඉබ්බවර්මය වේද ප්‍රකාශය සමග (විද්‍යාත්මක) (සමග)

- සමෙහි පිටතින් ම ඇති ස්කරය අපිචර්මයයි.
- එය කෙරටිනිහවනය වූ (කෙරටිනිහන) ස්ථරිහන ශල්කමය අපිච්ඡදයෙන් සමන්විත ය.
- අපිචර්මයට රුධිර සැපයුමක් නැත.
- එහෙත් වර්මයේ වූ අන්තරාල තරලය (interstitial fluid) මගින් එහි වූ ගැඹුරු ස්කරවලට පෝෂණය හා ඔක්සිජන් සපයන අතර ඒ තරලය පසුව වසා සෛල ලෙස බැහැරව යයි.
- සෛලීය ස්කර ගණනාවක් අපිචර්මයේ දැකිය හැකි ය.
- එහි අභ්‍යන්තරයේ ම පවතින ස්කරය වන්නේ ජනක ස්කරයයි.
- එමගින් නිරතුරුව ම අපිචර්මය සෛල ජනනය කරයි. ඒ සෛල, සමේ මතුපිටට ක්‍රමයෙන් තල්ලු වන අතර ඒවා ක්‍රමයෙන් වෙනස්කම්වලට භාජනය වේ.
- මතුපිට පවතින සෛල, පැතලි, තුනී නාස්ට් රහිත සහ අජීවී වන අතර, ඒවායේ සෛල ස්පර්ශමය තන්තුමය ප්‍රෝටීනයක් වන කෙරටින් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.
- තව ද මතුපිට ස්කරයේ ඇති සෛල නිරන්තරයෙන් ගැලවී යන අතර ඊට යටින් ඇති සෛල මගින් ඒවා ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.
- සමෙහි නිරතුරුව භාවිත වන ගෙවී යාමට ලක්විය හැකි ස්ථානවල අපිචර්මය සන වී පවතී (උදා: අල්ල, ඇඟිල්, පතුල වැනි)
- අභ්‍යන්තර ජනක ස්කරයේ ඇති මෙලනොසයිට් මගින්

මෙලනින් නම් තද පැහැ වර්ණක ස්‍රාවය කරන අතර, ඒවා සමට වර්ණයක් ලබා දීම සඳහා දායක වේ.

- මීට අමතරව,
 - වර්මයෙහි රුධිරය කොතෙක් දුරට ඔක්සිජන්වලින් සංතෘප්ත ද යන වග සහ
 - මේද ස්කරයේ ඇති වැඩිපුර පිත් වර්ණක හා
 - කැරොටින් ප්‍රමාණය ද
 - සමෙහි වර්ණය සඳහා බලපායි.

වර්මය

- වර්මය අරියල සම්බන්ධක පටකවලින් තැනී ඇත.
- පුරකයේ ඉලාස්ටික් තන්තු හා කොලැජන් තන්තු එකිනෙකට සම්බන්ධ වී දැකිය හැකි ය.
- කොලැජන් තන්තු ජලය සමග බැඳී සමට ආතනාශක්තිය ලබා දේ.
- වර්මයෙහි අඩංගු ප්‍රධාන සෛල ලෙස, තන්තු සෛල, මහා භක්ෂාණ සෛල හා කුඩා සෛල දැක්විය හැකි ය.
- වර්මයේ ඇති ව්‍යුහ වන්නේ,
 - රුධිර සහ වසා වාහිනී
 - සංවේදී ස්නායු අන්ත
 - ස්වේද ග්‍රන්ථි
 - ස්නේහසෘවී ග්‍රන්ථි
 - රෝම, රෝම උද්ගාමක පේශි
 - සංවේද ප්‍රතිග්‍රාහක
- (මයිස්තර් දේහාණු, පැයින්යන් දේහාණු, නිදහස් ස්නායු අන්ත, ක්‍රමයෙන් අන්ත බල්බ, රෝගී අවයව, මරකල් මඩල)

මිනිස් සමෙහි කෘත්‍ය

(1) ආරක්ෂාව -

- ක්ෂුද්‍රජීවී ආසාදනවලට, රසායනික හා භෞතික ද්‍රව්‍ය ඇතුළු විමට හා විජලනයට එරෙහිව ආරක්ෂක බාධකයක් ලෙස සම ක්‍රියා කරයි.
- සාපේක්ෂව ජලයට අපාරගමය කෙරටිනිහන අපිච්ඡදයක් සමෙහි අඩංගු වේ.
- මේ ස්කර මගින් ගැඹුරින් ඇති ස්කර හා වඩාත් සියුම් ව්‍යුහ ආරක්ෂා වේ.
- බාහිර ආසාදන ද්‍රව්‍ය හක්සෙලකතාව මගින් විනාශ කරන විශේෂණය වූ ප්‍රතිශක්තිකරණ සෛල ද සමෙහි අඩංගු වේ.
- තව ද මෙලනින් වර්ණක UV කිරණවලින් ඇති කරන හානිකර බලපෑමවලට එරෙහිව ද ක්‍රියා කරයි.

(2) දේහ උෂ්ණත්ව යාමනය -

- සිරුරේ අවශ්‍යතාව මත, තාපය පිට කිරීම හෝ ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ගයක් සැපයීම මගින් දේහ උෂ්ණත්ව යාමනය සඳහා, සම දායක වේ.
- සාමාන්‍ය පරාසයට වඩා දේහ උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිය විට, ස්වේද ග්‍රන්ථි මගින් සම මතුපිටට ස්වේදය ස්‍රාවය කරයි.

(36.5°C - 37.5°C)
උෂ්ණත්ව පරාසය



6 ක්‍රමයන්
ජනන 6 ක්‍රමය
හා ද්‍රව්‍ය වල වෙනස

- ඉන් පසු ස්වේදය වාෂ්ප වීමෙන් දේහය මතුපිට සිසිල් කරයි. තාප ආතතියක් ඇති වූ අවස්ථාවල දී ධමනිකා විස්තාරණය මගින් සමෙහි කේශනාලිකා තුළින් රුධිර ගලනය වැඩි කරමින් තාප හානි වීමට ඉඩ සලස්වයි.
- සාමාන්‍ය පරාසය අභිබවා දේහ උෂ්ණත්වය පහළ ගිය විට වර්මයේ ඇති ධමනිකා සංකුචනය වීම මගින් සමෙහි කේශනාලිකා තුළින් තාපය හානි වීම අවම කළ හැකි ය.
- එමෙන් ම අධික ශීතල ආතති අවස්ථාවල රෝමවලට සම්බන්ධව ඇති උද්ගාමක පේශි සංකෝචනය වීම මගින් දේහයේ තාපය ජනනය කළ හැකි අතර එය තාපය නිපදවීමට දායක වේ.

(3) වර්මීය සංවේදීතාව

- ස්පර්ශයට, පීඩනයට, උෂ්ණත්වයට සහ වේදනාවට සංවේදී, සංවේදක ප්‍රතිචාරයක් සමෙහි අඩංගු වේ.
- ඒවා උත්තේජනය මගින් ස්නායු ආවේග ජනනය කර මස්තිෂ්කයේ සංවේදන සංජානනය සඳහා යොමු කරයි.

(4) විටමින් D සංශ්ලේෂණය

- සම හිරු එළියට නිරාවරණය වීමේ දී සමෙහි ඇති ලිපිඩමයාද්‍රව්‍ය විටමින් D බවට පරිවර්තනය කරයි.

(5) බහිස්ප්‍රාවය -

- බහිස්ප්‍රාවයට පුළු වශයෙන් දායක වන අවයවයකි.
- සම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්, යුරියා සහ සුවඳමය ද්‍රව්‍ය (සුදුසු වැනි) ස්වේද සමග බහිස්ප්‍රාවය විය හැකි ය.

ප්‍රජනනය

සතුන් අතර දැකිය හැකි ප්‍රජනන ක්‍රම

- ප්‍රජනනය යනු ජීවින්ගෙන් නව එකෙකෙසේත් පරපුරක් බිහි කරන ජෛවීය ක්‍රියාවලියකි.
- සතුන් අතර ප්‍රජනන ආකාර දෙකක් දැකිය හැකි ය.
- එනම් අලිංගික ප්‍රජනනය හා ලිංගික ප්‍රජනනයයි.
- බොහෝ සතුන් සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රජනනය ක්‍රමය හෝ එක ම ක්‍රමය වන්නේ ලිංගික ප්‍රජනනයයි.
- විශේෂයෙන් අපෘෂ්ඨවංශීන් අතර අලිංගික ප්‍රජනනය ආකාර කිහිපයක් දැකිය හැකි ය.

අලිංගික ප්‍රජනනය

අලිංගික ප්‍රජනනය යනු

- ඩිම්බ හා ශුක්‍රාණු භාවිතයෙන් තොරව
- එක් ජනකයකු විසින්
- නව එකෙකෙසේත් ජනනය කරන ක්‍රියාවලියකි.
- අලිංගික ප්‍රජනනය, සම්පූර්ණයෙන් ම අනුනත සෛල විභාජනය මත රඳා පවතී.
- තනි ජනකයකු ශීඝ්‍ර ලෙස විශාල ජනිතයන් සංඛ්‍යාවක් ගුණනය වීම සඳහා අලිංගික ප්‍රජනනය දායක වේ.

අර්ථශාමකව ගත දිගුරූ වේ.

- ප්‍රජනනය සඳහා සහායකයන් සෙවීමට කාලයක් හෝ ශක්තියක් වැය වීමක් හෝ සිදු නොවේ.
- නිපදවූ ජනිතයන් එකිනෙකාට මෙන් ම තනි ජනකයාට ද ප්‍රවේණිකව සර්වසම වේ.
- අපෘෂ්ඨවංශිකයන් අතර අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රම කිහිපයක් ම දැකිය හැකි ය.
- එනම්;

- (1) අංකුරණය,
- (2) කඩ කඩ වීම,
- (3) පුනර්ජනනය සහ
- (4) පාතනෝද්භවය යි. (කොමාරෝද්භවය).

(1) අංකුරණය

- අංකුරණය අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රමයක් වන අතර, සතුන්ගේ බාහිරයට වැඩෙන කොටසකින් නව ජනිතයෝ බිහි වෙති.
- උදා: හයිඩ්‍රා (Hydra) - අනුනතව විභාජනය වන සෛල ගොනුවක් සහිත ස්ථානයකින් කුඩා හයිඩ්‍රාවක් විකසනය වී, අනතුරුව මවු ජීවියාගෙන් ගැලවී වෙන්ව යයි.

(2) කඩ කඩ වීම සහ පුනර්ජනනය

- මෙය ද අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රමයක් වන අතර දේහයේ හෝ දේහ කොටසක් කැබලි කිහිපයකට කැඩී ගොස් ඒ එක් එක් කොටසකින් වෙන් වූ ජනිතයෙක් වර්ධනය වේ.
- ජීවියාගේ කැඩී ගිය කොටස නැවත වර්ධනය වීමෙන් (පුනර්ජනනය) අඩුපාඩු වූ ශරීරයේ කොටස් සම්පූර්ණ කර ගනිමින් ජීවියකු බවට පත් වේ.

- උදා: සමහර ඇතෙලිඩාවෝ, බොහෝ ස්පොන්ජන්, නිඩාරියාවෝ,

(3) පාතනෝද්භවය

- මෙය අසාමාන්‍ය අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රමයකි.
- ඩිම්බයක් සංසේචනයකින් තොරව පූර්ණ ජීවියෙකු බවට විකසනය වීම මෙහි දී සිදු වේ.
- අපෘෂ්ඨවංශීන් අතර මී මැස්සන්, කුහුඹුන්, කුඩින්තන් හා බඹරුන් ආදී සමහර සතුන් අතර පාතනෝද්භවය සිදු වේ.

- ප්‍රජනිතයන් ඒකගුණ හෝ ද්විගුණ විය හැකි ය.
- මී මැසි ගහනයක පිරිමි-මැස්සන් සරු ඒකගුණ පරිණතයන් වන අතර පාතනෝද්භවයෙන් විකසනය වේ.

- එහෙත් ගැහැණු මැස්සන් අතර නිසරු වැඩකාර මැස්සියන් හා සරු රැජිනක් යන දෙවර්ගය ම දැකිය හැකි ය.

- මොවුහු ද්විගුණ පරිණතයන් වන අතර සංසේචිත ඩිම්බවලින් විකසනය වෙති. පෘෂ්ඨවංශිකයන් අතර පාතනෝද්භවය දැකිය හැක්කේ ඉතා කලාතුරකිනි (උදා: සමහර කටුස්සන් හා මත්ස්‍යයන්).

(අන්‍ය උදාහරණ අංශවේගය - ගෝලීය ජීවීන් බැඳුණු ජීවීන් වේ.)

ලිංගික ප්‍රජනනය යනු

- > ජනකයන් දෙදෙනෙකු (පිළිවෙලින් පුරුෂ හා ස්ත්‍රී ජනකයින්) විසින්
- > නිපදවනු ලබන ඒකගුණ ජන්මාණු (ශුක්‍රාණුවක් හා ඩිම්බයක්) සංයෝගයෙන් බිහි වන
- > ද්විගුණ යුක්තාණුවෙන් නව ජනිතයකු විකසනය වීමේ ක්‍රියාවලියයි.
- ජායා ජන්මාණුව - එනම් ඩිම්බය - විශාල, අවල වන අතර
- පුං ජන්මාණුව එනම් ශුක්‍රාණුව සාමාන්‍යයෙන් කුඩා සහ සවිල වේ.
- ජායා හා පුං ජන්මාණු හා විමෙන් ද්විගුණ සෛලය හෙවත් යුක්තාණුව සෑදේ.
- යුක්තාණුවෙන් අනුනතව විකසනය වන ජීවියා පසුව උෞතනය විහාරනය මඟින් ජන්මාණු සාදයි.
- බොහෝ සතුන්ගේ ප්‍රජනනය ප්‍රධාන වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණ ලෙස ම ලිංගික වේ.

ජන්මාණු සෑදීම

- සතුන්ගේ ප්‍රජනක සෛල ලෙස හැඳින්වෙන ජන්මාණු (ශුක්‍රාණු හා ඩිම්බ) යනු එක් පරම්පරාවක සිට අනෙක් පරම්පරාවට ජාන සම්ප්‍රේෂණය කරන වාහක වේ.
- සෑම ජන්මාණුවක් ම ඒකගුණ, ඒක සෛලීය ප්‍රජනක සෛල වේ.
- සතුන්ගේ ප්‍රජනෝත්ප්‍රිය (ගොනාඩ) නම් විශේෂිත අවයව තුළ උෞතනය මඟින් ජන්මාණු සෑදේ.

ද්විලිංගික ජීවියා හා ඒක ලිංගික ජීවියා

- ද්විලිංගික ජීවියකු පුං හා ජායා යන ප්‍රජනක ව්‍යුහ දෙක ම දරයි (Hermaphrodite).
- එහෙයින් එකම ජීවියාට පුං හා ජායා ජන්මාණු යන දෙවර්ගය ම නිපදවීමේ හැකියාව ඇත (උදා: ගැටවිලා).
- ඒක ලිංගික ජීවියකු (dioecious) තුළ පුං හෝ ජායා යන ප්‍රජනක ව්‍යුහ වර්ග දෙකෙන් එකක් පවතී.
- ඒ නිසා ජායා ජන්මාණු වෙත වෙන ම ජීවීන් තුළ නිපදවේ (උදා: මිනිසා).

සංසේචනය

- යුක්තාණුවක් සෑදීම සඳහා ඩිම්බයක් හා ශුක්‍රාණුවක් (ජන්මාණු) එකතු වී ඒවායේ න්‍යෂ්ටි හා වීම සංසේචනයයි.
- මෙය බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර ලෙස සිදු විය හැකි ය.

බාහිර සංසේචනය:

- ජලීය පරිසරයේ සිදු වේ.
- බාහිර සංසේචනය දක්වන විශේෂයන්හි ගැහැනු ජීවියා ඩිම්බ ද පිරිමි ජීවියා ශුක්‍රාණු ද බාහිර පරිසරයට නිදහස් කරයි. සංසේචනය ජලයේ දී සිදු වේ.
- බාහිර සංසේචනය සඳහා තෙතමනය සහිත පරිසරය

සෑම විට ම අභ්‍යවකාශ වන අතර, එමඟින් ජන්මාණු විශුද්ධ වැළැක්වීම ද ශුක්‍රාණුවට ඩිම්බය කරා පිහිනා යාම පහසු කිරීම ද සිදු කරයි.


- උදා: බොහෝ අපෘෂ්ඨවංශීහු, උභය ජීවීහු බොහෝ අස්ථික මත්ස්‍යයෝ.

අභ්‍යන්තර සංසේචනය:

- ශුක්‍රාණු, ස්ත්‍රී ප්‍රජනක මාර්ගයේ හෝ ඊට ආසන්නව තැන්පත් කරන අතර, සංසේචනය ස්ත්‍රී ප්‍රජනක මාර්ගය තුළ සිදු වේ.
- (උදා: කෘමීහු, උරගයෝ, ක්ෂීරපායීහු) අභ්‍යන්තර සංසේචනය; පරිසරය විශුද්ධ වීම ද ශුක්‍රාණුවට ඩිම්බය වෙත ළඟා වීමට හැකි වීම සඳහා දක්වන අනුවර්තනයක් ලෙස සැලකිය හැකි ය.
- පිරිමි සංසර්ග අවයව මඟින් ශුක්‍රාණු නිදහස් කරන අතර ගැහැනු ප්‍රජනක මාර්ගයේ ඒවා තැන්පත් කර ගැනීමට හා පරිණත ඩිම්බ වෙත ශුක්‍රාණු පරිවහනයට දායක වන ග්‍රාහක පවතී.
- අභ්‍යන්තර සංසේචනයේ දී බාහිර සංසේචනයට වඩා ජන්මාණු සුළු සංඛ්‍යාවක් නිපදවයි.
- එහෙත් යුක්තාණුවේ පැවැත්ම ඉතා ඉහළින් තහවුරු වේ.
- අභ්‍යන්තර සංසේචනයේ දී කලලයට ද ඉතා විශාල ආරක්ෂාවක් සැපයේ.
- බොහෝ සත්තු මාපිය රැකවරණය සලසති. අභ්‍යන්තර සංසේචනය පෙන්වන පක්ෂීන්ගේ හා උරගයන්ගේ සංසේචන ඩිම්බ කවචයකින් හා අභ්‍යන්තර පටලවලින් ආවරණය වී ඇත.
- එමඟින් ජල හානියෙන් හා භෞතික හානිවලින් ඩිම්බ ආරක්ෂා කරයි.
- තවත් සමහර ජීවීහු විකසනයේ යම් අවධියක් දක්වා ස්ත්‍රී ප්‍රජනක මාර්ගය තුළ කලලය රඳවා තබා ගනිති.


අලිංගික ප්‍රජනනය හා ලිංගික ප්‍රජනනයේ වැදගත්කම

- අලිංගික හා ලිංගික ප්‍රජනනය වැදගත් ජෛවීය ක්‍රියාවලි වන අතර, එමඟින් විශේෂයක පැවැත්ම තහවුරු වේ.
- තනි ජනක ජීවියකුගෙන් ශීඝ්‍ර ලෙස ගුණනය වී එකෙකෙයින් නිපදවීම අලිංගික ප්‍රජනනයේ දී සිදු වේ.
- ප්‍රජනනය සඳහා සහායකයන් සෙවීමට කාලයක් හෝ ශක්තිය වැය වීමක් සිදු නොවේ.
- ප්‍රජනිතයන් එකිනෙකාට හා තම ජනක ජීවියාට ප්‍රවේණිකව සර්වසම බැවින් ගහනයක් තුළ ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන නැත (හෝ දැකිය හැක්කේ ස්වල්පයකි).
- එහෙයින් අලිංගික ප්‍රජනනය ස්ථායී, පරිසර හිතකාමී තත්ත්ව යටතේ ඉතා වාසිදායක ක්‍රමයකි.
- එමඟින් වඩාත් සාර්ථක ප්‍රවේණි දර්ශ විශිෂ්ට ලෝ ව්‍යාප්ත කළ හැකි ය.
- එසේ නමුත් ජනක සෛලවල යම්කිසි විකෘතියක් ළ හොත් වෙනස් වන පරිසරය තුළ ප්‍රජනිතයන් පැවැත්ම සඳහා එය අහිතකර බලපෑම් ඇති විය හැකි ය.



- ජීවියකුගේ අතිතකර විකෘතියක් ඇත් නම්, පරිසර වෙනස්වීමක් ගහනයේ සියලු ජීවීන්ට මාරාන්තික ලෙස බලපෑමට හැකියි.
- අලිංගික ප්‍රජනනය මෙන් නොව, ලිංගික ප්‍රජනනයේ දී ජනකයන් දෙදෙනාගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය එක් වී එක් අනන්‍ය ජනිතයකු බිහි කරයි.
- ලිංගික ප්‍රජනනයේ දී සිදු වන උෞතන ප්‍රතිසංයෝජනය වෙනස් වූ ප්‍රවේණි දර්ශ බිහි වීමට උපකාර කරයි.
- මෙසේ අනන්‍ය ජාන සංයෝජන බිහි වීම වෙනස් වන පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන විශේෂ බිහි වීමට හා ප්‍රජනකව සාර්ථක විශේෂ බිහි වීමට දායක වේ.
- ප්‍රතිසංයෝජනයේ ඇති වන ඇතිවන වාසිදායක ජාන සංයෝජනය නිසා අනුවර්තනය වේගවත් වේ.
- ලිංගික ප්‍රජනනයේ දී ජාන මිශ්‍ර වී හේතුවෙන් අතිතකර ජාන කවචල ගහනයෙන් පහසුවෙන් ඉවත් වීම විශේෂයේ පැවැත්ම හොඳින් තහවුරු කරයි.

මානව පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියේ ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකාරීත්වය



- පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර ව්‍යුහ ලෙස වෘෂණ (ගොනැඩ්), අපිවෘෂණ, අතිරේක ග්‍රන්ථි හා ප්‍රණාල දැක්විය හැකි ය.
- වෘෂණ මගින් ශුක්‍රාණු හා ප්‍රජනක හෝමෝන නිපදවයි.

- අපිවෘෂණ මගින් පරිණත ශුක්‍රාණු සංචිත කර තබා ගනී.
- අතිරේක ග්‍රන්ථි ශුක්‍රාණු වලනයට අවශ්‍ය කරල ස්‍රාවය කරයි.
- ප්‍රණාල, පරිණත ශුක්‍රාණු හා ග්‍රන්ථිමය ස්‍රාව පරිවහනය කරයි.
- බාහිර පුරුෂ ප්‍රජනක අවයව ලෙස වෘෂණ කෝෂ හා ශිෂ්ණය දැක්විය හැකි ය.

වෘෂණ කෝෂ

- දේහ බිත්තියේ නැමුමකින් සෑදුණු මල්ලක් ආකාරයේ ව්‍යුහයකි.
- මෙය කුටීර දෙකකට බෙදේ. (වම් / දකුණු)
- එක් එක් කුටීරය තුළ වෘෂණයක්, අපිවෘෂණයක් සහ ශුක්‍ර රජ්ජුවේ කොටසක් පිහිටයි.
- එය මගින් වෘෂණ, වෘෂණ කෝෂය තුළ අවලම්බනය වී ඇත.


වෘෂණ

- මේවා වෘෂණ කෝෂ තුළ පැවතීමෙන් ඒවා දේහයේ අභ්‍යන්තර අවයවවල පවතින උෂ්ණත්වයට (core body temperature) වඩා 2°C කින් පමණ අඩු උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගත හැක.
- දේහ උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වය යටතේ වෘෂණ පවතින විට පමණක් ශුක්‍රාණු ජනනය ඉතා හොඳින් සිදු කරයි.
- වෘෂණ උදර කුහරයේ විකසනය වන අතර උපතට වහා ම පෙර වෘෂණ කෝෂ තුළට අවරෝහණය වේ.
- වෘෂණ අඩු උෂ්ණත්වයෙන් පවත්වා ගැනීමට, ඒවා ශරීරයෙන් පිටත පිහිටීම හා වෘෂණ කෝෂයේ කුහි ආවරණයකින් වැසී තිබීම වැදගත් වේ.
- එක් එක් වෘෂණයක් බණ්ඩකා කිහිපයකින් සෑදී ඇත.
- එක් බණ්ඩකාවක් තුළ තදින් දඟර ගැසුණු (සංවලිත වූ) පුඩු ලෙස ශුක්‍රධර නාලිකා පිහිටයි.
- මේ නාලිකා තුළ ශුක්‍රාණු නිපදවයි.
- ශුක්‍රාණු ජනනය සිදු කරනු ලබන විවිධ සෛල ශුක්‍රධර නාලිකාව තුළ පිහිටි විශේෂිත ආධාරක සෛල ආකාරයක් වන සටෝලි සෛල මගින් වට වී ඇත.
- සටෝලි සෛල, ශුක්‍රධර නාලිකා බිත්තියේ සිට එහි කුහරය වෙතට විහිදී පවතී.
- මේ සෛල ඉන්හිබිත් හෝමෝනය ස්‍රාවය කරන අතර ශුක්‍රාණු ජනනයේ විවිධ අවස්ථාවල ඇති සෛලවලට සවි වීමට පෘෂ්ඨයක් හා ඒවාට පෝෂණය සපයයි.
- ශුක්‍රධර නාලිකා අතර පිහිටි සම්බන්ධක පටකයෙහි ගිලී ඇති ලේඩ් සෛල (අන්තරාල සෛල) කාණ්ඩ දැකිය හැකි ය.
- වැඩිවියට පැමිණි පසු නාලිකා තුළ ශුක්‍රාණු ජනනය දිරි ගන්වනු ලබන ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් හා අනෙකුත් ඇන්ඩ්‍රොජන් ලේඩ් සෛල මගින් ස්‍රාවය කරයි.
- ශුක්‍රධර නාලිකා එක් වී වෘෂණවල ඉහළ කොටසේ දී තනි නාලිකාවක් සාදයි.

අපිවෘෂණය

- වෘෂණවල එකතු වී ඇති ශුක්‍රධර නාලිකාවලින් සම්භවය වූ, නැවත නැවත නැවුම් සෑදෙන දිගු නාලය, තදින් ඇසිරී සකන්ධයක් ලෙස පිහිටන ව්‍යුහයක් ලෙස අපිවෘෂණය හැඳින්විය හැකි ය.
- ශුක්‍රධර නාලිකාවල සිට ශුක්‍රාණු අපිවෘෂණයට යොමු කෙරේ.
- මෙය වඩාත් දික් වූ කොටසක් හෙයින් (6m පමණ) ශුක්‍රාණුවකට මේ දුර ගමන් කිරීමට නාලය තුළ සති තුනක් පමණ ගත වේ.
- මේ කාලය අතරතුරේ දී ශුක්‍රාණු පරිණත වී සවිල වේ.
- විසර්ජන අවස්ථාව දක්වා පරිණත ශුක්‍රාණු ගබඩා කරනුයේ අපිවෘෂණය තුළ ය.

ශුක්‍ර නාලය, විසර්ජක ප්‍රණාලය, මුත්‍ර මාර්ගය හා ශිෂ්ණය



- ශුක්‍ර නාලය නම් ප්‍රේෂිමය නාලය මගින් එක් එක් අපිවෘෂණ සිට ශුක්‍රාණු නිසර්ජනයේ දී පිටතට පැමිණේ.
- ශුක්‍ර නාල (එක් එක් අපිවෘෂණයේ සිට) යුගලය මුත්‍රාශය වටා අපරව දික් වී ශුක්‍ර ආශයිකාවල සිට පැමිණෙන නාල සමඟ එක් වී කෙටි විසර්ජක ප්‍රණාලය නැනේ.
- විසර්ජක ප්‍රණාලය මුත්‍ර මාර්ගයට විවෘත වන අතර ඒ මාර්ගය මුත්‍ර බහිස්සාවයට හා ශුක්‍ර තරලයේ ඇති ශුක්‍රාණු ස්ත්‍රී ප්‍රජනක මාර්ගයට පරිවහනයට දායක වේ.
- ශිෂ්ණය තුළින් මුත්‍ර මාර්ගය දිව යන අතර, එය ශිෂ්ණයේ අගයෙන් පිටතට විවෘත වේ.
- ශිෂ්ණය රුධිර කේශනාලිකා හා ශිරා විකරණය වීමෙන් සෑදුණු උද්ගාමක පටක සහිත කොටසකි.

(මෙම ඡායාරූපය බැලීම)

ශුක්‍රාණුජනනය

- පුං ජන්මාණු ඇති කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ශුක්‍රාණු ජනනයයි.
- ඊට, ශුක්‍රාණු මාතෘ සෛලවලින් ශුක්‍රාණු සෛල ඇති කිරීම ද, ශුක්‍රාණු සෛලවල උෞනන විභාජනය ද, එක් ශුක්‍රාණු සෛලයකින් සෑදෙන ප්‍රාක් ශුක්‍ර හතරක් විකරණය වී ශුක්‍රාණු සෑදීම ද අයත් වේ.
- වෘෂණවල ශුක්‍රධර නාලිකාවල ශුක්‍රාණු ජනනය සිදු වේ.
- ශුක්‍රධර නාලිකාවක විශිෂ්ට මාතෘ සෛලයකින් පරිණත ශුක්‍රාණු සෛල නිපදවීමට ගත වන කාලය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා සති හතක් පමණ වේ.
- පරිනත පුරුෂයන් තුළ සිදුවන ශුක්‍රාණු ජනනය හා විකසනය අඛණ්ඩව සිදුවන අතර එය අවිනශ්‍ය (inexhaustible) ක්‍රියාවලියකි.
- ශුක්‍රාණුජනන ක්‍රියාවලියේ දී සෛල විභාජනය හා පරිනත වීම ශුක්‍රධර නාලිකා පුරා සිදු වේ.
- එක් දිනයක් තුළ දී සිදුවන ශුක්‍රාණුජනනයේ දී ශුක්‍රාණු මිලියන සිය ගණනක් නිපද වේ.
- අණ්ඩජනනය (පසුව විස්තර කරනු ලැබේ) සමඟ සැසඳීමේ දී ශුක්‍රාණු ජනනයේ දී එක් එක් ප්‍රාථමික ශුක්‍රාණු සෛලයකින් උෞනනය මගින් නිපදවන සෛල හතර ම පරිණත ශුක්‍රාණු බවට විකසනය වේ.
- වැඩිවියට පත් වීමේ දී අරඹන ශුක්‍රාණු ජනනය ජීවිත කාලය පුරා සිදු වේ.
- අඛණ්ඩව සිදු වන ක්‍රියා පිළිවෙළකින් පූර්වජ සෛලවලින් පරිණත ශුක්‍රාණු නිපදවීම ශුක්‍රාණු ජනනයේ දී සිදු වේ.


ශුක්‍රාණුජනනයේ ප්‍රධාන පියවර

- කලල අවස්ථාවේ ඇති වෘෂණවල මූලික (primordial) ජන්මාණු සෛල (2n), අනුනනයෙන් බෙදීමෙන් හා ඒවා විකසනයෙන් ශුක්‍රාණු ඇති කරන ශුක්‍රාණු මූලික සෛල ඇති කරයි.
- මේ මූලික සෛල ශුක්‍රධර නාලිකාවල දාරයේ පිහිටයි.
- පරිණත වෘෂණවල විවිධාකාරයේ පරිණත අවධිවල ඇති සෛල හා ජනනය වූ ශුක්‍රාණු, ශුක්‍රධර නාලිකාවල අභ්‍යන්තර දෙසට චලනය වේ.
- පරිණත වෘෂණවල ශුක්‍රාණු මූලික සෛල අනුනනයෙන් බෙදී ශුක්‍රාණු මාතෘ සෛල (2n) සෑදෙන අතර ඒවා අනුනනයෙන් ප්‍රාථමික ශුක්‍රාණු සෛල (2n) ඇති කරයි.
- උෞනනය මගින් (උෞනනය 1) මගින් ද්විතියික ශුක්‍රාණු සෛල දෙක බැගින් හා උෞනනය 11 මගින් එක් එක් ද්විතියික ශුක්‍රාණු සෛලයෙන් ප්‍රාක් ශුක්‍රාණු දෙක බැගින්) සෑම ප්‍රාථමික ශුක්‍රාණු සෛලයකින් ම ප්‍රාඥ ශුක්‍රාණු හතරක් (n) ඇති කරන අතර වර්ණදේ: සංඛ්‍යාව ද්විගුණ (මිනිසාගේ 2n = 46) සිට ඒකගුණ (n=23) බවට අඩු කරයි.
- මේ ප්‍රාක් ශුක්‍ර ලාක්ෂණික හිසක්, මධ්‍ය කොටසක් සහ

වලිගයක් සහිත ඔක්කුණු බවට විභේදනය වේ.

- කරලයෙන් පිරි නාලිකා කුහරයට ඔක්කුණු නිදහස් කරන අතර, ඒවා නාලිකාව දිගේ අපිචායනයට ගමන් කරයි.
- එහි දී ඒවා පරිණත වී සවල භාවය ලබා ගනී.
- වැඩිවියට පැමිණි පසු ඔක්කුඩර නාලිකා අතර පිහිටන ලේඩ් සෛල මගින් වෙස්ටොස්ටෙරෝන් හෝමෝනය ප්‍රාචය කරන අතර, එමඟින් ඔක්කුණු ජනනය ප්‍රවර්ධනය කරයි.
- ඔක්කුණු ජනනය මස්සේ ඇති කරනු ලබන විවිධ සෛල විශේෂිත වූ සන්ධාරක සෛල වන සටෝලි සෛල මගින් වට කරමින් ඒවා හා සම්බන්ධව පවතී.
- මේ සටෝලි සෛල ඔක්කුඩර නාලිකාවල බිත්තියේ සිට කුහරය වෙත වැඩි දික් වී ඇත.
- මේ සෛල ඉන්හිබිත් හෝමෝනය ප්‍රාචය කරයි.
- තව ද ඔක්කුණු ජනනයේ විවිධ අවස්ථාවල පවතින සෛල සඳහා පෝෂණය මෙන් ම සන්ධාරණය ද සපයයි.

මානව පරිණත ඔක්කුණුවක ව්‍යුහය



- සෑම ඔක්කුණුවක් ම ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විත ය.
- එනම් හිස, මධ්‍ය කොටස (දේහය) සහ වලිගයයි.
- පිත්ත: ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය අඩංගු ඒකගුණ න්‍යෂ්ටියක් ඔක්කුණු හිසෙහි දැකිය හැකි ය.
- හිසෙහි පූර්ව කෙළවරෙහි විශේෂිත වූ ආශයිකාවක් වන අග්‍ර දේහය පිහිටයි.
- ඒ අග්‍රදේහයෙහි ජල විවිච්ඡේදක එන්සයිම වන
 - > ප්‍රිස්සින් හා
 - > හයලුරොනිඩේස්

අඩංගු වන අතර ඒවා ඩිම්බයේ පිටත පටලය සිදුරු කර ඇතුළු වීම සඳහා ඔක්කුණුවට ආධාර කරයි.

- එහි මධ්‍ය කොටසෙහි, වලිගය වලනය සඳහා අවශ්‍ය ATP අවශ්‍යතාව සපයන මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ගණනාවක් දැකිය හැකි ය.
- ඔක්කුණු වලිගය ක්ෂුද්‍ර නාලිකා (9+2) සාමාන්යීය සැකැස්ම සහිත දිගු කම්කාවක් සහිත වේ.
- එය න්‍යෂ්ටිය පාදස්ථයට ආසන්නව ඇති කේන්ද්‍රිකා මඟින් නිපදවනු ලබයි.
- ඔක්කුණුවට ස්ත්‍රී ප්‍රජනක මාර්ගය දිගේ ඩිම්බය කරා පිහිනා යෑමට ඇති හැකියාව වලිගය මඟින් ලබා දේ.

ඔක්කු කරලය

ඔක්කු ආශයිකා, පුරුස්ථ, බල්බා, පුරුස්ථ, පුරුස්ථ

- ඔක්කු කරලය යනු ඔක්කුණු සහ අනෙකුත් අතිරේක ග්‍රන්ථි වර්ග තුනෙන් නිකුත් කරන ප්‍රාචයන්ගේ මිශ්‍රණයකි.
- විසර්ජනයක දී ඔක්කු කරලය, මුත්‍ර මාර්ගය තුළින් පිටතට පැමිණේ.
- සාමාන්‍ය එක් විසර්ජනයක දී ඔක්කු කරලය 2-5ml පමණ අඩංගු වන අතර, එහි අඩංගු ඔක්කුණු එකතුව මිලිලීටරයට මිලියන 40-100 පමණ වේ.
- විසර්ජනයේ දී පිටවන ඔක්කුණු ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් අවසන් විසර්ජක ඔක්කු කරලයෙන් 10% ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් වේ.
- ඔක්කු කරලය තැනීමට ප්‍රධානව දායක වන්නේ ඔක්කු ආශයිකා හා පුරුස්ථ ග්‍රන්ථිය නිකුත් කරන කරලයන් ය.
- ඔක්කුණුවල පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය ශ්ලේෂ්මල, එන්සයිම, ප්‍රොස්ටේට්‍රැන්සිටින්, ඇස්කෝබික් අම්ලය, සිට්‍රිට් හා ෆ්‍රක්ටෝස් ආදිය ඔක්කු කරලයෙහි අඩංගු වේ.
- ඔක්කුණුවල වලනය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රවමය මාධ්‍යයක් සැපයීම මෙන් ම ස්ත්‍රී ප්‍රජනක මාර්ගයේ ඇති ආම්ලික බව උදාසීන කිරීම සඳහා ද ඔක්කු කරලය දායක වේ.
- ඔක්කුණුවක ජීවිත කාලය විසර්ජනයෙන් පසු පැය 48-72 පමණ වේ.

පුරුස්ථ ප්‍රජනක පද්ධතිය හා සම්බන්ධ අතිරේක ග්‍රන්ථි




Figure 18.16 Section of the prostate gland and associated reproductive structures on one side.

- ඔක්කුණුවල පැවැත්මට හා වලනයට අවශ්‍ය කරලය නිපදවනු ලබන අතිරේක ග්‍රන්ථි වර්ග තුනකි.
- එනම්
 - > ඔක්කු ආශයිකා,
 - > පුරුස්ථ: ග්‍රන්ථිය හා
 - > බල්බොපුරෙත්‍රල් ග්‍රන්ථි වේ.
- ඔක්කු ආශයිකා
 - > විසර්ජනයේ දී පිටවන කහ පාටින් යුක්ත සහ කරලයක් නිපදවන, කුඩා මල්ලක් වැනි ව්‍යුහ යුගලකි.
 - > යෝනි මාර්ගයේ දී එහි ඇති ආම්ලික පරිසරය තුල දී ඔක්කුණු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔක්කු කරලය භාෂ්මික ස්වරූපයක් ගනී.

- එය ශ්ලේෂ්මල, ෆරක්ටෝස් (ශුක්‍රාණුවේ ශක්තිය ප්‍රධාන වශයෙන් සපයයි), කැටිකාරක එන්සයිම (විසර්ජනයෙන් පසු ශුක්‍රය කැටි ගැසීමට), ඇස්කෝබික් අම්ල සහ ස්ථානීය යාමක (prostaglandin) අඩංගු වේ.

- මෙම තරලය ශුක්‍ර තරලයෙන් 60% පමණ වේ.
- එක් එක් ශුක්‍ර ආශයිකාව කෙටි කාලයකට විවෘත වේ.
- එය අදාල ශුක්‍ර කාලය සමග එකතු වී විසර්ජක ප්‍රකාලය සාදයි.


• පුරුස්ථ ග්‍රන්ථි

- මේවා මූත්‍රාශයට පහළින් පිහිටයි.
- එය කෙටි ප්‍රණාලවලින් තුනී කිරී පැහැති තරලයක් සෑදුව ම මූත්‍ර මාර්ගයට මුදා හරියි.
- මේ කිරී පැහැති ප්‍රාචය ප්‍රතිකැටිකාරක එන්සයිම හා ශුක්‍රාණු පෝෂණය කරන සිටිරේට් දරයි.
- ශුක්‍ර තරලයෙන් 30% ක් සෑදීමට මේ තරලය දායක වෙයි.

• බල්බොරෙත්‍රල් ග්‍රන්ථි (Bulbourethral glands) (කුර් ග්‍රන්ථි)

- මේවා පුරුස්ථ ග්‍රන්ථියට පහළින්, මූත්‍ර මාර්ගය ඔස්සේ හමු වන කුඩා ග්‍රන්ථි යුගලකි.
- මේ ග්‍රන්ථි පැහැදිලි ක්ෂාරීය ශ්ලේෂ්මලයක් ප්‍රාචය කරයි.
- එමඟින් මූත්‍ර මාර්ගයේ ඉතිරි වන ආම්ලික මූත්‍ර උද්සිත කරන අතර ම මූත්‍ර මාර්ග ආස්තරණ ස්නේහනය ද කරයි.

පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියේ හෝමෝනමය පාලනය




▲ Figure 46.13 Hormonal control of the testes.

- හයිපොතැලමසින් ප්‍රාචය වන GnRHට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස (යෞවනෝදයට වහා ම පෙර) පූර්ව පිටියුටරියෙන් FSH හා LH ප්‍රාචය කරයි.
- FSH හා LH හෝමෝන මට්ටම්වල ඉහළ යෑම යෞවනෝදයේ දී පුරුෂ ප්‍රජනක අවයවවල පරිණත ක්‍රියාකාරීත්වය වේගවත් කරයි.

- මේ හෝමෝන විකසනය, වර්ධනය, යෞවනෝදයේ දී සිදු වන පරිණතිය හා දේහයේ ප්‍රජනක ක්‍රියාවලිය යාමනය කරයි.
- වෘෂණවල ඇති විවිධ ආකාරවල සෛල මත ක්‍රියා කරමින් FSH හා LH ශුක්‍රාණු ජනනය සිදු කරයි.
- FSH - සටොලි සෛල මඟින් වර්ධනය වන ශුක්‍රාණුවල පෝෂණය සැපයීම උත්තේජනය
- LH - ලෙඩ්ග් සෛල මඟින් ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් නිපදවීම හා අනෙකුත් ඇන්ඩ්‍රොජන් හෝමෝන නිපදවීමට හේතු වන අතර, ඒවා මඟින් ශුක්‍රාණු ජනනය දිරි ගන්වයි.
- සෑණ ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ දෙකක් මඟින් පිරිමින් තුළ ලිංගික හෝමෝන නිෂ්පාදනය පාලනය වේ.
- ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් හයිපොතැලමස හා පූර්ව පිටියුටරිය මත බලපාමින් රුධිරයට GnRH, FSH හා LH ප්‍රාචය නිෂේධනය කරයි.
- සටොලි සෛලවලින් නිපදවන ඉන්හිබින් පූර්ව පිටියුටරිය මත බලපාමින් FSH ප්‍රාචය කවදුවත් අඩු කරයි.
- සෑණ ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ හේතුවෙන් ටෙස්ටෝස්ටෙරෝන් හා අනෙකුත් ලිංගික හෝමෝන (androgen) මට්ටම් සාමාන්‍ය පරාසයක පවත්වා ගනී.

ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතියේ ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය




- ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතියට අයත් ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර ව්‍යුහ ලෙස ඩිම්බ කෝෂ දෙක (ස්ත්‍රී ගොනාඩ), ඩිම්බ නාල දෙක (පැලෝපියා නාල), ගර්භාෂය හා යෝනි මාර්ගය හැඳින්විය හැකි ය.

ඩිම්බ කෝෂ

- ස්ත්‍රී ජන්මාණු නිපදවන ව්‍යුහ (ප්‍රජනෝත්පාදක) ඩිම්බ කෝෂ ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.
- මේවා ගර්භාෂය දෙසට පිහිටන අතර, ඒවා බන්ධනී මඟින් උදර කුහරයේ ස්ථානගත වී ඇත.
- මේවායේ ස්ත්‍රී ජන්මාණු ගබඩා වී ඇති අතර, ඩිම්බ මෝචනයට පෙර විකසනය වේ.

- ප්‍රජනන චක්‍රය අතරතුර දී කායික විද්‍යාත්මක වෙනස් වීම් සඳහා අවශ්‍ය ලිංගික හෝමෝන නිපදවීම ද ඩිම්බ කෝෂ මගින් සිදු කරයි. **ක්‍රියා විශ්ලේෂණ දැක්ම හැකි**
- මේ ඩිම්බ කෝෂවල පවතින ස්තර දෙකක් දැකිය හැකි ය.
- එනම්, පිටතින් බාහිරය හා ඇතුළතින් මජ්ඣමයයි.
- ඩිම්බ කෝෂ දෙකෙහි ම පිටත ස්තරයේ සම්බන්ධිත පටක පවතින අතර, එය ජනන අපිච්ඡදයෙන් වැඩි ඇත.
- ඩිම්බ කෝෂවල පිටත ස්තරයේ විවිධ වූ පරිණත අවධිවල ඇති ඩිම්බ සූත්‍රිකා දැකිය හැකි ය.
- සෑම සූත්‍රිකාවක්ම අණ්ඩ සෛලයකින් සමන්විත අතර, එය ආධාරක සෛලවලින් වට වූ හානිකව විකසනය වූ ඩිම්බ සෛලයයි.
- විකසනය අතරතුර දී ඩිම්බ සෛලය පෝෂණය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම ආධාරක සෛල මගින් සිදු කරයි.
- අණ්ඩෝද්භවයේ දී ඩිම්බ කෝෂයෙන් ඩිම්බය බෝධනය වන්නේ පළමු ධෘවීය දේහය ද සහිතව ද්විතියික අණ්ඩ සෛල අවස්ථාව ය.
- ද්විතියික අණ්ඩ සෛලය තුළට ශුක්‍රාණු සෛලයක් විනිවිද ගිය හොත් එය පරිණත අණ්ඩ සෛලයක් (අණ්ඩය) හා දෙවැනි ධෘවීය දේහය ඇති කිරීමට බෙදෙයි.
- මානව ඩිම්බය මාතෘ වර්ෂයේ 23ක් අන්තර්ගත, සාපේක්ෂ වශයෙන් විශාල සෛල ජලාස්මයක් සහිත ආධාරක සෛල විශාල ප්‍රමාණයකින් වට වූ වටකුරු සෛලයකි.
- ඊට අමතරව එහි ජලාස්ම පටලය හා ආධාරක සෛල අතර පැහැදිලි ස්තරයක් පවතියි (පැදි කලාපය).



ඩිම්බ නාල/ පැලෝපිය නාල

- මේවා ගර්භාෂයේ සිට දෙපසට විහිදෙන අතර, ඩිම්බ කෝෂ දෙක හමුවේ ප්‍රතිල හැඩැතිව විවෘත වේ.
- එහි දිග මස්සේ පරිමාණය වෙනස් වේ (එනම් ගර්භාෂයට ආසන්න වන විට හිසකෙසක් තරම් පටු වේ).
- ඩිම්බ මෝචනයෙන් පසුව ඩිම්බය, ඩිම්බ නාල තුළට යොමු වන්නේ එහි අභ්‍යන්තර අපිච්ඡද ආස්තරණය මත ඇති පක්ෂම මගින් දේහ කුහර තරලය ඩිම්බ නාල තුළට ඇද ගැනීමේ දී ය.

- ක්‍රියා විශ්ලේෂණ දැක්ම හැකි**
- ඩිම්බ නාලවල ඇති තරංගාකාර සංකෝචන හේතුවෙන් ඒවායේ අභ්‍යන්තරයේ ඇති පක්ෂම මගින් ඩිම්බය නාල මස්සේ ගර්භාෂයට යොමු කරයි.

ගර්භාෂය

- සන, පෙයාර් හැඩැති කුටීරයකි. (ආකරයක්)
- එහි බිත්ති පේශිමය වන අතර, එහි ඇති ඇදීමට ලක් වීමේ හැකියාව හේතුවෙන් හූණය දරා සිටීම සඳහා ගර්භණී සමයේ දී අවකාශ ලබා දෙයි.
- එහි ඇතුළු ආස්තරණය (එන්ඩොමේට්‍රියම) අධික ලෙස වාහිනීමත් වී ඇත. **ආරක්ෂාවේ දී ශුක්‍රාණු ලෙස**
- ගර්භාෂයේ විදුර කෙළවර ගෙලක් ලෙස පටු වී ඇති අතර, එය ගැබ් ගෙල/ ශ්‍රීව්‍ය ලෙස හැඳින්වේ.
- එය යෝනි මාර්ගයට විවෘත වේ.

යෝනි මාර්ගය

ශ්‍රීව්‍ය

- මෙය පේශිමය මෙන් ම ඇදෙනුයු කුටීරයක් වන අතර, ස්තරිභූත අපිච්ඡදයකින් යුක්ත වේ.
- මේ කොටස මගින් අභ්‍යන්තර ප්‍රජනන අවයව හා බාහිර ප්‍රජනන අවයව සම්බන්ධ කරයි.
- මේ මාර්ගය ශුක්‍රාණු තැන්පත් කිරීමට ස්ථානයක් සපයන අතර, දරු ප්‍රසූතිය සිදු වන මාර්ගය ද වේ.

අණ්ඩෝද්භවය

- මානව ස්ත්‍රීන්ගේ පරිණත අණ්ඩ සෛලයක් විකසනය වීමට දිගු කාලයක් ගත වේ.
- විකසනය වෙමින් පවතින ස්ත්‍රී කලල අවස්ථාවේ දී ම ඩිම්බ කෝෂ තුළ අපරිණත ඩිම්බ හට ගනී.
- එහෙත් මේ ඩිම්බවල විකසනය සම්පූර්ණ වන්නේ වසර ගණනාවකින් හෝ දශක කිහිපයකින් පසුව ය.
- අණ්ඩෝද්භවයේ දී උෞතනයේ ජලාස්ම විහාජනයේ දී සෛල ජලාස්මය අසමාන ලෙස බෙදී, එක් දුහිතෘ සෛලයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් (සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ) සෛල ජලාස්මය ගමන් ගනී.
- ඒ විශාල සෛලය ඩිම්බයක් බවට විකසනය වේ.
- උෞතනයේ දී අනෙක් ඵල වන ඉතිරි සුළු ජලාස්ම කොටසක් සහිත කුඩා සෛල, ධෘවීය දේහ ලෙස හැඳින්වේ.
- මේවා පසුව ක්‍රමයෙන් හායනය වී යයි.
- ශුක්‍රාණු ජනනයේ දී මෙන් නොව අණ්ඩෝද්භවයේ දී අනුනත විහාජනය උපතට පෙර සම්පූර්ණ වේ යැයි සැලකේ.
- තව ද පරිණත ජන්මාණු නිපදවීම වයස අවුරුදු (50) පමණ වන විට නැවතී යයි.
- තව ද එය ශුක්‍රාණු ජනනය මෙන් නොව, දිගු කාලීන බාධා සහිතව සිදු වන ක්‍රියාවලියකි.

අණ්ඩෝද්භවයේ ප්‍රධාන පියවර

- ස්ත්‍රී කලල අවස්ථාවේ දී මූලික ජන්මාණු සෛල අනුනතව බෙදීමෙන් ඩිම්බ ජනනය ආරම්භ වන අතර, ඒවායින් අණ්ඩ මාතෘ සෛල ඇති කරයි.

6 වන කොටස
 5 වන කොටස
 20 වන කොටස

- අනුපාතයෙන් අණ්ඩ මාතෘ සෛල බෙදීම ඇරඹෙන අතර, ඉන් පසු උපානනය ඇරඹේ.
- එහෙත් උපතට ප්‍රථම ප්‍රාක් කලාව 1 හි දී නැවතීම සිදු වේ.
- මෙසේ විකසනය නැවතුණු සෛල ප්‍රාථමික අණ්ඩ සෛල ලෙස හැඳින්වේ.
- සෑම ප්‍රාථමික අණ්ඩ සෛලයක් ම කුඩා සූනිකාවක් තුළ අඩංගු වන අතර, එය ආරක්ෂක සෛලවලින් ආස්තරණය වූ කුහරයකි. උපතේ දී ඩිම්බ කෝෂ දෙකෙහි ම ප්‍රාථමික අණ්ඩ සෛල මිලියන 1-2 පමණ සංඛ්‍යාවක් දරා සිටී.
- ඉන් 500ක් පමණ, වැඩිවියට පැමිණීමේ සිට ආරම්භකරණය දක්වා සම්පූර්ණයෙන් පරිණත වීම සිදු වේ.
- වැඩිවියට පැමිණීමත් සමඟ ම සූනිකා උත්තේජක හෝමෝන (FSH) මගින් ආවර්තිතව කුඩා සූනිකා සෛල හොඳු වර්ධනය හා විකසනය යළි ආරම්භ කිරීම උත්තේජනය කරයි.
- මේවා අතුරින්, මාසිකව එක් සූනිකාවක් පමණක් සම්පූර්ණයෙන් පරිණත වේ.
- මේ කාලය තුළ දී සූනිකාව තුළ ඇති ප්‍රාථමික අණ්ඩ සෛල උපානනය 1 සම්පූර්ණ කරන අතර, ද්විතීයික අණ්ඩ සෛලය හා පළමු ධ්‍රැවීය දේහය නිපදවයි.
- ඉන් පසු උපානනය 11 ඇරඹෙන නමුත් යෝග්‍ය කලාවේ දී විභාජනය නතර වේ.
- උපානනය 11 නැවතී සිටින ද්විතීයික අණ්ඩ සෛලය, සූනිකාව පිපිරුණු (විදාරණය වූ) පසු ඩිම්බ මෝචනයේ දී නිදහස් කරයි (පළමු ධ්‍රැවීය දේහය සමඟ).
- ද්විතීයික අණ්ඩ සෛලය ශුක්‍රාණුවක් මගින් විනිවිද ගියහොත් පමණක් උපානනය 11 සම්පූර්ණ වී ද්විතීයික අණ්ඩය, පරිණත ඩිම්බය හා දෙවන ධ්‍රැවීය දේහය බවට විභාජනය වේ.
- උපානන විභාජන දෙකෙහි දී ම අසමාකාරව ජලාස්ම විභාජනය වේ.
- කුඩා සෛල, ධ්‍රැවීය දේහ වන අතර පසුව භායනය වී යයි.
- ද්විතීයික අණ්ඩ සෛලයට ශුක්‍රාණුවක් විනිවිද ගිය හොත්, ශුක්‍රාණුවේ හිස අන්තර්ගත වූ තනි පරිණත අණ්ඩයක් (ඩිම්බය) අණ්ඩෝද්භවය අවසානයේ ලැබෙයි.
- ඒකගුණ ශුක්‍රාණු හා ඩිම්බ නෂ්ටි පැහිම සංසේචනය ලෙස දැක්වේ.
- ඩිම්බ මෝචනයෙන් පසුව ඉතිරි වූ පිපිරුණු සූනිකාව පිත දේහය බවට විකසනය වේ.
- ගර්භණීභාවයේ දී වැදගත් වන ගර්භාෂ ආස්තර පවත්වා ගෙන යෑම සඳහා අවශ්‍ය වන රිස්ට්‍රිඩයෝල් සහ ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් යන හෝමෝන පිත දේහය මගින් ප්‍රාචය කරයි.
- ඩිම්බය සංසේචනය නොවූහ හොත්, පිත දේහය භායනය වී කුඩා ස්ථිර පැල්ලමක් ලෙස තත්ත්වය පටකයකින් තැනුණු ශ්වේත දේහය ඩිම්බ කෝෂය

- මතුපිට ඉතිරි වී යයි.
- රළුත වක්‍රය තුළ දී නව සූනිකාවක් පරිණත වේ.

මානව ස්ත්‍රී ප්‍රජනක චක්‍රයේ හෝමෝනමය පාලනය

- පුරුෂ ශුක්‍රාණු ජනනය නොනවත්වා සිදු වුව ද අණ්ඩජනනය වක්‍රීයව සිදු වේ.
- මානව ස්ත්‍රී ප්‍රජනක අවධිය තුළ ප්‍රජනක චක්‍ර දෙකක් එක්ව ක්‍රියා කරයි.
- එනම්, ඩිම්බ කෝෂ චක්‍රය හා ගර්භාෂ චක්‍රයයි (හෝ ආර්තව චක්‍රය).
- ගර්භාෂයේ මාසික ව සිදු වන වෙනස්කම් ගර්භාෂ චක්‍රයට අයත් වන අතර, මෙසේ ගර්භාෂයේ සිදු වන වෙනස්කම් පාලනය කරනු ලබන්නේ ඩිම්බ කෝෂ චක්‍රය මගිනි.
- එය ඩිම්බ කෝෂවල වක්‍රීයව සිදු වන වෙනස්කම් මාලාවයි. මේ චක්‍ර දෙක ම හෝමෝනමය ක්‍රියා මගින් යාමනය වේ.
- ඒවා මගින් චක්‍ර දෙකෙහි ම ක්‍රියා සම්බන්ධ කරමින් පවත්වා ගනී.
- ඩිම්බ සූනිකා වර්ධනය හා ඩිම්බ මෝචනය සමඟ ම කලල විකසනයට අවශ්‍ය ගර්භාෂයක ආස්තරණය ස්ථාපනය වේ.

ඩිම්බ කෝෂ චක්‍රය

- මේ චක්‍රය සූනික කලාව (අවධිය) හා ධ්‍රැවීය කලාව (අවධිය) ලෙස කොටස් දෙකකි.
- සූනික අවධියේ දී සූනිකා වර්ධනය වීම හා අණ්ඩ සෛල පරිණත වීම සිදු වේ.
- සූනිකා අවධිය ආරම්භයේ දී FSH හා LH සුළු ප්‍රමාණවලින් පූර්ව පිටියුටරියෙන් ප්‍රාචය කිරීම, හයිපොතැලමසෙන් ප්‍රාචය කරන GnRH මගින් උත්තේජනය කරයි.
- LH හි උපකාරය ඇති වීම සූනිකා වර්ධනය FSH මගින් උත්තේජනය වේ.
- වර්ධනය වන සූනිකාවේ සෛල මගින් රිස්ට්‍රිඩයෝල් හෝමෝනය නිශ්පාදනය ආරම්භ කරයි.
- ඒ නිසා සූනිකා අවධියේ දී රිස්ට්‍රිඩයෝල් මට්ටම ක්‍රමයෙන් ඉහළ යයි.
- ඒ නිසා රිස්ට්‍රිඩයෝල් පහළ මට්ටමක පැවතීමේ දී පූර්ව පිටියුටරියෙන් ප්‍රාචය වන ගොනාඩොට්‍රොෆින් හෝමෝන ප්‍රාචය නිශේධනය කරයි (සෑණ ප්‍රතිපෝෂණය).
- ඒ නිසා සූනිකා අවධියේ දී FSH හා LH සාපේක්ෂව පහළ මට්ටමක පවතී.
- වර්ධනය වන සූනිකාවෙන් රිස්ට්‍රිඩයෝල් ප්‍රාචය අධිකව ඉහළ යෑමට ආරම්භ වූ විට, ඒ ඉහළ මට්ටමේ සාන්ද්‍රණය හේතුවෙන් හයිපොතැලමස උත්තේජනය වී GnRH ප්‍රාචය වීම ඉහළ යයි. එහෙයින් පූර්ව පිටියුටරිය උත්තේජනය වී FSH හා LH, විශේෂයෙන් LH ප්‍රාචය වීම ක්ෂණිකව ඉහළ නගී (+ ප්‍රතිපෝෂි යන්ත්‍රණය මගින්).
- මේ අවස්ථාව වන විට පරිණත වෙමින් පවතින

සමහර විට පිම්බ කෝෂය මත ඉදිමුත් ලෙස දිස් වේ. LH ප්‍රමාණය ක්ෂණිකව ඉහළ නැගී.

- දිනකට පමණ පසු පිම්බ මෝචනය සිදු වී සූත්‍රිකා අවධිය අවසන් වේ.
- FSH හා ඉහළ LH මට්ටම් හේතුවෙන්, සූත්‍රිකාව හා පිම්බ කෝෂයේ ආසන්නතම බිත්ති පුපුරා, ද්විතියික අණුව සෛලය නිදහස් වේ.
- එය පිම්බ මෝචනය වේ.




Figure 46.14 The reproductive cycles of the human female. This figure shows how (d) the ovarian cycle and (e) the uterine (menstrual) cycle are regulated by changing hormone levels in the blood, depicted in parts (a), (b), and (d). The time scale at the bottom of the figure applies to parts (b)-(e).

- පිම්බ කෝෂ වක්‍රයේ ලුටීය අවධිය පිම්බ මෝචනයෙන් පසු ඇරඹේ.
- මේ ලුටීයල් අවධියේ දී පිම්බ කෝෂය තුළ ඇති සූත්‍රිකා පටක LH මගින් උත්තේජනය කරන අතර එයින් පිත දේහය නම් ග්‍රන්ථිය ව්‍යුහයක් බවට ඒ සූත්‍රිකා පටක පත් වේ.
- පිත දේහය මගින් ඊස්ට්‍රඩියෝල් හා ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් ස්‍රාවය කරන අතර හයිපොතලමස හා පිටියුටරිය මත (-) ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වේ.
- ඒ ප්‍රතිපෝෂණය මගින් LH හා FSH ස්‍රාවය ඉතා

කෝෂයේ තවත් පිම්බ සෛලයක් පරිණත වීම වළක්වාලයි.

- ගැබ් ගැනීමක් සිදු නොවූ අවස්ථාවල දී ලුටීයල් අවධිය අවසානයේ ඇති වන ගොනැඩොට්‍රොෆින් මට්ටම්වල පහළ බැසීමෙන් පිත දේහය පිරිහීමට ලක්වීම ප්‍රවර්ධනය වේ.
- පිත දේහය පිරිහීමෙන් එමගින් සිදුවන හෝමෝන ස්‍රාවය ශීඝ්‍ර ලෙස පහළ බසී.
- එමගින් ඊස්ට්‍රඩියෝල් හා ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් මගින් හයිපොතලමස හා පූර්ව පිටියුටරිය මත ක්‍රියාත්මක වූ (-) ප්‍රතිපෝෂී ක්‍රියාව ඉවත් වෙයි.
- ඊළඟ පිම්බ කෝෂ වක්‍රයක් ආරම්භය සඳහා නව සූත්‍රිකාවක් ඇති කිරීම උත්තේජනයට FSH නිපදවීමේ හැකියාව මේ මගින් පිටියුටරියට ලැබේ.

ගර්භාශයික වක්‍රය (ආර්තව වක්‍රය)

මෙයට ප්‍රභූණත කලාව, ස්‍රාවීය කලාව හා ආර්තව කලාව අයත් වේ.

- ප්‍රභූණත කලාව - පිම්බ මෝචනයට පෙර පිම්බ කෝෂයේ ස්ටෙරොයිඩ් හෝමෝන මගින් ගර්භාශය උත්තේජනය කරන අතර, එහි දී කලලයට ආධාර කිරීම සඳහා ගර්භාශය සකස් කෙරේ.
- වැඩෙන සූත්‍රිකා ඊස්ට්‍රඩියෝල් ස්‍රාවය කරන අතර, එමගින් එන්ඩොමෙට්‍රියම් සන වේ.
- මෙය ගර්භාශයික වක්‍රයේ ප්‍රභූණත කලාව ලෙස හැඳින්වේ.
- ඒ නිසා පිම්බ වක්‍රයේ සූත්‍රිකා අවධිය සමඟ ගර්භාශයික ප්‍රභූණත අවධිය සම්බන්ධීකරණය වේ.
- පිම්බ මෝචනයෙන් පසුව ස්‍රාවීය අවධිය ඇරඹේ.
- එහි දී ඊස්ට්‍රඩියෝල් හා ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් ස්‍රාවය වීම පිත දේහය මගින් සිදු කරන අතර, එමගින් ධමනි විශාල වීමෙන් හි එන්ඩොමෙට්‍රියම් ග්‍රන්ථි වර්ධනයෙන් ගර්භාශයික ආස්තරණය තවදුරටත් විකසනය වීම හා පැවැත්ම උත්තේජනය කරයි.
- සංසේචනය සිදු වූව හොත් ළපටි කලලය පෝෂණය කළ හැකි පෝෂක ස්‍රාවයක් මේ ග්‍රන්ථිවලින් ස්‍රාවය කරයි.
- එහෙයින් පිම්බ වක්‍රයේ ලුටීය අවධිය, ගර්භාශයික වක්‍රයේ ස්‍රාවීය අවධිය හා සම්බන්ධීකරණය වේ.
- ආර්තව කලාව - කලල අධිරෝපණයක් සිදු නොවන අවස්ථාවේ දී පිත දේහය පරිහී යන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පිම්බ කෝෂ හෝමෝන අඩු වී යයි.
- එය ස්‍රාවීය අවධියේ අවසානයයි.
- මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ධමනි සංකුචනය වී ගර්භාශයික ආස්තරණය හායනය වී එන්ඩොමෙට්‍රියම් පටක හා තරලය සමඟ ගැලවී යයි.
- මෙය ගර්භාශයික වක්‍රයේ ආර්තව කලාවයි. මෙසේ ගර්භාශයෙන් රුධිරය පිරී එන්ඩොමෙට්‍රියම් වක්‍රීයව ගැලවී ගොස්, එය ගර්භාශ ගෙල හා යෝනි මාර්ගය හරහා දින කිහිපයක දී පිට වී යයි.
- මෙය ආර්තවයයි.

ආර්තවරණය

- මෙය කාන්තාවකගේ ඩිම්බ මෝචනය සහ ආර්තවය තතර වීමයි.
- මෙය වයස අවුරුදු (45-55) අතර කාලයේ දී සිදු වේ.
- මේ කාලය තුළ දී ඩිම්බ කෝෂ මගින් අණ්ඩ සෛල සැපයීම තතර වන අතර, ඩිම්බ කෝෂ මගින් ඊස්ට්‍රජන් නිපදවීම අඩු වී යයි.
- මෙහි දී පූර්ව පිටියුටරියෙන් නිපදවන FSH හා LH වලට ඩිම්බ කෝෂවල සංවේදීතාව අඩු වී යයි.

මානව විකසනය

- නව මිනිස් ජීවියකුගේ වර්ධනය, ඩිම්බයක් ඉක්මනින් සමග ඩිම්බ තාලය තුළ දී සංසේචනය වූ වහා ම ආරම්භ වේ.
- මවගේ ගර්භාශය තුළ ජීවියකුගේ විකසනය වීම සංසේචනයේ සිට උපත දක්වා සිදු වන සිදුවීම් පෙළක් වන අතර ඊට සති 38ක් - එනම් දළ වශයෙන් මාස 9ක් ගත වේ.
- මානව කලල විකසනයේ පළමු සති 8 කලල අවධිය ද ඉන් පසු එළඹෙන විකසන කාලය හුණු අවධිය ලෙස ද දැක්විය හැකි ය.

සංසේචනය හා මානව යුක්තාණුව ඇති වීම

- ඩිම්බ මෝචනයේ දී උෞතනය යෝග්‍ය කලාව 11හි විභාජන නැවතී පවතින ද්විතියික අණ්ඩ සෛලයක් ඩිම්බ ප්‍රණාලවලට ඇතුළු වේ.
- සංසේචනයේ දී ද්විතියික අණ්ඩ සෛලය වටා ඇති අපිච්ඡද සෛල සහ ඒ අපිච්ඡද සෛල හා ඩිම්බ සෛලයේ ජලාස්ම පටලය අතර ඇති ග්ලිකොප්‍රෝටීන් ස්තරය සිදුරු කර ඉක්මනින් ද්විතියික අණ්ඩ සෛලයට ඇතුළු වේ.
- ඒ සමග ම අණ්ඩ සෛලය උෞතනය 11 විභාජනය සම්පූර්ණ කර පරිණත ඩිම්බයක් බවට පත් වේ.
- ඒ සමග ම ඩිම්බ හා ඉක්මනින් ඒකගුණ ප්‍රාක් න්‍යෂ්ටි හා ඒවිගුණ, ඒකසෛලික යුක්තාණුව නිපදවයි.

සංසේචනය, ඩිම්බ මෝචනයෙන් පැය 12-24ක් අතර කාලයේ දී ඩිම්බ ප්‍රණාලවල ඉහළ කෙළවරේ දී සිදු වේ.

- සංසේචනයෙන් පැය 24ක පමණ පසුව යුක්තාණුවේ හේදනය ලෙස හඳුන්වන සීඝ්‍ර අනුනත විභාජන ශ්‍රේණියක් සිදු වේ.
- එනම් අනුනතව විභාජනයෙන් ශීඝ්‍ර ලෙස බෙදීම සිදු වේ.
- ඩිම්බ ප්‍රණාලවල ඇති පක්ෂම ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් හා ක්‍රමානුකූලව වලන මගින් හේදනය වන යුක්තාණුව ගර්භාශය කරා රැගෙන යයි.
- ඩිම්බ ප්‍රණාල දිගේ ගර්භාශය වෙත පැමිණෙන අතරතුර දී යුක්තාණුව හේදනය ආරම්භ වේ.
- සන සෛල බෝලයක් ලෙස එනම් මොරුලාව ඇති

(මර්ණයට ආවේ එම අවස්ථාවේදී).

වන තෙක් හේදනය සිදු වී, ගර්භාශය වෙත පැමිණේ (සංසේචනයෙන් දින 3-4ක් පමණ ගත වූ පසු දී).

- මොරුලාව ගර්භාශයින් කුහරයේ සා වෙමින් සිට එන්ඩොමෙට්‍රියමේ ස්ථාවයන්ගෙන් පෝෂණය ලබයි.
- සංසේචනයෙන් දින 5ක් පමණ පසුව සෛල බෝලය මධ්‍යයේ තරලය පිරී විශාල කුහරයක් ඇති වේ.
- ඒ කුහරය ඇති වීමත් සමග ම ඒ විකසන අවධිය බ්ලාස්ටොමෙට්‍රියම ලෙස හඳුන්වයි.
- තවදුරටත් එහි සෛල නැවත සැකසී ව්‍යුහ කොටස් දෙකක් ඇති කරයි. එනම්, ඇතුළු සෛල පිඩ හා පෝෂ බ්ලාස්ටමය ලෙස ය.
- ඇතුළු සෛල පිඩ අභ්‍යන්තරයේ පිහිටන අතර, පසුව කලලය සහ කලලය වටා පවතින පටල කලලාවාරය සාදයි.
- සෛලවල පිටත ස්තරය වන පෝෂ බ්ලාස්ටමය, පසුව කලල බන්ධය සෑදීමට හුණුයෙන් දායක කරන කොටස සාදයි.
- සංසේචනයෙන් දින 7කට පමණ පසුව බ්ලාස්ටොමෙට්‍රියම මවගේ ගර්භාශයින් එන්ඩොමෙට්‍රියමට සවි වේ.
- මෙය අධිරෝපණයයි. බ්ලාස්ටොමෙට්‍රියම අධිරෝපණයේ දී ඇතුළු සෛල පිඩ, එන්ඩොමෙට්‍රියම දෙසට යොමු වී ඇත.
- ඉන් පසු පෝෂ බ්ලාස්ටමය පිටතට වැටී එන්ඩොමෙට්‍රියම ආක්‍රමණය කරයි.
- මේ සඳහා පෝෂ බ්ලාස්ටමයෙන් ස්ථාවය වන එන්සයිම ආධාර වන අතර, ගර්භාෂයක ආස්තරණය බිඳීම සිදු වේ.
- පෝෂ බ්ලාස්ටමයේ අංගුලිකා වැනි තෙරුම් එන්ඩොමෙට්‍රියම තුළට වැදේ.
- LH වල ක්‍රියාවට සමාන වූ hCG (මානව කලලබන්ධ ගොනාඩොට්‍රොෆින් හෝමෝනය) පෝෂ බ්ලාස්ටමය මගින් ස්ථාවය කිරීම ඇරඹේ.
- hCG මගින් පිත දේහය බිඳ වැටීමෙන් ආරක්ෂා කරන අතර, එමගින් පිත දේහය මගින් ස්ථාවය වන ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් සහ ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝන ස්ථාවය පවත්වා ගෙන යන අතර එමගින් ආර්තවය සිදු වීම වළකීය.
- අධිරෝපණයෙන් පසුව විකසනය වන කලලයේ ජනක ස්තර 3ක් ඇති වේ.
- මෙය ගැස්ට්‍රලිභවනයේ අවසාන අවධියේ සිදු වේ.
- කලලය වට කරමින් අමතර බහිෂ් කලල පටල ඇති වීමට පටන් ගනී.
- පෝෂ බ්ලාස්ටමයේ සෛලවලින් හා ආසන්න එන්ඩොමෙට්‍රියමේ පටකවලින් කලල බන්ධය ඇති වේ.

කලල පටල/ හුණු පටල

- අධිරෝපණයෙන් පසු අමතර කලල පටල 4ක් ඇති වේ.
- එනම්, කලලාවාරය, කෝරියම, බිජාන්ත මට්ටය හා අලින්තයයි.
- කලලය/ හුණුය තවදුරටත් විකසනය සඳහා මේ කලල

බහිෂ්ටර ම - කලලාවාරය.

අනිකුණු ම - බිජාන්ත මට්ටය.

අලින්තය.


පටල ආධාර වේ.

- මෙමගින් කලලයේ කවුරුවක් විකසනය සඳහා ජීවී ආධාරක පද්ධතියක් සපයයි.
- කලල බන්ධයේ කලලයට අයත් ප්‍රධාන කොටස ලෙස කෝරියම් ක්‍රියා කරන අතර කලල බන්ධය, හූණය හා මව අතර ද්‍රව්‍ය හුවමාරුවට අවශ්‍ය ව්‍යුහය සාදයි.
- තව ද එමගින් මවගේ ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරවලින් කලලය/ හූණය ආරක්ෂා කරයි.
- කෝරියම් මගින්, ගර්භණිභාවයේ දී අවශ්‍ය හෝමෝනයක් වන hCG නිපදවයි.
- කලලාවාරය, කලලය/ හූණය වටා ආරක්ෂක පටලයක් ලෙස පිහිටමින් තරලය පිරී කුහරයක් සාදන අතර, එමගින් කම්පන අවශෝෂණය කිරීම හා කලලය වියළීමෙන් ආරක්ෂා කිරීම සිදු වේ.
- බිජාන්ත මඩිය, පසුව රුධිර සෛල බවට පත් වන සෛලවලට ආධාර වන අතර, ඒ ක්‍රියාව හූණ අක්ෂාමව මගින් භාර ගන්නා තුරු ඊට දායක වේ.
- තව ද එය විකසනය වන ඩිම්බ කෝෂ හෝ වෘණ වෙත චලනය වන මූලික ජන්මාණු සෛල ඇති කරයි.
- අලිත්තය බිජාන්ත මඩියෙහි බාහිර කුඩා මල්ලක් ලෙස හැඳින්විය හැකි අතර, රුධිරය නිපදවන ප්‍රාථමික ස්ථානයක් ලෙස මෙන් ම මුත්‍රාශය විකසනය හා අදාළව ක්‍රියා කරයි.

හෝරියට - කලල බන්ධය

කලල බන්ධය හා පෙකණි වැල

hCG නිපදවීම



- කලල විකසනයේ පළමු සති 2-4 අතරතුර දී කලලය සෘජුව ම එන්ඩොමෙට්‍රියමෙන් පෝෂණය ලබයි.
- ඉන් පසු කලල පෝෂ බ්ලාස්ටය හා මවගේ එන්ඩොමෙට්‍රියම් එක්ව සෑදෙන කලල බන්ධය මඩලාකාර අවයවයක් වන අතර, එය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වෙයි.
- එනම්; කලලයේ කොටස වන කෝරියම් අංශුලිකා සහ මවගේ කොටස වන එන්ඩොමෙට්‍රියමයි.
- කලල බන්ධයෙහි කලල/ හූණ රුධිර නාල මෙන් ම මවගේ රුධිර නාල ද අඩංගු වේ.

- කෙසේ නමුත් මාතෘ හා කලල රුධිර නාල එක් වීමක් සිදු නොවන අතර, ඒවා මගින් රැගෙන යන රුධිරය ද සාමාන්‍යයෙන් මිශ්‍ර නොවේ.
- කලල බන්ධය මගින් මවගේ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය හා කලල/ හූණ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය අතර ද්‍රව්‍ය (පෝෂක ද්‍රව්‍ය, ශ්වසන වායු, පරිවෘත්තීය අපද්‍රව්‍ය) හුවමාරු කෙරේ. ඔක්සිජන් හා පෝෂණය මවගේ රුධිරයේ සිට හූණයට කලල බන්ධය මගින් සපයන අතර, හූණයේ සිට මාතෘ රුධිරයට බිස්ප්‍රාවීය අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරයි.
- කලල බන්ධය මගින් විකසනය වන හූණයට ප්‍රතිශක්තිකරණ ආරක්ෂාව ලබා දේ.
- තව ද ගර්භණිභාවය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය හෝමෝන (උදා: hCG, ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන්, ආදිය) කලල බන්ධය මගින් නිපදවනු ලබයි.
- පෙකණිවැල යනු නමුඟිපි රුහුනක් වැනි ව්‍යුහයක් වන අතර, එහි රුධිර නාල අඩංගු වේ.
- ගර්භණි සමයේ දී කලලය/ හූණය කලල බන්ධයට සම්බන්ධ කිරීමට මෙය වැදගත් ය.
- ඔක්සිජන් හින රුධිරය කලලයේ/ හූණයේ සිට කලල බන්ධය වෙත පෙකණිවැලේ ධමනි දෙකක් හරහා ගොස් කෝරියම් අංශුලිකා තුළට ගමන් කරන අතර එහි දී ඔක්සිජන් හා පෝෂක ලබා ගනී.
- ඔක්සිජන් පිරි රුධිරය කලලය වෙත පෙකණි ශිරා ඔස්සේ කලල බන්ධයේ සිට පැමිණේ.

ගර්භණිභාවය සහ කාලාන්තර

- ස්ත්‍රියකගේ ගර්භාශය තුළ විකසනයවන හූණයක් හෝ කිහිපයක් දරා සිටීමේ කන්වය ගර්භණිභාවයයි (ගැබ දැරීම).
- සාමාන්‍යයෙන් මානව ගර්භණි කාලය වන්නේ සංසේචනයේ සිට උපත දක්වා සති 38ක් එනම් දළ වශයෙන් මාස 9ක් පමණ ය (අවසන් ආර්තවයේ සිට උපත දක්වා සති 40කි).
- මේ ගර්භණි මාස 9ක කාලය, මාස 3ක එනම් ත්‍රෛමාසික 3කට බෙදා දැක්විය හැකි ය.
- පළමු ත්‍රෛමාසිකයේ දී, අධිරෝපිත කලලය මගින් හෝමෝන ප්‍රාචය කරන අතර, ඒවා මගින් මවගේ ප්‍රජනක පද්ධතිය යාමනය කරන අතර කලලයේ පැවතීම පෙන්නුම් කරයි.
- කලලය මගින් ප්‍රාචය කරන hCG හෝමෝනය මගින් ඩිම්බ කෝෂයේ පිත දේහය පවත්වා ගෙන යන අතර, ඉන් ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් හා ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රාචය කරයි.
- මේ hCG වලින් යම් ප්‍රමාණයක් මාතෘ රුධිරයෙන් මුත්‍රවලට මිශ්‍ර වේ.
- ඒ නිසා ගර්භණි මවකගේ රුධිර හෝ මුත්‍ර පරීක්ෂාවෙන් hCG ඇති බව පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි ය.
- එය ගර්භණිභාවය කලින් ම හඳුනා ගැනීමට හැකි පරීක්ෂාවකි.
- ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් අධික සාන්ද්‍රණයක් පැවතීමෙන් මව තුළ ශීඝ්‍ර වෙනස්කම් ඇති කරයි.

තුළල බන්ධය මුලින් හා භූරුකරණ
පටක චක්‍රයේ කළු ආකෘති වලින්
බවතා ගන්නා අවස්ථාවේ වටය එක්ව ඇත

- ඩිම්බ මෝචනය හා ආර්තවය යන ක්‍රියා දෙක ම නවතින අතර, කලල බන්ධයේ මාත්‍රා කොටස වැඩිම ද පියයුරු හා ගර්භාශය විශාල වීම ද සිදු වේ.
- හූණය ආසාදනවලින් වළක්වාලන, මවගේ ගැබ්ගෙලෙහි ඇති ශ්ලේෂ්මලවලින් සෑදුණු ශ්ලේෂ්මල පිණ්ඩයක් (mucus plug) ගැබ්ගෙල අවහිර කොට පිහිටයි.
- ප්‍රථම ත්‍රෛමාසිකයේ දී බොහෝ මවුවරුන්ට උදෑසන කාලයේ පවතින ඔක්කාරය වැනි තත්ත්ව ඇති විය හැකි ය (morning sickness).
- දෙවන ත්‍රෛමාසිකය වන විට hCG මට්ටම පහළ බසී. ඒ නිසා පිත දේහය ද පිරිහී යයි.
- එහෙත් ගර්භණිභාවය පවත්වා ගැනීමට වැදගත් වන ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් හා ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝන නිපදවීම කලල බන්ධය මගින් භාර ගනු ලබයි. මවට හූණයේ වලන දැනීමට පටන් ගනී.
- හූණය ක්‍රමයෙන් වැඩෙන විට මවගේ උදර කුහරයේ ඇති අවයව තෙරපී, ස්ථානගත වීම වෙනස් වේ.
- එහෙයින් තුන්වන ත්‍රෛමාසිකයේ දී ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලියේ දී සිදු වන අවහිර වීම් හා නිරතුරුව මුත්‍ර පහ කිරීම සිදු වේ.

එක් එක් ත්‍රෛමාසිකවල හූණයේ සිදු වන වෙනස්කම්

- **පළමු ත්‍රෛමාසිකය**
 - මෙය වඩාත් අවදානම් සහිත කාලයක් වන අතර, එසේ වන්නේ කලලයේ සියලු ප්‍රධාන අවයව ජනනය ආරම්භක අවස්ථාවල පවතින හෙයිනි.
 - මෙය අවයව ජනනයේ ප්‍රධාන කාල වකවානුවයි (දේහ අවයව විකසනය).
 - සිව් වන සතිය වන විට හෘදය ස්පන්දනය වීම ආරම්භ වේ (8-10 සතිවලදී හඳුනාගත හැක).
 - 8 වන සතිය වන විට කලලය 'හූණය' ලෙස හැඳින්විය හැකි අතර, වැඩිහිටියෙකුගේ පවතින සියලු අවයවවල ප්‍රාථමික අවස්ථා දැකිය හැකි ය.
 - පළමු ත්‍රෛමාසිකය අවසානයේ දී හූණය හොඳින් විභේදනය වී ඇති අතර, 5-7cmක් පමණ දිගු වේ.
- **දෙවන ත්‍රෛමාසිකය**
 - මෙය අවසාන වන විට හූණය හොඳින් මානව ලක්ෂණ දරයි.
 - මේ අවධියේ දී අවයව පද්ධති සම්පූර්ණයෙන් ම විකසනය වී ඇති අතර, හූණයේ 30cm පමණ දිගට වැඩෙයි.
 - එය ඉතා ක්‍රියාකාරී වීමෙන් හූණයේ වලන මවට ඉතා හොඳින් සංවේදනය වේ.
- **තුන්වන ත්‍රෛමාසිකය**
 - මේ කාලයේ දී වේගවත් හූණ වර්ධනයක් දැකිය හැකි ය.
 - මේ අවධියේ මුල් අවස්ථාවේ දී සියලු අවයව පද්ධති පාහේ සම්පූර්ණයෙන් ම ක්‍රියාකාරී වේ.
 - මේ කාලයේ දී හූණය 50cm පමණ දිගක් දක්වා

වැඩෙන අතර, 3-4kgක් පමණ බරකින් යුක්ත වේ.

- ගර්භාශය තුළ අවකාශය පිරී හූණය වැඩී ඇති බැවින්, මේ අවධියේ දී හූණ වලන ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වී යයි.

හූණයට මවගෙන් ඇතිවන ප්‍රතිශක්තිමය දරා ගැනීම

- ගර්භණි සමය තුළ මාත්‍රා ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියේ යාමනය මුළුමනින් ම වෙනස් වේ.
- එමඟින් කලලය ආගන්තුක දේහයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප නොවී ගර්භාශයේ රඳවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි.
- කලලය සතුව ඇති ජානවල අර්ධයක් ම පියාගේ මුඛද ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය මගින් එය ආගන්තුක දේහයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප නොකරයි.

දරු ප්‍රසූත ක්‍රියාවලිය - දරු උපත

- දරු ප්‍රසූතිය ගර්භාශයේ ඇති වන දැඩි රිද්මයානුකූල සංකෝචන මාලාවක් මගින් හූණය හා කලල බන්ධය, පිටතට තල්ලු කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙන් ආරම්භ වේ.
- ප්‍රසූතිය ආරම්භයේ දී ස්ථානීය යාමක (ප්‍රොස්ට්‍රේන්ඩින්) සහ හෝමෝන (ප්‍රධාන වශයෙන් ඊස්ට්‍රඩියෝල් හා ඔක්සිටෝසින්) මගින් ගර්භාශය තවදුරටත් සංකෝචනය වීම උත්තේජනය යාමනය කරයි.
- මෙය ධන ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණයක් වන අතර, ගර්භාශ සංකෝචන මගින් ඔක්සිටෝසින් ප්‍රාචය උත්තේජනය වන අතර, එමඟින් ගර්භාශය තවදුරටත් සංකෝචනය වීම වැඩී කරයි.
- ප්‍රසූතිය අවධි 3කට බෙදා දැක්විය හැකි ය.
 - පළමු අවධිය වන්නේ ගර්භාශ ගෙල තුනී වීම හා විවෘත වීමයි (විස්තාරණය වීම).
 - දෙවන අවධිය වන්නේ ළදරුවා බිහි වීමයි. මෙහි දී දැඩි සංකෝචන නොනවත්වා සිදු වන අතර, එමඟින් හූණය ගර්භාශයේ පිටතට වැරෙන් තල්ලු වී යෝනි මාර්ගය තුළින් පිටතට පැමිණේ.
 - තෙවන අවධිය දරු ප්‍රසූතිය අවසානයේ දී කලලබන්ධය ද පිටතට තල්ලු වේ.

ක්ෂීරණය

- උපතින් පසු මුල් ළමා කාලයේ දී පෝෂණය සඳහා ක්ෂීරණය වැදගත් වේ.
- ස්ථාන ග්‍රන්ථි මගින් මවු කිරි ප්‍රාචය නිදහස් කිරීම ක්ෂීරණය ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.
- ක්ෂීරපායීන්ට පමණක් සීමා වෙයි.
- ක්ෂීරණය, ස්නායු හා හෝමෝන මගින් යාමනය වේ.
- කිරි සංශ්ලේෂණය හා ප්‍රාචය වීමේ ප්‍රධානතම හෝමෝනය වන්නේ ප්‍රොලැක්ටින් ය.
- අලුත උපන් බිලිදාගේ කිරි උරා බීමේදී තන පුඩුවල ඇති ස්පර්ශ ප්‍රතිග්‍රාහකවලින් ස්නායු ආවේශ ආරම්භ වේ
- එසේම උපතින් පසු මවගේ රුධිරයේ ඊස්ට්‍රඩියෝල් හා ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් මට්ටම පහළ බැසීම සිදුවේ

- එවිට හයිපොතාලමිස මඟින් පූර්ව පිටියුටරිය වෙත යැවෙන ආවේග හේතුවෙන් ප්‍රොලැක්ටින් හෝමෝනය ස්‍රාවය වීමෙන් ස්කන්ධ ග්‍රන්ථි මඟින් කිරි නිපදවීම ක්‍රියාත්මක වේ.
- තව ද කිරි උරා බීම හේතුවෙන් අපර පිටියුටරි ග්‍රන්ථියෙන් ඔක්සිටෝසින් හෝමෝනය ස්‍රාවය වීම උත්තේජනය වන අතර, එයින් ස්කන්ධ ග්‍රන්ථි මඟින් කිරි මුදා හැරීම (විසර්ජනය) උත්තේජනය වේ.
- මෙය ද ධන ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණයක් වන අතර, කිරි මුදා හැරීම වැඩි වන විට ළදරුවාගේ කිරි උරා බීම වැඩි වේ.
- එමෙන් ම කන් පුඩුවලට ලැබෙන ස්පර්ශ උත්තේජනයෙන් දිගින් දිගට ම ඔක්සිටෝසින් නිදහස් වීම සිදු වීමෙන් ස්කන්ධ ග්‍රන්ථි මඟින් තවදුරටත් කිරි මුදා හැරීම ද සිදු වේ.

මවු කිරිවල සංරචක හා මවු කිරි දීමේ වැදගත්කම

- ළදරුවාගේ උපතින් පසුව පළමු දින කිහිපයක් තුළ දී ස්කන්ධ ග්‍රන්ථි මඟින් 'කොලෙස්ට්‍රල්' නම් තුරලයක් කිරි ස්‍රාවයට ප්‍රථම ව නිකුත් වේ.
- මානව ක්ෂීරණය ජීවාණුහරිත ද්‍රාවණයක් වන අතර එහි ලැක්ටෝස්, මේද අම්ල, ඇමයිනෝ අම්ල, ඛනිජ ලවණ, විටමින් හා ජලය අඩංගු වේ.
- මේ ද්‍රාවණය ළදරුවාගේ ජීරණය, මොළයේ විකසනයට හා වර්ධනයට ඉතා සුදුසු ය.
- තව ද මානව ක්ෂීරණයේ, කේසින්, ලැක්ටේස්සීම් හා ඉම්යුනොග්ලොබියුලින් නම් ප්‍රෝටීන අඩංගු වේ.
- කොලෙස්ට්‍රල් හා ක්ෂීරණය ළදරුවාට පෝෂණය සපයයි.
- එහි ළදරුවාට අවශ්‍ය වැදගත් ප්‍රතිදේහ ද අඩංගු වේ.
- ළදරුවාට ඇති වන ක්ෂුද්‍රජීවී ආසාදනවලට ප්‍රතිරෝධී වීමට සුදු රුධිරාණු වර්ග කිහිපයක් ද මානව ක්ෂීරණයේ දැකිය හැකි ය.
- මවු කිරි හා සැසඳීමේ දී කොලෙස්ට්‍රල් වල අඩු පෝෂක ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ (ලැක්ටේස් සුලු ප්‍රමාණයක් හා මේදය නැත).
- එහෙත් ඒවා මුල් පෝෂණ අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමාණවත් වේ.
- මවු කිරි දීම ළදරුවාගේ ප්‍රශස්ත වර්ධනයට දායක වේ.
- එමෙන් ම ළදරුවාගේ මානසික වර්ධනයට සහ මව හා දරුවා අතර මූලික හා දීර්ඝ කාලීන සම්බන්ධතාවට බලපායි.
- එළකිරි හා සැසඳීමේ දී මවු කිරිවල මේදය, යකඩ හා ප්‍රෝටීන වඩාත් වේගයෙන් පරිවෘත්තියට භාජනය වේ.
- තව ද මවු කිරිවල ඇති අඩු සෝඩියම් සාන්ද්‍රණය ළදරුවාගේ අවශ්‍යතාවට වඩාත් ගැළපේ.
- වෙනත් ප්‍රභවවල කිරිවලට වඩා ළදරුවාගේ අසාත්මිකතා ඇති වීමේ සම්භාවිතාව මවු කිරිවල අවම වේ.

උපත් පාලන ක්‍රම

- අනවශ්‍ය පිළිසිදු ගැනීම් වැළැක්වීමේ ක්‍රම ලෙස දැක්විය හැකි ය.
- මෙය ක්‍රම කිහිපයකින් සිදු කළ හැකි ය.
- සමහර උපත් පාලන ක්‍රම මඟින් ජන්මාණු විකසනය වීම හා නිදහස් කිරීම වළක්වාලයි.
- සමහර ක්‍රම මඟින් ජන්මාණු සංසේචනය වීම වළක්වාලයි.
- තවත් සමහර ක්‍රම මඟින් කාලයෙන් අධිරෝපණය වීම වැළැක්වේ.
- අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීම් මේ උපත් පාලන ක්‍රම මඟින් වැළැක්විය හැකි ය.

බහුලව භාවිත වන කාලකාලීන උපත් පාලන ක්‍රම

- සක්‍රීන් සඳහා වූ ගිලින පෙති
 - බොහෝ ගිලින පෙතිවල කෘත්‍රීම ඊස්ට්‍රජන් හා ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් ඉහළ සාන්ද්‍රණයක් සහිත.
 - ඒ නිසා සෑහ ප්‍රතිපෝෂණ හරහා හයිපොතාලමියෙන් GnRH නිදහස් කිරීම ද, පූර්ව පිටියුටරියෙන් FSH හා LH ස්‍රාවය වීම ද නිශේධනය වේ.
 - LH නිදහස් කිරීම වැළැක්වීමත් බිම්බ මෝචනය ඇත හිටී.
 - FSH ස්‍රාව නිශේධනයෙන් ස්‍රාවනීයා සෛල පරිණත වීම වැළැක්විය හැකි ය.
 - සමහර ගිලින පෙතිවල කෘත්‍රීම ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් (ප්‍රොජෙස්ටීන්) පමණක් ඉහළ සාන්ද්‍රණවලින් අඩංගු වේ.
 - එයින් ගැබ්ගෙල ශ්ලේෂ්මල සන වීම මඟින් ගර්භාශයක ශුක්‍රාණු ප්‍රවේශය වළක්වාලයි.
 - සංසේචනයක් සිදු වුව ද එය අධිරෝපණය අවහිර කරයි.
- උපත් පාලන කොසු
 - පුරුෂයන් සඳහා ඇති ශුක්‍රාණු ප්‍රවේශය වළක්වන ක්‍රමයකි.
- IUD (ලුපය)
 - කාන්තාවන් සඳහා භාවිත කෙරේ.
 - මේ උපකරණය ගර්භාශයේ තැන්පත් කරන අතර, සංසේචනය හා සංසේචිත ඩිම්බයක් අධිරෝපණය වීම වළැක්වේ.
- Depo-Provera නම් කාන්තාවන් සඳහා වූ එන්නත
 - කෘත්‍රීම ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන්, නියමිත කාලාන්තර අනුව එන්නත් කිරීමෙන් ගැබ්ගෙල ශ්ලේෂ්මලයේ සනකම අධික වී ශුක්‍රාණු ඇතුළු වීම වැළැක්විය හැකි ය.
 - සංසේචනයක් සිදු වුව හොත් එන්ඩොමෙට්‍රියම තුනී කිරීම නිසා අධිරෝපණය වැළැක්වේ.
- ශල්‍යකර්මයක් මඟින් සිදු කරන ස්ථිර උපත් පාලනය (ජන්මාණු නිදහස් වීම වළක්වාලයි)

- පුරුෂයන් සඳහා: වාසේක්කම් ශල්‍යකර්මය - ශුක්‍රාණු නිදහස් කිරීම වළකාලයි.
- කාන්තාවන් සඳහා: පැලෝසිය නාල සැත්කම (LRT) - ගර්භාශයට ඩිම්බ පිවිසීම වළකාලයි.

ගබ්සා කිරීම

- ගර්භණිභාවයේ අපරිණත අවධියේ දී අවසන් වීම මෙයින් සිදු වේ.
- ස්වාභාවිකව ගබ්සා වීම මෙහි දී ස්වයං-සිද්ධව සිදු වන හදිසි ගබ්සා වීම ලෙස හැඳින්විය හැකි ය.
- ප්‍රේරිත ගබ්සා සිදු කිරීම (එය ශල්‍යකර්මයකින් හෝ වෙනත් ශල්‍යකර්ම නොවන ක්‍රම මගින් සිදු කරයි). සමහර මාසයක භාවිතයෙන් සංසේචනයේ සිට සති 7ක කාලයක් ඇතුළත ගබ්සා වීම ශල්‍යකර්මය නොවන ක්‍රමයකි. එහි දී ගර්භාශයේ ප්‍රොජෙස්ටෙරෝන් ප්‍රතිග්‍රාහක අවහිර කරන අතර, එමගින් ගර්භණිභාවය පවත්වා ගෙන යෑම වළක්වයි.

ගර්භණි සමයේ ආබාධ හඳුනා ගැනීම

- ගර්භණි කාලය තුළ දී බොහෝ විකසන ගැටලු හා ප්‍රවේණික සංකූලතා හඳුනා ගත හැකි ය.
- හූණයේ ප්‍රමාණය හා තත්ත්වය දැන ගැනීම සඳහා අතිධ්වනි (ultrasound) ඡායාරූප භාවිත කළ හැකිය.
- කෝරියම් අංශුලිකා හා කලලාචාරික කරලය ලබා ගැනීම
 - කරලය වටා ඇති කලලාවරික තරලයෙන් හෝ කරලය වටා ඇති පටක මගින් හූණ සෛල කටුවක් (needle) මගින් ලබා ගැනීම මෙහි දී සිදු වේ.
 - මේ නිදර්ශකය මගින් ප්‍රවේණික විශ්ලේෂණය සිදු කළ හැකි ය.
 - නවතම ක්‍රම මගින් ගර්භණි මවගේ රුධිර භාවිතයෙන් හූණයේ ගෙනෝමය විශ්ලේෂණය කළ හැකි ය.
 - මවගේ රුධිරයේ හූණ DNA ඇති හෙයින් එය පහසු වේ.
 - එහෙත් සියලු හඳුනා ගත හැකි සංකූලතා, කරලය ගර්භාශය තුළ පවතින විට ප්‍රතිකාර කළ නොහැකි වන අතර උපතින් පසුව ද බොහෝ ඒවා නිවැරදි කළ නොහැකි ය.
 - කෙසේ නමුත් මේ පරීක්ෂණ මගින් මවුපියන්ට අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම සඳහා ඔවුන් කලින් දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව ලැබේ.

නිසරුභාවය

- දරුවකු පිළිසිඳ ගැනීමට ඇති නොහැකියාව මෙසේ හැඳින්වේ.
- මවගේ හා පියාගේ යන දෙදෙනාගේ කවරකුගේ හෝ ප්‍රජනක අක්‍රමිකතා නිබිම් හේතුවෙන් වඳ භාවය ඇති විය හැකි ය.

- නවීන සමාජයේ මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන යුවල ගණන අධික ය.
- සමහර වඳභාවය සහිත අවස්ථා නිවැරදි කිරීමට ද හැකියාවක් ඇත.

නිසරුභාවයේ ගැටලුකාරී තත්ත්ව මඟ හරවා ගැනීමට භාවිත වන නවීන ප්‍රජනක කාක්ෂණය

- වර්තමානයේ විද්‍යාත්මකව හා තාක්ෂණිකව දියුණු ක්‍රම මගින් සමහර වඳ භාවය සම්බන්ධ ගැටලු විසඳිය හැකි ය.
- මීට හෝමෝන ප්‍රතිකාර, ශල්‍යකර්ම හා සමහර ආධාරක ප්‍රජනක කාක්ෂණ ක්‍රම ද අයත් වේ.
 - හෝමෝන ප්‍රතිකාර: සමහර අවස්ථාවල දී නිසරු පිරිමින්ගේ ශුක්‍රාණු නිපදවීම වැඩි කිරීම හා නිසරු කාන්තාවන්ගේ ඩිම්බ නිපදවීම වැඩි කිරීම මෙමගින් සිදු වේ.
- ශල්‍යකර්ම නියමාකාරව නොසැකසුණු ප්‍රජනක පද්ධතියට අයත් නාල හෝ නාලවල අවහිරතා පවතින විට ශල්‍යකර්ම මගින් නිවැරදි කර වඳ භාවය ඉවත් කිරීම මෙහි දී සිදු වේ.

- ආධාරක ප්‍රජනක කාක්ෂණ ක්‍රමවේද: නාලස්ථව සිදු කරන සංසේචනය (IVF): මෙය වඳ භාවය සම්බන්ධ ගැටලුවලට ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රියාවලියක් වන අතර, එමගින් දරුවකු පිළිසිඳ ගැනීම සඳහා අවකාශ සලසයි.

මෙහි දී ඩිම්බ කෝෂයකින් ඉවත් කර ගත් ඩිම්බ සෛලයක් ශුක්‍රාණුවක් සමඟ විද්‍යාගාර තත්ත්ව යටතේ සංසේචනය වීමට සැලැස්වීම සිදු කෙරේ.

සෛල 8ක් පමණ වන අවස්ථාව තෙක් සංසේචන ඩිම්බය ඩිජිනීෂණය වීමට සලසා ඉන් පසු කාන්තාවගේ ගර්භාශයේ මේ කලලය අධිරෝපණය කරන අතර එහි දී කලලය විකසනය වීමට සලස්වයි.

හොඳ සංසේචනය වීමක් සාම්ප්‍රදායික IVF ක්‍රමය යටතේ සිදු කිරීමට නම් එක් ඩිම්බ සෛලයක් සඳහා ශුක්‍රාණු (50000-100000) පමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.

මීට හේතුව IVF ක්‍රමය යටතේ ශුක්‍රාණුවල අග්‍ර දේහ ක්‍රියාව සිදු වීම සඳහා ශුක්‍රාණු අක්ෂණයක් අවශ්‍ය වීමයි.

අන්ත: සෛල්ලාස්මීය ශුක්‍රාණු නික්ෂේපණ ක්‍රමය (ICSI)

මෙයත් නාලස්ථව සිදු කරනු ලබන සංසේචන ක්‍රමයක් වන අතර, පිරිමින්ගේ වඳ භාවය හේතුවෙන් සිදු කෙරේ.

පරිණත ශුක්‍රාණුවල යම් ආසාදාත්මකතාවක් හෝ

ජලය හා වාතය තුළින් සතුන්ගේ චලනයන්

ජලයේ පිහිනීම

- විවිධ සත්ත්ව කණ්ඩායම්වලට අයත් සත්තු විවිධ පිහිනුම් ක්‍රම අනුගමනය කරති.
- ඇතැම් සත්තු තම ගාත්‍රා හඬල් ලෙස යොදා ගනිමින් ජලය පිටුපසට තල්ලු කරමින් ගමන් කරති.
උදා: කෘමීහු, සිවුපා පෘෂ්ඨවංශීහු
- ඇතැම් සත්තු දේහ තුළට ජලය ඇතුළු කර ගෙන ඉන් පසු එම ජලය පිටතට විදීම මගින් ජෙට් යානයක් මෙන් කරන ආකාරයට ගමන් කරති.
උදා: දැල්ලෝ
- මත්ස්‍යයෝ තම දේහය හා වලිගය දෙපසට චලනය කරමින් පිහිනා යති.
- ජලජ ක්ෂීරපායීහු තම දේහය හා වලිගය තරංගාකාරයට ඉහළට හා පහළට චලනය කරමින් ගමන් කරති.
- උදා: තල්මස්ස හා ඩොල්පින් මත්ස්‍යයෝ වේගයෙන් පිහිනා යෑමට ඒ සතුන්ගේ දේහයේ හැඩය අනාතුල වීම ප්‍රධානතම අනුවර්තනයකි.

වාතයේ පියාසර කිරීම

- සතුන් වාතය තුළින් ගමන් කරනුයේ ප්‍රධාන වශයෙන් පියාසර කිරීමෙනි.
- ඇතැම් අවස්ථාවල දී විසර්ජනය (Gliding) මගින් ද චලනය සිදු කරති.
- පියාසර කරන සත්තු ඔවුන්ගේ පියාසරේ ආධාර කර ගෙන දේහය ගුරුත්වයට එරෙහිව ඔසවා තබා ගනිති.
- පියාසර වාතය (Air foil) ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඔවුන්ගේ දේහ හැඩය මගින් වායුධාරා වෙනස් කරමින් පියාසැරියට ආධාර කරයි.
- පක්ෂීන්ගේ අනාතුල හැඩය ද වායු ප්‍රතිරෝධය අවම කිරීමට ආධාර වෙයි.

මානව සැකිල්ල

මානව සැකිල්ල ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත.

(1) ආක්ෂක සැකිල්ල

මෙයට හිස්කබල, කශේරුව, උරෝස්ථිය හා පර්ශු අයත් ය.

(2) ගාත්‍රා සැකිල්ල

මෙයට උර හා ශ්‍රෝණි මේඛලාත් ගාත්‍රා යුගල් දෙකක් අයත් ය.

මානව ආක්ෂක සැකිල්ලේ සංවිධානය

හිස් කබල

- මිනිසාගේ හිස්කබල කශේරුවේ ඉහළ කෙළවර රඳා සිටියි.
- අස්ථි විසි දෙකකින් සමන්විත හිස්කබලේ බොහෝ අස්ථි අතර අස්ථි හවනය වුණු සන්ධි/ සිව්නි දක්නට ඇත.

- හිස්කබල, කපාලය (මොළයේ ආවරණය) හා වක්ත්‍රාලය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකි.

කපාල අස්ථි වක්‍රයේ

- ලලාට අස්ථිය
- පාර්ශ්ව කපාල අස්ථි යුගලය
- ගංඛක අස්ථි යුගලය (කණු මාල)
- අපර කපාල අස්ථිය
- ජ්‍යාස්ථිය
- කීලාස්ථිය





Figure 16.16 The bones of the face. Anterior view.

- මුහුණ සාදන අස්ථි/ වක්ත්‍ර අස්ථි - ලලාට අස්ථියට අමතරව තවත් අස්ථි දහහතරක් අන්තර්ගත ය.
- යුග අස්ථි යුගලය, කණු මාල
- උඩු හනු අස්ථි යුගලය (එකිනෙකට සම්බන්ධ වී ඇත).
- නාසාස්ථි යුගලය නාභ්‍ය ද්වය
- කාලව අස්ථි යුගල තුල්‍ය
- ආශ්‍රිත අස්ථි යුගලය නාභ්‍ය ජ්‍යාස්ථිය
- අධර නාසා කම්බු අස්ථි යුගලය (inferior conchae) තල්ලව ද්වය
- කනි අස්ථියක් වන හලාස්ථිය නාභ්‍ය ජ්‍යාස්ථිය
- හකු ඇටය (අධෝහනුක අස්ථිය) මැද

කපාල ප්‍රදේශය

- මානව කපාල ධාරිතාව 1.5L පමණ වෙයි.
- එමඟින් මොළය ආවරණය හා ආරක්ෂාව සිදු කරයි.
- අභ්‍යන්තර කන, මැද කන, ආක්‍රාණ අවයව, ඇස් ආරක්ෂා කිරීම ද සිදු කරයි.
- අස්ථිමය අක්ෂි කුප, අක්ෂි පේශිවලට සන්ධාන පාෂ්ඨ සපයමින් අක්ෂි චලනයට ආධාර කරයි.
- කපාලයේ අධර පාෂ්ඨයේ පිහිටන මහාජිද්‍රව මගින් සුක්‍රමිකාවට මාර්ගය සලසයි.
- එමෙන් ම මහාජිද්‍රව දෙපස පිහිටන සුමට රවුම් ගැටිති යුගලය (අපර කපාල සන්ධාන අග්‍ර) පළමු කශේරුකාව වන ඇට්ලස් කශේරුකාව මත සන්ධානය වීමෙන් හිස ඉහළ පහළ චලනය කිරීමට ආධාර කරයි.
- ඇතැම් කපාල අස්ථි අතර පිහිටන මෘදු පටලමය ප්‍රදේශ රත්ථු ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
- ඒවා මගින් අස්ථි සම්පීඩනය සඳහා ඉඩ සලසමින් ප්‍රසූතිය පහසු කරයි.
- වයස අවුරුදු 1-2ක් අතර කාලයේ දී රත්ථු අස්ථි මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය සිදු වෙයි.
- කපාල අස්ථි අතර චලනය කළ නොහැකි සන්ධි වන සිව්නි පවතින අතර එමඟින් කපාලයට වඩාත් ආරක්ෂාව සපයයි.
- හිස්කබලේ ඇති ඇතැම් අස්ථි තුළ එනම් කීලාස්ථිය, ජිප්‍රාස්ථිය උර්ධව හනුක අස්ථිය හා ලලාටාස්ථිය, පවතින පක්ෂ්මධර ශ්ලේෂ්මල පටලයෙන් ආස්තරණය වූණු වාතය පිරී තුහර කෝටරක ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
- කෝටරක සියල්ල නාස් තුහරය සමඟ සම්බන්ධ වේ.
- එමඟින් කටහඬ අනුනාද කිරීමටත් හිස්කබලේ බර අඩු කිරීමටත් දායක වෙයි.

වක්ත්‍ර ප්‍රදේශය

- කපාල අස්ථිවලට පහළින් පිහිටයි.
- ඇතැම් වක්ත්‍ර අස්ථි නාස් තුහරයේ අපර කොටසේ බිත්ති සාදමින් නාස් මාර්ගයේ ඉහළ ප්‍රදේශය ගොඩනැංවීමට දායක වෙයි.
- උර්ධව හනුක අස්ථිය හා අධෝහනුව මගින් දත් සවි වීමට අවශ්‍ය කුප සාදා ඇත.
- උර්ධව හනුක අස්ථිය කපාලයට සම්බන්ධ ය. අධෝහනුව චලනය කළ හැකි ය.
- මුඛ තුහරය හා නාස් මාර්ගය වෙන් කරන්නේ අස්ථිමය දැඩි තල්ල හා කාරිලේප්මය මෘදු තල්ල මඟිනි.
- අධෝහනුව කපාලය සමඟ සන්ධානය වී ඇත.
- වක්ත්‍ර අස්ථියක් වන යුග අස්ථියේ කොටසක් හා ශංඛක අස්ථියේ කොටසක් සම්බන්ධ වී ගොඩනැංවෙන යුග වක්‍රය මගින් අධෝහනුව චලනය කිරීමට අවශ්‍ය පේශි සන්ධානය වීමට සන්ධාන මුහුණත්/පාෂ්ඨ සපයනු ලැබේ.
- අධෝහනුක අස්ථියේ ප්‍රසර දෙකක් ඇත.

(1) සන්ධාන අග්‍ර ප්‍රසරය

ශංඛක අස්ථිය සමඟ සන්ධානය වීමෙන් ශංඛක අධෝහනුක සන්ධිය සාදයි. **ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා වන පොතකි.**

(2) තුණ්ඩාකාර ප්‍රසරය

පේශි හා බන්ධනී සන්ධානයට පාෂ්ඨ සපයයි.

- කපාලය පත්ලේ අපර කලාප අස්ථිවලට සම්බන්ධිතව අපර කපාල සන්ධාන අග්‍ර යුගලකි.
- ඒවා ඇට්ලස් කශේරුකාව මත සන්ධානය වෙමින් අසවි සන්ධි සාදයි.

ශංඛක අස්ථියක ප්‍රසර තුනක් හමු වෙයි.

(1) යුග ප්‍රසරය

ශංඛක අස්ථියේ යුග ප්‍රසරය සාදයි

(2) වූවුකාකාර ප්‍රසරය

පේශි සන්ධානයට මුහුණත සපයයි **(භ්‍යාජ්‍ය)**

(3) කීලාහ ප්‍රසරය

පේශි සන්ධානයට මුහුණත සපයයි **(෧෧)**

කශේරුව

- මානව කශේරුව ශක්තිමත් සුනම්‍ය දණ්ඩකි.
- රේඛීයව සැකසුණ අස්ථි විසිහයකින් සමන්විත වන අතර, ඉන් විසිහතරක් එකිනෙකින් වෙන් වූණු තනි කශේරුකායි.
- හිස්කබලේ අපර කපාල අස්ථියේ සිට පහළට දිවෙන ව්‍යුහයකි.
- ත්‍රිකාස්ථිකය, එකිනෙක බද්ධ වන කශේරුකා පහකින් ද අනුත්‍රිකාස්ථිකය එකිනෙක බද්ධ වූණු කුඩා කශේරුකා හතරකින් ද සමන්විත ය.
- මානව කශේරුව නිශ්චිත ප්‍රදේශ හතරකට වෙන් කළ හැකි ය.

(1) ග්‍රෙව් පෙදෙස - ෧෧ ෧෧

කශේරුකා හතකින් සමන්විත ය.

(2) උරස් පෙදෙස -

කශේරුකා දොළහකින් සමන්විත ය.

(3) කට් පෙදෙස - (භ්‍යාජ්‍ය හර්ෂ)

කශේරුකා පහකින් සමන්විත ය.

(4) ත්‍රිකාස්ථික පෙදෙස (කට් කශේරුකාවල අවසාන

- ① අස්ථිය සන්ධානය වී ඇත) හා එයට ම බද්ධ වූණු අනුත්‍රිකාස්ථික පෙදෙස - කශේරුවේ අග කෙළවරේ පිහිටයි.

෧) අනුක්‍රමාංකිත . ①

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා වන පොතකි. .




Figure 15.19 The vertebral column. Lateral view.

අක්ෂර චක්‍රය
ආවේණික භාගය

දෙවන චක්‍රය කට්ඨ චක්‍රය ලෙසද හැඳින්වේ (7-8) පමණ වීම ඇති වේ.

එවිට ලෙසද හැඳින්වේ කම දේහය සෘජුව තබා ගැනීමට/ සිට ගැනීමට හැකි වෙයි.

දර්ශීය කශේරුකාවක ව්‍යුහය :



කට්ඨ කශේරුකා දර්ශීය කශේරුකා ලෙස සලකනු ලබයි.

දර්ශීය කශේරුකාවක් කශේරුකා දේහයකින් හා කශේරුකා චක්‍රයකින් සමන්විත ය.

(1) කශේරුකා දේහය -

- කශේරුකාවක ඇති විශාලතම පැතලි පුළුල් ප්‍රදේශයයි.
- එක් එක් කශේරුකාවක දේහයේ පැතලි පෘෂ්ඨය, යාබද කශේරුකාවේ එයට අදාළ පෘෂ්ඨය සමඟ ස්ථානගත වන අතර, එම නිසා, කශේරුව තුළ කශේරුකා එක මත එක ඇසිරී පවතී.
- එක් කශේරුකාවක කශේරුකා දේහය ඊට යාබද කශේරුකා දේහය සමඟ සෘජුව එක මත එක සන්ධානය නොවන අතර, කශේරුකා දේහ දෙකක් අතර අන්තර් කශේරුකා මඬුල නමැති සම්මන් කාටිලේජමය ඵලකයක් පවතී.
- කශේරුව ඔස්සේ පහළට ගමන් කරන විට කශේරුකා දේහ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙයි.
- එමඟින් දේහ බර දරා ගැනීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

(2) කශේරුකා චක්‍රය -

- කශේරුකා ජිද්‍රය වටා පිහිටමින් එය ආවරණය කරයි.
- එක මත එක පිහිටන කශේරුකා ජිද්‍ර එක්ව ගත් කල කශේරු නාලය සෑදේ.
- එතුළින් සුෂුම්නාව ගමන් කරයි.
- කශේරුකා චක්‍රයෙන් පැන නගින විවිධ ප්‍රසාර මගින් ජේෂි සන්ධානයට අවශ්‍ය පෘෂ්ඨ සපයයි.

කශේරුකා චක්‍රයෙන් දෙපසට හට ගන්නා ප්‍රසාර නිර්දේශ ප්‍රසාර ලෙසත්, අපර දෙපසට හට ගන්නා ප්‍රසාරය කශේරුකා ප්‍රසාරය ලෙසත් හඳුන්වයි.

කශේරුකා චක්‍රය සතුව සන්ධාන පෘෂ්ඨ හතරක් පවතී.

- උත්තර සන්ධාන පෘෂ්ඨ යුගලය එයට ඉහළින් ඇති යාබද කශේරුකාව සමඟත්
- අධර සන්ධාන පෘෂ්ඨ යුගලය ඊට පහළින් ඇති යාබද කශේරුකාව සමඟත් සන්ධානය වෙයි.

කශේරුකා ජිද්‍රය - භූප්‍රමාණවත් ගමන් කරයි

R B ඡේෂ් ර් diagrams බලන්න.

- මානව කශේරුව චක්‍ර හතරකින් සමන්විත ය. එනම්,
- (1) ග්‍රේවී චක්‍රය - ද්විතියික චක්‍රය
- (2) කට්ඨ චක්‍රය - ද්විතියික චක්‍රය
- (3) උරස් චක්‍රය - ප්‍රාථමික චක්‍රය
- (4) ක්‍රිකාස්ථික චක්‍රය - ප්‍රාථමික චක්‍රය

මින් චක්‍ර දෙකක් ප්‍රාථමික චක්‍ර වන අතර, දෙකක් ද්විතියික චක්‍රය.

මේ චක්‍රවල ප්‍රධානතම කාරණ සෘජු ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීම වේ.

ප්‍රාථමික චක්‍ර
භූරේ අවධියේ දී කශේරුවට ඇත්තේ තනි චක්‍රයකි. මෙය පූර්වව අවතල චක්‍රයාවකි. ද්විතියික චක්‍ර හට ගැනීමෙන් පසු, කශේරුවේ උරස් හා ක්‍රිකාස්ථික චක්‍ර දෙකටම පමණක් පූර්වව අවතල ප්‍රාථමික චක්‍ර ඉතිරිව පවතී.

ද්විතියික චක්‍ර
ඉපදීමෙන් මාස තුනකට පමණ පසු ග්‍රේවී චක්‍රය හට ගන්නා අතර ඒය ලෙසද හැඳින්වේ හිස එසවීමට උපකාරී වේ. ඉන් පසු ලෙසද හැඳින්වේ හිස සෘජුව තබා ගැනීමට හැකි වෙයි.

ප්‍රදේශවලට අදාළ කශේරුකාවල ලාක්ෂණික
ග්‍රේවී කශේරුකා

උරස් කශේරුකා කුරුමා දේහය
හා මාංශපේශික ක්‍රියා ක්‍රමය
වලට හා භෞමික වාතාවරණයට




Figure 16.21 A cervical vertebra, showing typical features. Viewed from above.





Figure 16.20 A lumbar vertebra showing the features of a typical vertebra. Viewed from above.

- කශේරුවේ ඉහළින් ම පිහිටන කශේරුකා හතයි. කුඩාම කශේරුකා වර්ගයයි.
- අනෙකුත් කශේරුකා වර්ගවලට සාපේක්ෂව කුඩා ම කශේරුකා දේහයක් ඇත්තේ මේ ග්‍රේවී කශේරුකාවලටයි.
- මේ ග්‍රේවී කශේරුකාවල කීර්යක් ප්‍රසාරවල දෙපසින් කුඩා ජිද යුගලක් ඇත.
- ඒවා තුළින් කශේරුකා ධමනිය ගමන් කරයි. එමෙන් ම බොහෝ විට කශේරුකාවල කණ්ටක ප්‍රසාරය ද්විතීයික ය. (C_2-C_6)
- පළමු ග්‍රේවී කශේරුකාව ඇටිලස් කශේරුකාවයි. එය මත හිස්කබල සන්ධානය වී පවතියි.
- ඇටිලස් කශේරුකාව අස්ථිමය වළල්ලක් බඳු අතර, එයට නිශ්චිත කශේරුකා දේහයක් හෝ කණ්ටක ප්‍රසාරයක් නැත. (ක්‍රිකර්ට් ක්‍රියා රූපය බලන්න)
- එයට ඉතා කෙටි කීර්යක් ප්‍රසාර යුගලක් ඇත. (ජිද යුගලය)
- කශේරුකාවේ පිහිටන පැතලි සන්ධාන පාෂාණ යුගලය මත හිස්කබලේ අපර කපාල සන්ධාන මුහුණත් සමඟ සන්ධානය (සන්ධාන සන්ධි) වෙමින් හිස උස් පහත් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
- මෙහි කශේරුකා ජිදය සාපේක්ෂව විශාල ය.
- මෙමගින් සුළුමනාවේ විශාලිත පූර්ව ප්‍රදේශයට ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
- දෙවන ග්‍රේවී කශේරුකාව අක්ෂ කශේරුකාවයි.
- එයට කුඩා කශේරුකා දේහයක් ඇත.
- ඒ දේහයට සම්බන්ධ දත්තාකාර ප්‍රසාරය නමැති උත්තරව විහිදෙන ප්‍රසාරයක් ඇත.
- ඒ ප්‍රසාරය ඊට ඉහළින් ඇති ඇටිලස් කශේරුකාවට සන්ධානය වෙයි.
- හිස්කබල හා ඇටිලස් කශේරුකාව දත්තාකාර ප්‍රසාරය මත භ්‍රමණය වීම මගින් හිස දෙපැත්තට හැරවීමට ඉඩ සැලසෙයි.

- උරස් කශේරුකා දෙසැහකි. මේවා ග්‍රේවී කශේරුකාවලට සාපේක්ෂව විශාල ය.
- ග්‍රේවී කශේරුකාවලට සාපේක්ෂව ගුරු බර වැඩි ප්‍රමාණයක් දරා සිටින්නේ මේ පෙදෙසයි.
- නිශ්චල ගැටිල්ලක්
- කශේරුකා දේහයේ සහ කීර්යක් ප්‍රසාරවල පරිශ්‍ර සඳහා සන්ධාන මුණත් පිහිටා ඇත.

කටි කශේරුකා

හා මාංශ පේශී කුරුමා වල ව්‍යුහ




Figure 16.20 A lumbar vertebra showing the features of a typical vertebra. Viewed from above.

- කටි කශේරුකා පහකි.
- මේවා විශාලතම කශේරුකායි.
- දේහයේ ඉහළ කොටසේ බර දරා ගැනීමට ආධාර වෙයි.

① ② ශ්‍රේණි ගැහැරුණු වල ක්‍රියා රූපය බලන්න.

- සාපේක්ෂව විශාල කශේරුක දේහයකි.
- කණ්ඩක ප්‍රසාරයකි.
- දේහයේ පිටුපස ප්‍රදේශයේ පේශි සන්ධානයට මුණත් සැපයීම සඳහා සාපේක්ෂව විශාල කණ්ඩක ප්‍රසාර ඇත.

ත්‍රිකාස්ථිය හා අනුත්‍රිකාස්ථිය




Figure 16.24 The sacrum and coccyx. A. Anterior view. B. Lateral view.

- ත්‍රිකාස්ථිය අවශිෂ්ට කශේරුකා පහක් එකට හා විමෙන් සැදුණ ත්‍රිකෝණාකාර හැඩති විශාල අස්ථියකි.
- මෙහි පූර්ව ප්‍රදේශය අවතලනය වී ඇත. පස්වන කටි කශේරුකාව මෙහි ඉහළ ප්‍රදේශයට සන්ධානය වෙයි.
- මෙය ශ්‍රෝණි මේඛලාව සමඟ දෙපසින් සන්ධානය වෙයි.
- ත්‍රිකාස්ථිය අධරව අනුත්‍රිකාස්ථියට සන්ධානය වෙයි.
- ත්‍රිකාස්ථියේ එක් එක් පස ශ්‍රෝණි ජිද්‍ර ශ්‍රෝණියක් ලෙස පිහිටා ඇත.
- මේවා ස්නායුචලට පිට විමට ඉඩ සලසයි.
- අනුත්‍රිකාස්ථිය අවසාන කශේරුකා හතරක් එකිනෙක හා විමෙන් සැදුණ කුඩා ත්‍රිකෝණාකාර අස්ථියකි.
- අනුත්‍රිකාස්ථියේ පළල් පාදස්ථ ප්‍රදේශය ත්‍රිකාස්ථියට බද්ධ වී ඇත.

මානව කශේරුවේ පොදු කෘත්‍ය

- (1) සෘජු ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීමට ආධාර වීම
- (2) හිස්කබලට සන්ධාරණය සැපයීම සහ පර්ශු හා මේඛලාවලට සන්ධාන පෘෂ්ඨ සැපයීම
- (3) සුළුමනාව ආරක්ෂා කිරීම
- (4) කශේකාරු ජිද්‍ර මගින් ස්නායු රුධිර නාල හා වසා නාල ගමන් කිරීමට අවකාශ සැලසීම
- (5) දේහ චලනවල දී නම්‍යශීලී බවක් සැපයීම
- (6) අන්තර් කශේරුක මඬල කම්පන අවශෝෂක ලෙස ක්‍රියා කරමින් සුළුමනාව ආරක්ෂා කිරීම

උරෝස්ථිය

ගුණිත, පර්ශු හා මිනිසා

- දිගු, පැතලි අස්ථියකි.
- උරස් කුඩුවේ පූර්ව ප්‍රදේශය සෑදීමට දායක වෙයි (උරෝස්ථිය පර්ශු හා උරස් කශේරුකාවලින් උරස් කුඩුව සෑදී තිබේ).
- උරෝස්ථියේ උත්තර කොටස උරෝස්ථි මීට ලෙස නම් කරයි.
- උරමේඛලාවේ අක්ෂකාස්ථි යුගල හා පළමු හා දෙවන පර්ශු යුගල උරෝස්ථි මීට සමඟ සන්ධානය වෙයි.
- උරෝස්ථියේ මීටට පහළින් ඇති මධ්‍යම ප්‍රදේශය දේහයයි.
- එය ඉතිරි පර්ශු සමඟ සන්ධානය වෙයි.
- උරෝස්ථියේ අග කොටස අසිපත් පසුරය ලෙස නම් කරයි.
- මෙය මහා ප්‍රාචීරයට හා උදර බිත්තියේ පූර්වට පිහිටන පේශිවලට සන්ධාන පෘෂ්ඨය සපයයි.
- උරෝස්ථිය එයට පිටුපසින් පිහිටන අවයව (හෘදය හා පෙනහැලි) හා රුධිර නාලවලට ආරක්ෂාව සපයයි.
- උරෝස්ථිය තුළ ඇති රතු ඇටමිදුර රක්තාණු නිපදවන ප්‍රධානතම මධ්‍යස්ථානයකි.

පර්ශු

පර්ශු ජීවියා දිගු ජීවිතයක්




Figure 16.28 The thoracic cage. Anterior view.

- පර්ශු යුගල දොළහකි.
- මේවා උරස් කුඩුවේ පාර්ශ්වික බිත්ති සෑදීමට දායක වෙයි. වක්‍රාකාර වූ දිගු අස්ථි වර්ගයකි.
- දේහයේ අපර පැත්තේ දී පර්ශු උරස් කශේරුකා සමඟ සන්ධානය වෙයි.
- පූර්ව 1-7 දක්වා පර්ශු උරෝස්ථිය සමඟ කෙළින් ම සන්ධානය වෙයි.
- ඒවා සත්‍ය පර්ශු ලෙස හැඳින්වේ.
- 8, 9, 10 පර්ශු උරෝස්ථියට අනියම්ව සම්බන්ධ වේ.
- අවසාන පර්ශු යුගල දෙක උරෝස්ථියට සම්බන්ධ නොවන නිසා පාවෙන පර්ශු ලෙස හැඳින්වේ.

- පරිශුච්ඡ කිසි උරස් කශේරුකාවේ කශේරුකා දේහය සමඟත්, ගැටිත්ත කිරිසක් ප්‍රසර සමඟත් සන්ධානය වෙයි.
- මෙම දෙභාකාරයේ දීම පරිශුච්ඡ කාටිලේජය හරහා පරිශු උරෝස්ටිය සමඟ සම්බන්ධ වෙයි.
- උරස් කුඩුවට අයත් උරෝස්ටිය හා පරිශු ආශ්වාස-ප්‍රශ්වාස යන්ත්‍රණයේ දී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
- පරිශු දෙකක් අතර පිවිටන අන්තර්පරිශුච්ඡ පේශී සංකෝචනය වීම මඟින් ආශ්වාස-ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලියේ දී පරිශු කුඩුව වලනය කරවයි. පළමු පරිශුව උරෝස්ටියට හා උරද් කශේරුකාවලට තදින් සම්බන්ධව පවතියි.
- ඒ නිසා ආශ්වාසයේ දී වලනය වීමට මෙවාට නොහැකි ය.
- එය ස්ථිර ලක්ෂණක් බැවින් අන්තර්පරිශුච්ඡ පේශී සංකෝචනයෙන් පරිශු කුඩුව අදින අතර ඒවා පළමු පරිශු දෙසට ඇදී යාම සිදු වෙයි.
- උර කුහරය තුළ පිහිටන හෘදය, පෙණහඳු වැනි අවයව ආරක්ෂා කරනුයේ පරිශු යුගල දොළහ හා උරෝස්ටිය මඟිනි.

සෘජු ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීමට මානව ආක්ෂෙප සැකිල්ල මඟින් සපයන දායකත්වය

- (1) කශේරුවේ ඇති පාර්ශ්වික වක්‍ර දෙකක් හා උච්චිතික වක්‍ර දෙකක් මඟින් මානව දේහයේ සෘජු ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීමට දායක වීම, උච්චිතික වක්‍රයා දෙකක් ඇති වී සෘජු ඉරියව් පවත්වා ගැනීමට ලෙස දායක වේ (කශේරුවේ වක්‍ර පිළිබඳ කොටස බලන්න).
- (2) කශේරුවේ අන්තය දෙසට පිහිටන කශේරුකාවල කශේරුකා දේහයේ ප්‍රමාණය විශාල වීම මඟින් සෘජු ඉරියව්වේ දී දේහයේ හෙළ කොටසේ බර දරා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ (කශේරුකා පිළිබඳ කොටස බලන්න).
- (3) ක්‍රිකාස්ටික කශේරුකා එකිනෙක බද්ධ වීමෙන් ක්‍රිකෝණාකාර ව්‍යුහයක් වන ක්‍රිකාස්ටිය සෑදීම මඟින් කශේරුකාවේ හා අභ්‍යන්තර අවයවවල බර දරා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.
- (4) හිස්කබල පත්ලේ මධ්‍යයට වක්‍රව විශාල අපර කපාල සන්ධාන අග්‍ර යුගලක් හා කශේරුක ජිදය හිස් කබලේ අධරව මධ්‍යයට ආසන්නව පිහිටා තිබීමත් නිසා සෘජු ඉරියව්වේ දී හිස් කබල කශේරුව මත නියමිත පරිදි කුලීනව පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ.

මානව ගාත්‍රා සැකිල්ලේ ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකාරීත්වය

- (1) ගාත්‍රා සැකිල්ලට පූර්ව ගාත්‍රා යුගල හා උරමේඛලාවන් අපර ගාත්‍රා යුගල හා ශ්‍රෝණි මේඛලාවන් අයත් ය.
- (2) උරමේඛලාව හරහා උත්තර ගාත්‍රය දේහයේ බද්ධ සන්ධි මඟින් සම්බන්ධ වෙයි. එමෙන් ම උරමේඛලාව මඟින් උත්තර ගාත්‍රය ආක්ෂෙප සැකිල්ලට සම්බන්ධ කරයි.

2868 බඳා → අංශ 28 කා (2868 බඳා)
→ අංශ 28 කා (2868 බඳා)

- (3) උරමේඛලාවට වම් හා දකුණු වශයෙන් අක්ෂකාස්ථි දෙකක් හා වම් හා දකුණු වශයෙන් අංශඵලක අස්ථි දෙකක් අයත් ය. ශ්‍රෝණි මේඛලාව උතුල් අස්ථි දෙකකින් යුතු අතර, ඒවා ක්‍රිකාස්ටියට සම්බන්ධව ඇත.

පූර්ව ගාත්‍රය අංශ

- ප්‍රශස්ථාස්ථිය මඟින් උඩුබාහුව සෑදයි.
- ආරස්ථිය හා අන්වරාස්ථිය (යට බාහුව),
- හස්තකුර්වාස්ථි - 08 → මැණික් කවුට
- හස්තකුර්වෝපරිය - 05 → අත්ලේ අස්ථි
- ඇඟිලිපුරාක් අස්ථි - 14 → ඇඟිලිපුරාක් පූර්ව ගාත්‍රයට අයත් ය.

පූර්ව ගාත්‍රය

- ග්‍රහණයට,
- බර ඉසිලීමට හා
- පුළුල් පරාසයක වලනය කිරීමට හැකි පරිදි සැකසී ඇත.

- ප්‍රශස්ථාස්ථියේ හිස අංශඵලකයේ ග්ලෙනොයිඩ කුහරය සමඟ සන්ධානය වීමෙන් අසම්පූර්ණ ගෝල කුහර සන්ධියක් වන උරස් සන්ධිය සෑදීම මඟින් පුළුල් පරාසයක වලනය වීමේ හැකියාව පූර්ව ගාත්‍රයට හිමිව ඇත.

මේ සන්ධිය මඟින්

- සම්මේජනය,
- ප්‍රසාරණය,
- අභිනයනය,
- අපනයනය,
- භ්‍රමණය,
- පරිනයනය යන වලනයන්ට ඉඩ සලසයි.

෧ ව

- ප්‍රශස්ථාස්ථියේ විදුර කෙළවර සන්ධාන පාෂාණ දෙකක් ඇත. බහුඅක්ෂරීය හා සුලාභලය වැනි.
- මෙවා ආරස්ථිය හා අන්වරාස්ථිය සමඟ සන්ධානය වීමෙන් වැලමිට සන්ධිය සෑදේ.
- එමෙන් ම ආරස්ථිය හා අන්වරාස්ථිය හා ඒවායේ අවිදුර විදුර කෙළවරවල්වල දී එකිනෙක හා සන්ධානය වී ඇත.
- තත්කුමය සම්බන්ධතයකින් අස්ථි දඩ දෙක එකිනෙක හා සම්බන්ධ වීම මඟින් අස්ථි අතර සම්බන්ධය ස්ථාවර වීමත් බලයක් යෙදුණු විට වැලමිට හෝ මැණික් කවු සන්ධිවල සාපේක්ෂ පිහිටීම පවත්වා ගැනීමත් සිදු වේ.
- වැලමිට සන්ධිය අසවි සන්ධියක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් යටිබාහුවේ සම්මේජන හා ප්‍රසාරණ වලන සඳහා පමණක් අවස්ථාව සලසයි.

- යටිබාහුවේ අස්ථිවල විදුර කෙළවර හස්තකුර්වාස්ථි සමඟ සන්ධානය වීමෙන් මැණික්කවු සන්ධිය සෑදයි.

වෙනම වර්ග ගණනක් ඇති බැවින්
අක්ෂිකු ඇතුළතට ඇතුළත් කරයි.

- හස්තකුර්වාස්ට් 8 අවිදුර හා විදුර ලෙස පේළි දෙකකට සැකසී ඇත.
- ඒවා එකිනෙක බැඳී පවතින නිසා ඒවා අතර වලන සීමා වෙයි.
- අවිදුර පේළියේ අස්ට් මැණික්කටු සන්ධිය සමඟත් විදුර පේළියේ අස්ට් හස්තකුර්වාස්ට් අස්ට් සමඟත් සම්බන්ධ ය.
- මේ සැකැස්ම මඟින් අත්ල උඩු අතට හැරීම හෙවත් උත්කුච්ඡනය හා අත්ල යටි අතට හැරවීම හෙවත් නිකුච්ඡනය සිදු කිරීමට හැකි වෙයි.
- මීට අමතරව මැණික්කටුවට ද සම්මේජනය, ප්‍රසර්ජනය, අභිනයනය හා අපනයනය කළ හැකි ය.
- හස්තකුර්වාස්ට් අස්ට්වල අවිදුර කෙළවර හස්තකුර්වාස්ට් සමඟත් විදුර කෙළවර ඇඟිලි පුරුක් සමඟත් සන්ධානය වෙයි.
- හස්තකුර්වාස්ට් අස්ට් හා ඇඟිලි පුරුක් අතර හට ගන්නා සන්ධිය මඟින් ඇඟිලිවල වලනයට හා බලග්‍රහණයට ඉඩ සලසයි. ඇඟිලිවලට ද සම්මේජන, ප්‍රසර්ජන, අභිනයන, අපනයනය හා පරිනයන වලන පෙන්විය හැකි ය.
- පළමු ඇඟිල්ල/ මහපට්ඨාලේල අතේ ඇති පළමු හස්තකුර්වාස්ට් අස්ටිය හා විශිෂ්ට හස්තකුර්වාස්ටියත් අතර ඇති සන්ධිය මඟින් අනෙක් ඇඟිලිවලට වඩා පළමු ඇඟිල්ලේ වලනභාවය වැඩි කරවයි.
- එමෙන් ම මහපට්ඨාලේලේ පිළිමල් භාවය මඟින් අනෙක් ඇඟිලිවලට ලම්බකව වලනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙයි.
- මෙමඟින් මිනිසාට ම ආවේණික වූ යථාතත්ත්ව ග්‍රහණ/ සියුම් ග්‍රහණ හැකියාව ලැබී ඇත.

අපර ගාත්‍රය/ පහළ ගාත්‍රය කකුල්

- එය උර්වාස්ටිය (කලවාස්ටිය),
- ජංඝාස්ටිය (කෙණ්ඩ අස්ටිය),
- අනුජංඝාස්ටිය,
- දණිස් කටුව,
- වළලුකර අස්ට් 7ක් ද
- පතුල් ඇට 5කින් සහ
- ඇඟිල් පුරුක් 14කින් ද සමන්විත වේ.

- අපර ගාත්‍රය
 - මානව දේහයේ සෘජු ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීමට,
 - දේහ බර දරා ගැනීමට,
 - ශක්තිමත්භාවයට හා
 - ඇවිදීමට අනුවර්තනය වී ඇත.

සෘජු ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීමට, දේහ බර දරා ගැනීමට සහ ඇවිදීමට අපර ගාත්‍රයේ ඇති අනුවර්තන

- කලව සෑදී ඇති උර්වාස්ටිය දේහයේ ඇති දිග ම, බර ම හා ශක්තිමත් ම අස්ටියයි.
- උර්වාස්ටියේ හිස ශ්‍රෝණි මේඛලාවට අයත් උකුළු අස්ටියේ ශ්‍රෝණි කෝටරකය සමඟ සන්ධානය වීමෙන්

- ගෝල කුහර සන්ධියක් වන උකුළු සන්ධිය සෑදයි.
- සිට ගෙන සිටින විට දේහ බර දරා ගැනීමට හැකි වන පරිදි මේ උකුළු සන්ධිය ඉතා දැඩි හා ශක්තිමත් වේ.
- අපර ගාත්‍රය ද
 - සම්මේජන,
 - ප්‍රසර්ජන,
 - අභිනයන,
 - අපනයන,
 - පරිනයන හා
 - භ්‍රමණ වලන උකුළු සන්ධිය ආශ්‍රිතව සිදු කරයි.
- උර්වාස්ටියේ විදුර කෙළවර ජංඝාස්ටිය හා දණිස්කටුව සමඟ සන්ධානය වීමෙන් දණහිස් සන්ධිය සෑදෙයි.
- කෙණ්ඩය සාදන අස්ට් දෙකෙන් මධ්‍යයට පිහිටන අස්ටිය ජංඝාස්ටියයි.
- දණහිස් සන්ධියට සම්මේජන ප්‍රසර්ජන හා භ්‍රමණ වලන දැක්විය හැකි ය.
- මේ සන්ධිය අගුළු වැටීමෙන් දීර්ඝ වේලාවක් සිට ගෙන සිටීමට හැකි වෙයි.
- එමෙන් ම උර්වාස්ටිය මඟින් දේහ බර දණහිසට පහළින් ඇති අස්ට් හරහා පාදයට සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
- ජංඝාස්ටියේ හා අනුජංඝාස්ටියේ විදුර කෙළවර විශේෂිත පාදකුර්වාස්ටියක් සමඟ සන්ධානය වීමෙන් වළලුකර සන්ධිය සෑදී ඇත.
- පාදයේ පාඇඟිලි මඟින් ඉහළට එසවීමටත් (tip toe) කෙණ්ඩය දෙසට මහපට්ඨාලේල එසවීමටත් වළලුකර සන්ධිය ආධාර වෙයි.
- පාදයේ අස්ට් සැකැස්ම හා ආශ්‍රිතව ඇති බන්ධනි හා පේශි මඟින් විදුලි ප්‍රදේශයේ පාදයට වක්‍ර හැඩයක් ලබා දී ඇත.
- පාදයට
 - අන්වායාම වක්‍ර දෙකක් හා
 - තීරයක් වක්‍රයක් බැගින් ඇත.
- විදුලි සිට මහපට්ඨාලේල දක්වා දිවෙන වක්‍රතා අන්වායාම වක්‍රතා ලෙසත් පාදය හරහා ගමන් කරන වක්‍රතා තීරයක් වක්‍රතා ලෙසත් හඳුන්වයි.
- සෘජු ඉරියව්වේ දී ඇවිදින විට හෝ එක තැන සිටින විට දේහ බර පාදය මස්සේ සමානව ව්‍යාප්ත කිරීමට මේ වක්‍රතා ආධාර වෙයි.

මානව කංකාල පද්ධතිය හා සම්බන්ධ සංකූලතා හා අසාමාන්‍යතා කිහිපයක්

අස්ට් වෛවරියය (මස්ටියෝපොරෝසිස්)

- මේ සංකූලතාව අස්ට් තැන්පත් වීමේ වේගය ඉක්මවා අස්ට් ප්‍රතිශෝෂණය වීම හේතුවෙන් අස්ට්වල ඝනත්වය අඩු වීම හා සම්බන්ධ තත්ත්වයකි.
- මෙමඟින් අස්ට් පටක ක්ෂය වී ගොස් කැඩෙන පුලු බවක් ඇති කරයි.
- මේ තත්ත්වය මඟින් සන්ධි පටක ක්ෂය වී ගොස් කැඩෙන පුලු බවක් ඇති කරයි.

- මේ තත්ත්වය මගින් සන්ධි වලන හැකියාව අඩු වන අතර
 - අස්ථිවල වේදනාව,
 - අස්ථි බිඳීම් හා
 - කංකාල විරූපාකා ඇති විය හැකි ය.
- අස්ථි වෛවර්ය සඳහා හේතු ලෙස
 - හෝමෝන අසමතුලිතතා (විශේෂයෙන් අර්තවරණය),
 - කැල්සියම් අඩු බව හා
 - පාරිසරික සාධක දැක්විය හැකි ය.

මස්ටියෝ ආකරයිටිස් (අස්ථි පරිවදාහය)

- අස්ථිවල ඇති වන ප්‍රදාහික නොවන අස්ථි ක්ෂය වී යෑම් මෙසේ හැඳින්වේ.
- මෙම තත්ත්වය මගින් වේදනාව ඇති කරන අතර, මෙයට හානිය වූ සන්ධියේ වලන සීමාකාරී වේ.
- සන්ධිවල සන්ධාන කාටිලේජ ක්‍රමයෙන් කුනී වී අස්ථි ක්ෂය වේ.
- ඒවිට අස්ථි එකිනෙක ස්පර්ශ වීමෙන් අස්ථි ක්ෂය වී යයි. එමගින් වේදනාව හට ගනී.
- මස්ටියෝ ආකරයිටිස් ඇති කරන හේතු දැනට සොයා ගෙන නැත.
- එහෙත් අවදානම් සාධක ලෙස
 - සන්ධිවල අධික භාවිතය,
 - ස්ත්‍රී ලිංගිකභාවය,
 - වයස්ගත වීම,
 - ආවේණික සහ
 - ස්ප්‍රිලකාව දැක්විය හැකි ය.

මඩල ලිස්සීම (Slipped disc)

- කශේරුවේ අනුයාත කශේරුකාවල දේහ වෙන් කරමින් ඒවා අතර අන්තර් කශේරුකා මඩල පිහිටයි.
- එය කම්පන අවශෝෂකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- මේ අන්තර් කශේරුකා මඩලක් පිටතින් (පර්යන්තයේ) කාටිලේජනීය මුදුවකින් ද ඒහි මධ්‍ය කුහරය මෘදු ජෙලටින්මය ද්‍රව්‍යයකින් ද තැනී ඇත.
- දුර්වලතාවක් හෝ කුචාලයක් ඇති වූ විට අන්තර් කශේරුකා මඩලේ අභ්‍යන්තර කොටස බාහිරින් ඇති මුදුව තුළින් පිටතට නෙරා එයි.
- මේ තත්ත්වය මඩල ලිස්සීම නම් වේ.
- එමගින් වේදනාව හා අපහසුතාවක් දැනේ.
- තව ද මේ තත්ත්වය මගින් සුෂුම්නා සුනායු තෙරපීමකට ලක් වූව හොත් බලපෑමට ලක් වූ ස්නායු ව දිගේ වේදනාව හා හිරිවැටීම් ඇති වේ.
- දණහිස්වලින් නොනැඹී අධික බර එසවීමේ දී මඩල ලිස්සා යෑම ඇති විය හැකි ය.

අනෙක් block මත බලා
අනෙක් ප්‍රශ්න අතර, බලා

මානව කංකාල පද්ධතියේ දැකිය හැකි ප්‍රධාන සන්ධි වර්ග

- ප්‍රධාන සන්ධි වර්ග ලෙස,
 - (1) ගෝල-කුහර සන්ධි,
 - (2) අසඬි සන්ධි හා
 - (3) විවර්තන සන්ධි හැඳින්විය හැකි ය.

(1) ගෝල-කුහර සන්ධි

- කෝප්පාකාර කුහරයක් සමඟ ගෝලාකාර හිසක් සම්බන්ධ වීම මේ වර්ගයේ සන්ධිවල දැකිය හැකි ය.
- එමගින් පුළුල් පරාසයක වලන සඳහා අවස්ථාව සැලසේ.
- එනම්;
 - සම්මිංජනය,
 - ප්‍රසර්ජනය, අනෙක්
 - අභිනයනය,
 - අපනයනය,
 - භ්‍රමණය හා
 - පරිනයනයයි.
- මානව දේහයේ පවතින ගෝල-කුහර සන්ධි සඳහා උදාහරණ දෙකක් දැක්විය හැකි ය.
- ඒවා නම්;
 - උරහිස් සන්ධිය හා
 - උකුළු සන්ධියයි (පූර්ව හා අපර ගාත්‍රා අධ්‍යයනය කරන්න).


(2) අසඬි සන්ධි

- දොරක අසඬිවක් ලෙස අස්ථිවල සන්ධාන කෙළවර එකිනෙක යා වී ඇත.
- මෙහි දී සීමා සහිත වලනවලට ඉඩ සලසා දේ.
- එනම්;
 - සම්මිංජනය හා
 - ප්‍රසර්ජනයයි. ද අනෙක්
- මේ සඳහා උදාහරණ ලෙස
 - වැලමිට සන්ධිය,
 - දණහිස් සන්ධිය,
 - වළලුකර සන්ධිය හා
 - පතුලේ හා අත්ලේ ඇඟිලිවල ඇඟිලි පුරාක් සන්ධි දැක්විය හැකි ය (පූර්ව හා අපර ගාත්‍රා අධ්‍යයනය කරන්න).

(3) විවර්තන සන්ධි

- බන්ධනයක් මගින් එක් අස්ථියක් ඒ බන්ධනීය මගින් තැනුණු මුදුව තුළ වෙනත් අස්ථියකට ආසන්නව රඳවා ගෙන එම රඳවා ගත් අස්ථිය භ්‍රමණය වීම මෙහි දී සිදු වේ.
- මේ සන්ධි මගින් අස්ථියක් හෝ ගාත්‍රයක් භ්‍රමණය වීමට සලස්වයි.
- උදාහරණයක් ලෙස හිස භ්‍රමණය කිරීම;
- එහි දී ඇටිලස් කශේරුකාව තිරස් බන්ධනීය මුදුවක්

හා අක්ෂ කශේරුකාවේ දත්තාකර ප්‍රසාරය සමග සාදන විවර්තන සන්ධියෙන් හිස භ්‍රමණයට ඉඩ සලසයි.



කංකාල පේශි සහ සංකෝචන යන්ත්‍රණය

කංකාල පේශි පටකවල ලක්ෂණ

- සාමාන්‍යයෙන් කංකාල පේශි, කංකාල පද්ධතියට සම්බන්ධව පවතින අතර, ඉවිජාත්‍රණ දේහ චලන ඇති කරයි.
- දිගු සිලින්ඩරාකාර සෛල මිටිවලින් කංකාල පේශි පටක තැනී ඇත.
- මේ සෛල එකිනෙකට සමාන්තරව පේශිය දිගේ පිහිටයි.
- සෑම සෛලයක් ම බහු නාෂ්ටික වන අතර, සෛල පටලයට ආසන්නව නාෂ්ටි පිහිටයි.

- සංකෝචක ක්ෂුද්‍ර සූත්‍රිකා අඩංගු පේශි කෙඳිනි මිටි සෛල තුළ පවතින අතර, ඒවා සෛලයේ දිග ඔස්සේ අන්වායාමව පේශි කෙඳිනි සාදයි.
- පේශි සෛලයේ ඇති පේශි කෙඳිනි, සාකොමියර නම් පුනරාවර්ති ඒකක සාදයි.
- කංකාල පේශි සෛලයේ ඇති මේ සාකොමියර පුනරාවර්ති සැකැස්ම, අන්වීක්ෂීය නිරීක්ෂණයේ දී විලිඛිත පෙනුමක් ලබා දේ.
- සාකොමියර විලිඛිත පේශි සෛලවල මූලික සංකෝචක ව්‍යුහයයි.
- විලිඛිත පේශි සෛල හා හෘදපේශි සෛල මෙන් ම කංකාල පේශි සෛල ද

➤ උද්දීපකාව

(උත්තේජනවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හා උත්තේජ ප්‍රතිග්‍රහණයට ඇති හැකියාව),

➤ සංකෝචකතාවය (ඇදීමට හෝ හැකිලීමට ඇති හැකියාව)

➤ විතනාකාව (ඉහිල් වීමට හෝ සංකෝචනය වීමට ඇති හැකියාව),

➤ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව (සංකෝචනය හෝ ඉහිල් වීමෙන් පසු මුල් පිහිටීමට පැමිණීමේ ඇති හැකියාව) සහිතයි.

- කංකාල පේශි දෛහික ස්නායු පද්ධතියේ ඉවිජාත්‍රණ පාලනය යටතේ සිදු වේ.

සාකොමියරයේ ව්‍යුහය, කංකාල පේශි චලනයේ මූලික යන්ත්‍රණය

- විලිඛිත පේශි සෛලයක ඇති පුනරාවර්ති සංකෝචක ඒකක ලෙස සාකොමියරය හැඳින්විය හැකි ය.
- විශේෂිත ප්‍රෝටීනවලින් තැනුණු සිහින් සහ ඝන සංකෝචක සූත්‍රිකාවලින් සමන්විත පේශි කෙඳිනි මගින් සාකොමියර තැනී ඇත.
- සිහින් සූත්‍රිකා (ප්‍රධාන වශයෙන් ඇක්ටීන් ප්‍රෝටීනවලින් තැනුණු) සාකොමියරයේ ඝන රොබා ලෙස දිස් වන Z-රොබාවට සම්බන්ධව ඇත.
- Z-රොබාව සාකොමියරයේ සීමාවයි.

❖ **සූත්‍රිකා** (මයොසින් ප්‍රෝටීනවලින් තැනුණු) සාකොමියරයේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ M-රොබාවට සවි වී ඇත.

- කංකාල පේශි සෛලයක Z-රොබා දෙකක් අතර ඇති සාකොමියර පුනරාවර්තනය වෙමින් පිහිටයි.
- පේශි කෙඳිත අක්‍රීය අවස්ථාවල දී ඝන හා සිහින් සූත්‍රිකා අර්ධ ලෙස අති පිහිත ව
- සාකොමියරයේ අග සිහින් සූත්‍රිකා පමණක් ඇත.
- සාකොමියරයේ මධ්‍ය පෙදෙසේ ඝන සූත්‍රිකා පමණක් දැකිය හැකි ය.
- සාකොමියරයේ මේ සිහින් සහ ඝන සූත්‍රිකා සැකසී ඇති ආකාරය කංකාල පේශි සෛල සංකෝචනවල දී කෙටි වීමට හා ඉහිල් වීමේ දී නැවත පෙර තත්ත්වයට පැමිණීමට ආධාර වේ.

සාකොමියරයේ කංකාල පේශියේ ව්‍යුහය හා සාකොමියරයේ ඒකකය රටා.

- සාකොමියරයෙන් ඇති කරන යාන්ත්‍රික කෘත්‍ය සඳහා ඇක්ටින් හා මයොසින් ප්‍රෝටීන දායක වේ.
- කංකාල පේශි සංකෝචනය ප්‍රධාන වශයෙන් ඉවහානුග වන අතර, ඒය දෛනික ස්නායු පද්ධතිය මගින් පාලනය වේ.
- උත්තේජනය වූ විට කංකාල පේශියේ තනි පේශි සෛල කෙටි වේ.
- එසේ වන්නේ එහි සාකොමියර කෙටි වීම වන අතර එහෙයින් මුළු පේශිය ම සංකෝචනය වේ.
- පේශි සංකෝචන චලනවලට පරිවර්තනය සඳහා පේශි සන්ධානය වී ඇති අස්ථි අවශ්‍ය වේ.
- අස්ථිවලට සවි වී ඇති බණ්ඩරා ඇදීම කංකාල පේශි සංකෝචන මගින් සිදු කෙරේ.
- පේශියක සංකෝචනය මගින් ඒ පේශිය කෙටි වීම සිදු වන අතර, එයින් අස්ථිය හෝ අවයව කොටස චලනය වේ.
- ස්නායු ආවේගයක් නැවතුණ විට දී පේශි සංකෝචනය විමෙන් පසු පෙර පැවති දිගටම නැවත පැමිණේ.

සර්පත සූත්‍රිකාවාදය

- විලිඛිත පේශි සංකෝචනය පිළිබඳ වර්තමානයේ පිළිගනු ලබන ආකෘතියයි.
- මේ සිද්ධාන්තයට අනුව, කංකාල පේශි සෛලයක් (හෝ හෘද සෛලයක්) සංකෝචනය වන විට සෑම සාකොමියරයක ම ඇති සහ සහ සිහින් සූත්‍රිකා එක මත එක ලිස්සා යාම සිදු වේ.
- එවිට සාකොමියරයේ අන්ත දෙකෙහි ම ඇති Z-රේඛා එකිනෙකට ළං කෙරෙන අතර, සාකොමියර කෙටි වේ.
- එනම්: පේශි සෛල කෙටි වීම සිදු වේ.
- ඒ අතරතුර දී සාකොමියරයේ ඇති සූත්‍රිකා කාණ්ඩ දෙක සාපේක්ෂව නියත දිගකින් යුක්තව පවතී.
- පේශි සෛලවල සිහින් ඇක්ටින් සූත්‍රිකා ඇදීම සිදු කරන හා පේශි සංකෝචනයට ඉවහල් වන චාලක ප්‍රෝටීනය මයොසින් වේ.
- සෑම මයොසින් අණුවක් ම වලිග පෙදෙසකින් හා හිස පෙදෙසකින් සමන්විත ය.
- සහ සූත්‍රිකාවල මේ වලිග පෙදෙස ඒකට මිටියක් ලෙස ද එයින් පැන නගින හිස් ලෙස ද දිස් වේ.
- සිහින් සූත්‍රිකා ඇක්ටින් අණුවලින් සෑදී ඇති අතර, මයොසින් අණුවල හිස් සඳහා බන්ධන ස්ථාන ද දරයි.
- මයොසින් හිස්වලට ATP අණු සමඟ ද බැඳීමට හැකියාව ඇත.
- එසේ වන්නේ ඒවා අඩු ශක්ති තත්ත්වයක පවතින විට දී ය.
- ATP අණු ADP හා පොස්ෆේට් අණු බවට ජල විච්ඡේදනය වීමේ දී ශක්තිය පිට වන අතර, එවිට මයොසින් හිස ඉහළ ශක්ති මට්ටමකට ළඟා වේ.
- එවිට මයොසින් හිස, ඇක්ටින්වල ඇති මයොසින් හිස් සඳහා ඇති බන්ධන ස්ථානයට හරස් සේකු මඟින් බැඳේ.
- ඉන් පසු ADP හා පොස්ෆේට් නිදහස් කරමින් මයොසින් හිස නැවත අඩු ශක්ති මට්ටමට පැමිණේ.

- එවිට සාකොමියරයේ මධ්‍ය දෙසට සිහින් තන්තු ඇදෙන අතර (ලිස්සා යාම), සාකොමියරය කෙටි වේ.
- නව ATP අණුවක් මයොසින් හිසට බැඳුණු විට හරස් සේකු බිඳ වැටී මයොසින් හිස ඇක්ටින්වලින් ගැලවී යයි.
- ඉන් පසු නැවත නව හරස් සේකු සෑදීමේ චක්‍රයක් ආරම්භ වේ.
- මෙසේ බන්ධනය වීම් හා නිදහස් වීම් ගණනාවක් නැවත නැවත සිදු වීම පේශි සංකෝචනය සඳහා අවශ්‍ය වේ. ඒ සෑම චක්‍රයක දී ම හරස් සේකුවල දී මයොසින් හිස් නිදහස් වන අතර, අලුතින් බැඳෙන ATP ජල විච්ඡේදනය වී නැවත මයොසින් සහ නව ඇක්ටින් අණුවකට බැඳීම උත්ප්‍රේරණය කරයි.
- මේ ක්‍රියාවලිය පේශි සෛලයේ සෑම පේශි කෙදින්නක ම මුළු දිග ඔස්සේ සිදු වේ.
- සාකොමියරයේ මධ්‍යයට පැමිණි සිහින් සූත්‍රිකා, මයොසින් හිස් බැඳීම සඳහා නව ස්ථාන නිරාවරණය කරයි.
- මුළු ක්‍රියාවලිය මගින් ම පේශි සෛලයක ඇති සිහින් සහ සහ සූත්‍රිකා එක මත එක ලිස්සා යමින් Z-රේඛා එකිනෙක ළං කරමින් සාකොමියරය කෙටි කරයි.
- එක් සහ සූත්‍රිකාවක මයොසින් හිස් ගණනාවක් දැකිය හැකි ය.
- එක් තත්පරයක් තුළ දී මේ හිස් සෑම එකක් ම හරස් සේකු සාදයි.
- Ca^{2+} සහ සමහර අනෙකුත් ප්‍රෝටීන, පේශි සංකෝචනයේ දී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
- මයොසින් හිසට ඇක්ටින් සූත්‍රිකා සමඟ සම්බන්ධ විය හැක්කේ ඒවායේ බන්ධන ස්ථාන කැල්සියම් අයනවල ක්‍රියාව මගින් නිරාවරණය වූ විට පමණි.

